

Europa oriental y Asia central

Panorama general

- Las epidemias en Europa oriental y Asia central continúan expandiéndose: aproximadamente 1,5 millones de personas vivían con el VIH en esta región a final de 2005.
- El número de nuevas infecciones se ha multiplicado por 20 en menos de una década. En 2005, unas 220 000 personas se infectaron por el VIH.
- Se estima que el SIDA acabó con la vida de unos 53 000 adultos y niños en Europa oriental y Asia central durante 2005, casi el doble que en 2003.
- Según las estimaciones, 420 000 mujeres adultas vivían con el VIH en Europa oriental y Asia central en 2005, un tercio más que en 2003.
- La cobertura antirretrovírica sigue siendo insuficiente en la región, de modo que en 2005 sólo recibieron tratamiento 21 000 de las 160 000 personas que se calcula que lo necesitan.
- Los consumidores de drogas intravenosas representan más del 70% de los casos de VIH en la región, pero sólo el 24% de las personas que reciben tratamiento.
- En Europa oriental, los programas de reducción de daños únicamente llegaron al 9% de los consumidores de drogas intravenosas en 2005.

Avances en los países

- La **Federación de Rusia** presenta la mayor epidemia de SIDA de toda Europa. En 2005, unas 940 000 personas vivían con el VIH en el país, y se estima que la prevalencia a nivel nacional era del 1,1%.
- Las prácticas peligrosas de inyección de drogas son la principal causa de nuevas infecciones en la **Federación de Rusia**, y hay un gran número de jóvenes menores de 30 años que consumen drogas intravenosas. En San Petersburgo se han

registrado niveles de infección por el VIH del 30% entre consumidores de drogas intravenosas, y el VIH se está propagando de este grupo a sus parejas sexuales, con un incremento en el número de mujeres infectadas.

- Las personas que viven al margen de la sociedad corren un riesgo especial de infección por el VIH en la **Federación de Rusia**: un estudio realizado en un centro de detención temporal de Moscú encontró una prevalencia del VIH 30-120 veces mayor que la de la población general. Se estima que la prevalencia del VIH en las prisiones rusas es como mínimo cuatro veces mayor que la de la población general.
- En 2005, en la **Federación de Rusia** sólo estaban recibiendo tratamiento antirretrovírico 5000 de las 100 000 personas que se estima que lo necesitan.
- En **Ucrania** se calcula que la prevalencia nacional del VIH era del 1,4% en 2005, lo que supone 410 000 personas infectadas. La epidemia de **Ucrania** se ve favorecida por una combinación de prácticas peligrosas de inyección de drogas y relaciones sexuales sin protección. En Odessa y Simferopol resultaron VIH-positivos el 58-59% de los consumidores de drogas intravenosas, al igual que el 67% de los profesionales del sexo de Odessa que también se inyectaban drogas.
- La transmisión sexual del VIH se ha vuelto más común, y en 2004 representó una de cada tres nuevas infecciones, en comparación con el 14% durante 1999-2003. El VIH se ha propagado a la población general, y está aumentando el número de mujeres infectadas: en 2004, el 42% de los nuevos diagnósticos de VIH en **Ucrania** correspondió a mujeres.
- La epidemia está creciendo en **Belarús**, donde se estima que 20 000 personas vivían con el VIH en 2005 y que la prevalencia nacional del VIH en adultos era del 0,3%. La transmisión sexual es responsable de la mayor parte de los nuevos diagnósticos de VIH (55% en 2004).
- En **Uzbekistán**, donde el consumo de drogas intravenosas y el comercio sexual avivan la epidemia, el número de nuevos diagnósticos de VIH aumentó de 28 en 1999 a 2016 en 2004.
- En **Kazajstán**, las estimaciones indican que 12 000 personas vivían con el VIH en 2005. La prevalencia nacional se mantuvo en el 0,1%, pero se ha detectado una prevalencia muy alta del VIH entre consumidores de drogas intravenosas (56% en un estudio reciente en la ciudad de Kashgar).

- Aunque mucho menor, la epidemia de **Tayikistán** está creciendo rápidamente. El número anual de diagnósticos de VIH había sido inferior a 50 antes de 2004, pero aumentó a 198 ese año.
- Las epidemias en el Cáucaso parecen estar creciendo con menor rapidez que muchas de las existentes en otras partes de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, las condiciones en **Armenia, Azerbaiyán y Georgia** favorecen un posible auge del VIH.
- En **Armenia**, el consumo de drogas intravenosas se ha convertido en una vía importante de transmisión del VIH, y se están registrando prevalencias significativas del virus entre consumidores de drogas intravenosas y profesionales del sexo de Bakú, la capital de **Azerbaiyán**.
- Las epidemias en el sudeste de Europa son de perfil aún más bajo, pero también allí el consumo de drogas intravenosas y los comportamientos sexuales de riesgo en varios países podrían desencadenar brotes de VIH. El país más afectado de esta subregión es **Rumania**, donde, a final de 2004, se había diagnosticado un total acumulativo de 6200 infecciones por el VIH, y donde la mayoría de las nuevas infecciones se atribuye a relaciones sexuales sin protección.

Contacto

Dominique De Santis / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 4509 / desantisd@unaids.org.

Sophie Barton-Knott / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 1697 / bartonknotts@unaids.org.