

América Latina

Panorama general

- En 2005, en América Latina había un total de 1,6 millones de personas que vivían con el VIH, y alrededor de 140 000 se infectaron por el virus.
- Unos 32 000 niños menores de 15 años vivían con el VIH en 2005, y el SIDA se cobró unas 59 000 vidas.
- Aproximadamente 294 000 personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica en América Latina a final de 2005, lo que representa el 73% de las 404 000 personas que se estima que la necesitaban.
- En varios países latinoamericanos se están observando altos niveles de infección por el VIH (entre el 2% y el 28%) en varones que tienen relaciones sexuales con varones. Sin embargo, en muchos países la transmisión del VIH entre profesionales del sexo femeninas y sus clientes es otro factor significativo en la propagación del virus. Conforme madura la epidemia, aumenta el número de mujeres infectadas.

Tendencias en los países

- El **Brasil** alberga más de un tercio del número total de personas que viven con el VIH en América Latina (620 000 adultos y niños), y su prevalencia nacional del VIH era del 0,5% en 2005.
- En varias ciudades del **Brasil** están disminuyendo las infecciones por el VIH relacionadas con prácticas peligrosas de inyección de drogas, y existe un acceso generalizado al tratamiento. En 2005 estaban recibiendo terapia antirretrovírica unas 170 000 de las 209 000 personas que la necesitaban, incluidos 30 000 consumidores de drogas intravenosas.
- Sin embargo, está aumentando el número de jóvenes que tienen relaciones sexuales a edades más tempranas y con más parejas: al menos uno de cada tres (36%) brasileños encuestados de 15-24 años dijo que ya era sexualmente activo antes de cumplir los 15 años de edad.

- Se estima que en la **Argentina** había 130 000 personas que vivían con el VIH en 2005, lo que supone una prevalencia en adultos del 0,6%. El consumo de drogas intravenosas y las relaciones sexuales sin protección entre varones son los principales impulsores de la epidemia en el país: se ha comprobado que casi uno de cada dos (44%) consumidores de drogas intravenosas sometidos a la prueba del VIH en Buenos Aires es VIH-positivo, y se han registrado niveles de infección del 7-15% entre varones que tienen relaciones sexuales con varones. Los presos en las principales cárceles urbanas figuran entre los grupos de población más afectados. En 2004 se encontró que estaban infectados por el VIH el 17-28% de los reclusos encuestados en la provincia de Buenos Aires.

- Las relaciones sexuales entre varones constituyen un factor importante en las epidemias de VIH de **Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú**, y se han documentado altos niveles de prevalencia del VIH entre varones que tienen relaciones sexuales con varones en Santa Cruz, **Bolivia** (24%); Quito-Pichincha y Guayaquil-Guayas, **Ecuador** (17% y 23%, respectivamente), y Lima, **Perú** (23%).

- En **Colombia** había unas 160 000 personas que vivían con el VIH en 2005. Se han detectado niveles de infección de hasta el 20% entre varones que tienen relaciones sexuales con varones en Bogotá, aunque sólo eran VIH-positivos el 1% de las profesionales del sexo femeninas. De todas formas, cada vez es más frecuente que las mujeres se infecten a través de sus parejas masculinas que también tienen relaciones sexuales con varones. Entre las mujeres que resultaron VIH-positivas en proyectos dirigidos a prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH, el 72% mantenía relaciones estables con su pareja.

- **Honduras** es uno de los países más afectados de la región, con una prevalencia nacional del VIH del 1,5% y 63 000 personas que vivían con el virus a finales de 2005. El SIDA es la principal causa de mortalidad entre las mujeres hondureñas. El comercio sexual y las relaciones sexuales entre varones están propulsando la epidemia en el país. Una de cada 12 profesionales del sexo femeninas resultó VIH-positiva en la capital, Tegucigalpa, y se han registrado prevalencias del 8% y el 16% en esta misma ciudad y en San Pedro Sula, respectivamente, entre varones que tienen relaciones sexuales con varones.

- La situación es similar en **Guatemala**, donde hay 61 000 personas que viven con el VIH y la prevalencia nacional en adultos se mantiene en el 0,9%. Se ha estimado una prevalencia del VIH del 15% entre profesionales del sexo que trabajan en la calle y del 12% entre varones que tienen relaciones sexuales con varones en la ciudad de Guatemala.

- **Belice** está sufriendo una intensa epidemia, con una prevalencia nacional del VIH en adultos del 2,5% en 2005. Las relaciones sexuales entre varones constituyen un

factor oculto pero poderoso, no sólo en la epidemia de **Belice** sino también en las de **El Salvador, Nicaragua y Panamá**.

- Aunque la prevalencia del VIH en adultos sigue siendo baja en **México** (0,3%), se estima que 180 000 personas vivían con el virus en 2005, hasta dos tercios de las cuales son varones que se cree que se han infectado en el curso de relaciones sexuales con otros varones. Hay signos de que está aumentando la transmisión heterosexual del VIH a medida que más mujeres se infectan a través de sus parejas que también tienen relaciones sexuales con varones.

Contacto

Dominique De Santis / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 4509 / desantisd@unaids.org.

Sophie Barton-Knott / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 1697 / bartonknotts@unaids.org.