

Amérique latine

Généralités

- Le nombre total de personnes vivant avec le VIH en Amérique latine en 2005 était de 1,6 million et quelque 140 000 personnes ont contracté une infection à VIH.
- Environ 32 000 enfants de moins de 15 ans vivaient avec le VIH en 2005 et le SIDA a entraîné quelque 59 000 décès.
- A fin 2005, quelque 294 000 personnes bénéficiaient d'une thérapie antirétrovirale en Amérique latine, soit 73% des quelque 404 000 personnes qui en avaient besoin.
- Dans plusieurs pays d'Amérique latine, on rencontre des niveaux élevés d'infection (entre 2% et 28%) chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Toutefois, dans de nombreux pays, la transmission du VIH entre les professionnelles du sexe et leurs clients constitue un autre facteur important de diffusion du VIH. Au fur et à mesure que les épidémies se développent, un nombre croissant de femmes sont infectées.

Evolution dans les pays

- Le **Brésil** abrite plus d'un tiers de toutes les personnes vivant avec le VIH en Amérique latine (620 000 adultes et enfants) et la prévalence nationale du VIH était de 0.5% en 2005.
- Les infections à VIH associées à des pratiques hasardeuses d'injection de drogues sont en baisse dans plusieurs villes du **Brésil** et l'accès au traitement est généralisé. Quelque 170 000 personnes sur les 209 000 qui auraient besoin d'une thérapie antirétrovirale en bénéficiaient en 2005, dont 30 000 consommateurs de drogues injectables.
- Toutefois, un nombre accru de jeunes ont leurs premiers rapports sexuels à un âge plus précoce et avec un nombre accru de partenaires et un tiers au moins (36%) des jeunes **Brésiliens et Brésiliennes** de 15 à 24 ans déclarent avoir entamé leur vie sexuelle avant leur 15^{ème} anniversaire.
- On estime que 130 000 personnes vivaient avec le VIH en **Argentine** en 2005 et la prévalence du VIH chez l'adulte était de 0,6% en 2005. La consommation de drogues injectables et les rapports sexuels non protégés entre hommes sont les principaux moteurs de l'épidémie en **Argentine**, près d'un consommateur de drogues injectables sur deux (44%) testé à Buenos Aires s'est révélé séropositif au VIH et des niveaux d'infection entre 7% et 15% ont été enregistrés parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Les détenus des principales prisons urbaines figurent parmi les groupes les plus gravement touchés de la population. En 2004, entre 17% et 28% des détenus participant à une enquête dans la province de Buenos Aires se sont révélés infectés par le VIH.
- Les rapports sexuels entre hommes sont un important élément moteur des épidémies en **Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur** et **Pérou** et des niveaux élevés de

prévalence du VIH ont été relevés parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes à Santa Cruz, **Bolivie** (24%), Quito Pichincha et Guayaquil Guayas, **Equateur** (17% et 23% respectivement) et Lima, **Pérou** (23%).

- En **Colombie** on comptait environ 160 000 personnes vivant avec le VIH en 2005. Des niveaux d'infection à VIH pouvant atteindre 20% parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ont été observés à Bogota, alors que 1% seulement des professionnelles du sexe étaient infectées. Toutefois, les femmes sont de plus en plus infectées par leurs partenaires masculins qui ont aussi des rapports sexuels avec d'autres hommes : parmi les femmes séropositives rencontrées au cours de projets visant à prévenir la transmission mère-enfant du VIH, 72% faisaient partie d'un couple stable.
- Le **Honduras** est l'une des régions les plus gravement touchées, avec une prévalence nationale du VIH à 1,5% et 63 000 personnes vivant avec le virus à fin 2005. Le SIDA est la première cause de décès pour les femmes du **Honduras**. Les rapports sexuels tarifés et entre hommes sont les moteurs de l'épidémie au **Honduras**. Une professionnelle du sexe sur 12 s'est révélée séropositive au VIH dans la capitale Tegucigalpa et des taux de prévalence de 8% et 16% ont été relevés dans cette ville et à San Pedro Sula respectivement, parmi des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes.
- La situation est analogue au Guatemala, qui comptait 61 000 personnes vivant avec le VIH et où la prévalence nationale du VIH chez l'adulte est de 0,9%. Une prévalence du VIH de 15% a été signalée parmi les professionnel(le)s travaillant hors maisons et 12% des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes se sont révélés infectés par le VIH à Guatemala City.
- Une épidémie très active se déroule au Belize, qui comptait une prévalence nationale du VIH chez l'adulte de 2,5% en 2005. Les rapports sexuels entre hommes constituent un moteur caché mais important des épidémies non seulement au **Belize**, mais aussi en **El Salvador**, au **Nicaragua** et au **Panama**.
- La prévalence du VIH chez l'adulte reste faible au **Mexique** (0,3%), mais on estime que 180 000 personnes y vivaient avec le VIH en 2005 – deux tiers de ce chiffre correspondraient à des hommes infectés au cours de rapports sexuels avec d'autres hommes. Il semble que la transmission hétérosexuelle du VIH soit en augmentation, car de plus en plus de femmes sont infectées par leurs partenaires qui ont également des rapports sexuels avec des hommes.

Contact

Dominique De Santis | ONUSIDA Genève | tél. +41 22 791 4509 | desantis@unids.org

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Genève | tél. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unids.org