

Ближний Восток и Северная Африка

Общий обзор

- В 2005 году число людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составляло 440 000 человек.
- В 2005 году 64 000 человек заразились ВИЧ и около 37 000 взрослых и детей умерли от СПИДа.
- К концу 2005 года на Ближнем Востоке и в Северной Африке лишь 5% из 75 000 человек, которые, по оценкам, нуждаются в антиретровирусном лечении, получали такое лечение.
- В странах Ближнего Востока и в Северной Африки (за исключением Судана) национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых не превышал 0,1%. Однако, по имеющимся данным, эпидемии нарастают в ряде стран, включая **Алжир, Исламскую Республику Иран, Ливийскую Арабскую Джамахирию и Марокко.**

Ситуация в странах

- По оценкам, из 440 000 человек, живущих с ВИЧ в регионе, 350 000 проживали в **Судане**, где в конце 2005 года национальный показатель распространенности ВИЧ составлял 1,6%.
- В **Судане** эпидемия носит наиболее тяжелый характер в южных районах страны (к которым примыкают страны с относительно высоким показателем распространенности ВИЧ). Исследования, проведенные в южном городе Йей вблизи границы с Угандой, дали показатель распространенности ВИЧ среди взрослых на уровне 4,4%, в то время как показатель распространенности ВИЧ среди взрослых, обследованных в городе Румбеке, расположенном в глубине страны, составлял 0,4%.
- Несмотря на то что основным путем передачи ВИЧ в регионе являются незащищенные половые контакты, в **Иране** высокие уровни распространенности

ВИЧ (около 15%) регистрируются среди мужчин-потребителей инъекционных наркотиков, посещающих наркологические центры в Тегеране. Большинство потребителей инъекционных наркотиков вели половую жизнь, а практика предоставления сексуальных услуг в обмен на деньги была распространена широко, в то же время лишь половина из них *когда-либо* пользовались презервативом.

- Тюремное заключение, вероятно, является важным фактором риска в распространении ВИЧ-инфекций среди потребителей наркотиков в **Иране**. Учитывая, что большую долю заключенных в **Иране** составляют лица, задержанные за преступления, связанные с наркотиками, существует неотложная потребность в расширении программ профилактики в тюрьмах.
- В **Ливии** с начала столетия число ВИЧ-инфекций среди молодых мужчин увеличилось в десять раз. Около 90% этих инфекций обусловлено небезопасной практикой употребления инъекционных наркотиков.
- В **Алжире** в 2005 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 19 000 человек. Значительными факторами риска в развитии эпидемии в стране являются секс-бизнес и употребление инъекционных наркотиков. Результаты одного исследования показали, что в 2004 году около 41% потребителей инъекционных наркотиков пользовались общим инъекционным инструментарием и что 9% женщин-работниц секс-бизнес в Таманрассете имели положительную реакцию на ВИЧ. Эпидемия в **Алжире** начала распространяться среди населения в целом – в некоторых районах на юге страны показатель распространенности ВИЧ среди женщин, посещающих дородовые клиники, превышает 1%.
- Основными факторами в развитии эпидемии в **Египте** являются незащищенные половые контакты (включая платный секс и секс между мужчинами) и употребление инъекционных наркотиков. Исследования, проведенные в **Египте**, показали, что 55% потребителей инъекционных наркотиков пользовались общим инъекционным инструментарием.
- Исследование, проведенное в столице **Саудовской Аравии** Эр-Рияде, показало, что около половины регистрируемых ВИЧ-инфекций явились результатом гетеросексуальных контактов. Большинство ВИЧ-инфицированных женщин были замужем и, вероятно, заразились от своих мужей, которые, скорее всего, заразились во время платного секса.

- В **Марокко** значительным фактором риска в развитии эпидемии является секс-бизнес. В 2004 году исследования показали, что уровень распространенности ВИЧ среди женщин-работниц секс-бизнес составлял 1,9%.
- Очень мало имеется информации о распространении ВИЧ в других странах региона; возможно, что в некоторых местах имеют место скрытые локализованные эпидемии. Информация и услуги для профилактики ВИЧ являются ограниченными, а знания о СПИДе, как правило, слабые.

Лица для контактов

Доминик де Сантис | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 4509 | desantis@unaids.org

Софи Бартон-Нотт, | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org