



ANNEXE 3 :

Indicateurs relatifs aux progrès réalisés dans les pays



Annexe 3



ANNEXE 3* : INDICATEURS RELATIFS AUX PROGRÈS RÉALISÉS DANS LES PAYS

En mars 2006, 115 pays avaient fait part à l'ONUSIDA de leurs progrès dans la mise en œuvre de la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA dans des Rapports relatifs aux progrès réalisés dans les pays en 2005. Les indicateurs utilisés étaient fondés sur l'original de la *Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA* de la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA (UNGASS, 2001). Les données présentées dans les tableaux qui suivent sont constituées de l'information contenue dans les Rapports relatifs aux progrès réalisés dans les pays ainsi que de renseignements émanant d'autres sources.

Plus de 70 pays ont utilisé le Système d'information sur la riposte des pays (CRIS) pour recueillir et notifier les données concernant les indicateurs pertinents. Il s'agit là d'un succès considérable en matière de présentation des données, qui nous fournit aussi ce qui pourrait bien être la source de données la plus riche dont nous disposons concernant l'engagement contre le VIH à l'échelle mondiale, la situation de l'épidémie dans le monde et les ripostes nationales.

Depuis la compilation du premier rapport de l'UNGASS intitulé *Suivi de l'UNGASS 2001 : Rapport d'activité sur la riposte mondiale à l'épidémie de VIH/SIDA, 2003*, les indicateurs de base ont été consolidés et perfectionnés pour le rapport 2005, en collaboration avec des

partenaires mondiaux et le Groupe de référence de l'ONUSIDA pour le suivi et l'évaluation (MERG), qui est le groupe international chargé de fixer des normes relatives au suivi et à l'évaluation. Des informations concernant la manière dont les indicateurs ont été élaborés sont disponibles sur le site web de l'ONUSIDA, dans le document intitulé *Suivi de la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA de l'UNGASS : Directives pour l'élaboration d'indicateurs de base (août 2005)*.

Tous les pays, quelle que soit leur situation économique ou épidémiologique ont été priés de considérer tous les indicateurs pertinents. Ces indicateurs englobent les dépenses relatives au VIH/SIDA et l'élaboration et la mise en œuvre des politiques dans le cadre de l'Indice composite des

politiques nationales. L'Indice a été considérablement élargi depuis 2003, afin de couvrir la situation en matière de planification stratégique, d'appui politique, de suivi et d'évaluation, de programmes de prévention, de prise en charge et de soutien, de droits de l'homme et de participation de la société civile. Les ensembles complets de données seront mis à disposition sur le site web de l'ONUSIDA.

Les indicateurs pour les épidémies généralisées, appelés ici GE-Indicators, sont destinés à mesurer les progrès dans les épidémies généralisées concernant les programmes nationaux (GE-3 à GE-9), les connaissances et les comportements (GE-10 à GE-14), et l'impact (GE-15 à GE-17) ; 17 indicateurs en tout. A l'exception de deux indicateurs concernant l'impact, qui sont traités dans l'Annexe 1 : Profils des pays ; et l'Annexe 2 : Estimations et données relatives au VIH et au SIDA, 2005, toutes les données disponibles concernant les indicateurs GE sont présentées dans cette Annexe.

Les nouveaux indicateurs portant sur les épidémies concentrées ou à faible prévalence, appelés ici CLPE-Indicators, peuvent également être pertinents pour les pays connaissant des épidémies généralisées. Ils mesurent les progrès des programmes de dépistage et de prévention du VIH à l'intention des populations les plus exposées au risque (CLPE-3 à CLPE-4), les connaissances et comportements des populations les plus exposées au risque (CLPE-5 à 8) et l'impact sur les populations les plus exposées au risque (CLPE-9). A l'exception de l'indicateur d'impact qui est traité dans les annexes précédentes, toutes les données relatives aux indicateurs CLPE sont présentées ici. Ainsi,

s'il existe au total 23 indicateurs des progrès réalisés dans les pays, la présente Annexe fournit les données portant sur 20 indicateurs.

Tableaux des données relatives aux indicateurs

Pour permettre au lecteur d'examiner les modifications dans le temps, des données concernant les deux années sont présentées lorsque les indicateurs et méthodes étaient cohérents pour les deux années en question. Dans la mesure du possible, l'année pendant laquelle les données ont été recueillies a été différenciée de l'année du rapport. Les pourcentages et les chiffres figurant dans les tableaux ont été arrondis à la plus proche décimale. Toutefois, pour le calcul des moyennes et médianes pondérées, des chiffres non arrondis ont été utilisés, c'est pourquoi on note de légères discordances. Le lecteur notera les importantes variations entre pays et régions pour certains des indicateurs. Ces écarts sont relevés dans la discussion de ces données présentée dans le chapitre sur les progrès réalisés par les pays, dans lequel les fourchettes mondiales réelles sont fréquemment fournies et discutées. Certaines des données des rapports de pays étaient encore examinées au moment de la production de la présente Annexe. Dans ces cas, les tableaux sur les données relatives aux indicateurs le mentionnent explicitement. Au fur et à mesure que de nouvelles données seront disponibles, ces tableaux seront actualisés et mis à disposition sur le site web de l'ONUSIDA.

Note : dans les cas où aucune donnée n'a été fournie par un pays pour un indicateur particulier, mais où l'on disposait de données provenant d'une autre source, par exemple, une Enquête de couverture,

le Rapport mondial de l'OMS sur l'initiative '3 millions d'ici 2005', ou une Enquête démographique et de santé, ces données ont été intégrées dans les tableaux mais ne représentent donc pas nécessairement les données officielles fournies par les autorités nationales. Dans ces cas-là, la source et l'année des données sont clairement indiquées dans le Tableau des données relatives aux indicateurs et la

définition de l'indicateur particulier utilisé est fournie ; de plus, une référence précisant la source figure à la section Notes, qui suit la présente Annexe 3. Ces tableaux ont été assemblés et produits à partir de sources diverses par le personnel du siège de l'ONUSIDA à Genève, qui ne peut être tenu pour responsable de la précision des données de la source d'origine.

*NOTE: Les pays énumérés dans les Annexes suivent l'ordre alphabétique de la version originale anglaise.

Liste 2005 des pays et territoires ayant fourni des rapports sur la mise en œuvre de la Déclaration d'engagement (N = 126)

ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE

1. Chine
2. Micronésie (Etats fédérés de)
3. Mongolie

ASIE DU SUD ET DU SUD-EST

1. Bangladesh
2. Cambodge
3. Inde
4. Indonésie
5. Iran (République islamique d')
6. Malaisie
7. Népal
8. Pakistan
9. Philippines
10. République démocratique populaire lao
11. Sri Lanka
12. Thaïlande
13. Viet Nam

OCÉANIE

1. Fidji
2. Ile Norfolk*
3. Iles Marshall*
4. Iles Solomon*
5. Kiribati*
6. Nauru*
7. Palaos
8. Samoa*
9. Tokelau*
10. Tuvalu*
11. Vanuatu*

EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE

1. Arménie
2. Bélarus
3. Fédération de Russie
4. Géorgie
5. Kirghizistan
6. Lettonie
7. Pologne
8. République de Moldova
9. République tchèque

10. Roumanie
11. Slovaquie
12. Tadjikistan*
13. Ukraine

EUROPE OCCIDENTALE

1. Albanie
2. Ex-République yougoslave de Macédoine
3. Serbie-et-Monténégro

AMÉRIQUE LATINE

1. Argentine*
2. Belize
3. Brésil*
4. Chili
5. Colombie*
6. Costa Rica
7. El Salvador
8. Equateur
9. Guatemala
10. Honduras
11. Nicaragua
12. Panama
13. Paraguay*
14. Pérou
15. Uruguay
16. Venezuela (République bolivarienne du)

CARAÏBES

1. Antigua-et-Barbuda
2. Barbade
3. Cuba
4. Dominique
5. Haïti
6. Jamaïque
7. Saint-Lucie
8. Saint-Kitts-et-Nevis
9. Saint-Vincent-et-Grenadines
10. Trinité-et-Tobago

*pas de narratif, données concernant les indicateurs seulement

AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT

1. Algérie
2. Maroc
3. Turquie

AFRIQUE SUBSAHARIENNE

1. Afrique du Sud
2. Angola
3. Bénin
4. Botswana
5. Burkina Faso
6. Burundi
7. Cameroun *
8. Comores
9. Congo
10. Côte d'Ivoire
11. Ethiopie
12. Gabon
13. Gambie
14. Ghana
15. Guinée
16. Guinée-Bissau
17. Kenya
18. Lesotho
19. Madagascar
20. Malawi
21. Mali
22. Mozambique
23. Namibie
24. Nigéria
25. Ouganda

26. République centrafricaine
27. République démocratique du Congo
28. République-Unie de Tanzanie
29. Rwanda
30. Sénégal
31. Seychelles*
32. Sierra Leone
33. Somalie
34. Swaziland
35. Tchad
36. Togo
37. Zambie
38. Zanzibar
39. Zimbabwe

PAYS À REVENU ÉLEVÉ

1. Allemagne
2. Australie
3. Autriche
4. Etats-Unis d'Amérique
5. Guam *
6. Irlande
7. Israël
8. Japon
9. Malte
10. Norvège
11. Nouvelle-Zélande
12. Pays-Bas
13. Royaume-Uni
14. Suède
15. Suisse

*pas de narratif, données concernant les indicateurs seulement

GE-1 : Dépenses publiques intérieures dans les pays à faible ou moyen revenu

Pays	Sources de l'estimation	Méthodologie utilisée	Type d'information présentée	Dépenses publiques intérieures (millions de dollars des Etats-Unis)				
				2001	2002	2003	2004	2005
Caraïbes								
Antigua-et-Barbuda	Rapport UNGASS	Système de suivi financier						\$0.40
Barbade	SIDALAC et Rapport UNGASS	NASA	Dépenses			\$4.20	\$4.60	\$3.30
Dominique*	Rapport UNGASS	AD	AD					\$0.00
Haïti	SIDALAC	NASA	Dépenses		\$0.10	\$0.10		
Jamaïque	Projet Flux de Ressources et Rapport UNGASS	Analyse des budgets	Dépenses			\$2.00	\$4.70	
Saint-Kitts-et-Nevis*	Rapport UNGASS	Analyse des budgets	Dépenses			\$0.10	\$0.10	\$0.10
Sainte-Lucie	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses					\$2.20
Saint-Vincent-et-Grenadines*	Rapport UNGASS and PHR+	NAA intégrés dans NHA	Dépenses				\$0.50	\$0.50
Trinité-et-Tobago	Rapport UNGASS et SIDALAC	NASA	Dépenses		\$3.00	\$4.50	\$5.90	
Asie de l'Est								
Chine	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Budget			\$47.20	\$98.00	\$99.30
Mongolie*	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Décaissements					\$0.20
Europe orientale et Asie centrale								
Arménie	Rapport UNGASS	AD	Dépenses	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.20	\$0.30
Bélarus	Rapport UNGASS et Projet Flux de Ressources	Système de suivi financier	Dépenses	\$0.70			\$5.80	\$6.10
République tchèque	Rapport UNGASS	AD	Dépenses				\$1.00	\$1.40
Estonie	Projet Flux de Ressources	Enquête sur les flux de ressources	Dépenses	\$0.50				
Géorgie	Rapport UNGASS	Analyse des budgets	Dépenses			\$0.40	\$0.50	\$0.60
Kirghizistan*	Rapport UNGASS	AD	Dépenses				\$0.20	
Lettonie	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses estimées					\$1.00
Lituanie	Projet Flux de Ressources	Enquête sur les flux de ressources	Dépenses	\$0.80				
Moldova, République de	Rapport UNGASS	Enquête spéciale	Dépenses			\$0.40	\$0.40	\$0.40
Roumanie	CRIS UNFPA/ONUSI DA/NIDI	Examen sur dossiers	Dépenses			\$29.70	\$36.20	\$42.70
Fédération de Russie	Rapport UNGASS	NASA	Dépenses				\$33.40	
Tadjikistan*	Rapport UNGASS	AD	Dépenses					\$0.30
Ukraine	Rapport UNGASS	NAA intégrés dans NHA	Dépenses				\$3.90	

GE-1 : Dépenses publiques intérieures dans les pays à faible ou moyen revenu

Pays	Sources de l'estimation	Méthodologie utilisée	Type d'information présentée	Dépenses publiques intérieures (millions de dollars des Etats-Unis)				
				2001	2002	2003	2004	2005
Amérique latine								
Argentine	SIDALAC et Rapport UNGASS	NASA	Dépenses	\$123.90	\$152.30	\$77.50	\$89.60	\$115.20
Belize	SIDALAC	NASA	Dépenses	\$0.40	\$0.50	\$1.10		
Chili	Rapport UNGASS et SIDALAC	NASA	Dépenses	\$8.80	\$10.70		\$25.20	
Colombie	SIDALAC	NASA	Dépenses	\$35.90	\$36.00			
Costa Rica	SIDALAC	NASA	Dépenses	\$8.10	\$7.50	\$6.40		
Equateur	Rapport UNGASS	Budget	AD			\$0.60	\$2.50	\$6.80
El Salvador	Rapport UNGASS	NASA	Dépenses	\$7.90	\$16.90	\$22.30	\$23.70	
Guatemala*	SIDALAC	NASA	Dépenses		\$9.10	\$11.20		
Guyana	SIDALAC et RF 2003	NASA	Dépenses	\$0.40	\$0.70	\$0.80		
Honduras*	Rapport UNGASS et SIDALAC	Budget	Dépenses	\$6.60				\$6.20
Mexique	SIDALAC	NASA	Dépenses	\$183.90	\$196.80			
Nicaragua	Rapport UNGASS et SIDALAC	NASA	Dépenses	\$3.50	\$3.40	\$3.50	\$3.30	
Panama	SIDALAC et Rapport UNGASS	NASA	Dépenses	\$12.50	\$10.00	\$9.70		
Paraguay*	SIDALAC et Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Décaissements	\$0.90	\$0.80			\$0.70
Pérou	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses			\$2.10	\$4.30	
Uruguay*	Rapport UNGASS et SIDALAC	NASA	Dépenses	\$8.60	\$7.50			\$3.80
Venezuela (République bolivarienne du)	Rapport UNGASS	Allocations budgétaires	Dépenses	\$44.50	\$36.80	\$30.20	\$29.20	\$28.20
Moyen-Orient et Afrique du Nord								
Algérie	Rapport UNGASS	Système de suivi financier	Engagements					\$6.70
Maroc	Rapport UNGASS	Aucune	Décaissements			\$1.50	\$1.50	\$1.50
Turquie*	Projet Flux de Ressources	Enquête sur les flux de ressources	Dépenses	\$1.40		\$3.00		
Océanie								
Fidji	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Budget			\$0.10	\$0.20	\$0.30
Micronésie (Etats fédérés de)	Rapport UNGASS	AD	Dépenses				\$0.00	
Palaos	Rapport UNGASS	AD	Dépenses				\$0.00	
Asie du Sud et du Sud-Est								
Cambodge*	IHPP NASA et Rapport UNGASS	NASA	Dépenses	\$0.40	\$1.40	\$0.80	\$1.00	
Inde*	Rapports UNGASS et NASA	NASA	Dépenses	\$41.70	\$44.40	\$41.10	\$73.30	

GE-1 : Dépenses publiques intérieures dans les pays à faible ou moyen revenu

Pays	Sources de l'estimation	Méthodologie utilisée	Type d'information présentée	Dépenses publiques intérieures (millions de dollars des Etats-Unis)				
				2001	2002	2003	2004	2005
Indonésie	Rapport UNGASS	NASA simplifiée	Décaissements	\$3.00	\$3.50	\$6.40	\$9.60	\$13.00
Iran (République islamique d')	Projet Flux de Ressources et Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Décaissements	\$4.20			\$14.00	
Lao, République démocratique populaire	Rapport IHPP NASA	NASA	Dépenses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Népal*	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses			\$0.10	\$0.10	
Pakistan	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses	\$2.90	\$2.40	\$0.50	\$2.60	\$2.40
Philippines*	Rapports UNGASS et IHPP NASA	NASA	Dépenses	\$0.60	\$0.80	\$0.70	\$0.60	\$0.60
Sri Lanka	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Décaissements					\$3.00
Thaïlande*	Rapport IHPP NASA	NASA	Dépenses	\$50.00	\$62.70	\$70.20	\$92.80	
Viet Nam*	Rapport UNGASS et Projet Flux de Ressources	Allocation budgétaire	Budget	\$4.80		\$4.40	\$5.60	\$5.60
Afrique subsaharienne								
Angola	Rapport UNGASS	Enquête spéciale	Dépenses				\$8.90	
Bénin*	Rapport UNGASS	Rapport sur les activités du programme	AD				\$10.60	
Botswana	Rapport UNGASS	Rapport sur les activités du programme	Dépenses	\$69.80				\$165.00
Burkina Faso	Rapport UNGASS	NASA et suivi financier	Dépenses	\$2.20	\$5.40	\$9.30	\$11.00	\$8.00
Burundi**	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses		\$5.70	\$5.70	\$18.60	\$14.00
Cameroun*	Rapport UNGASS	AD	Dépenses					\$4.40
République centrafricaine	Rapport UNGASS et Projet Flux de Ressources	Enquête sur les flux de ressources	Dépenses			\$0.60		\$0.70
Tchad	Rapport UNGASS	AD	Dépenses			\$0.20	\$0.50	\$0.90
Congo	Rapport UNGASS	AD	Allocations budgétaires			\$0.10	\$0.10	\$4.70
Congo (RD)	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Budget					\$3.60
Côte d'Ivoire	Rapport UNGASS	AD	Dépenses			\$1.80	\$5.20	\$5.80
Gabon	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire						\$6.70
Gambie	Rapport UNGASS	Enquête spéciale	Dépenses				\$5.50	
Ghana	Rapport UNGASS	NASA	Dépenses		\$2.50	\$9.30		
Guinée	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses			\$0.20	\$0.20	\$0.30
Guinée-Bissau**	Rapport UNGASS	AD	Dépenses	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.50	

GE-1 : Dépenses publiques intérieures dans les pays à faible ou moyen revenu

Pays	Sources de l'estimation	Méthodologie utilisée	Type d'information présentée	Dépenses publiques intérieures (millions de dollars des Etats-Unis)				
				2001	2002	2003	2004	2005
Kenya*	PHR+ et Rapport UNGASS	Budget	Dépenses		\$22.10	\$33.10	\$33.20	
Lesotho	Rapport UNGASS	Enquête spéciale	Dépenses				\$1.30	\$1.40
Libéria	NASA	NASA partielle	Dépenses				\$0.10	
Madagascar	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Budget			\$0.10	\$0.20	\$0.20
Malawi	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses	\$3.10	\$4.50	\$5.40	\$10.70	\$8.70
Mali	Rapport UNGASS	Enquête spéciale	Dépenses				\$3.50	
Maurice	NASA	NASA	Dépenses				\$0.10	
Mozambique	Rapport UNGASS	NASA	Dépenses				\$2.60	
Namibie*	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses			\$35.00		\$38.60
Nigéria	Rapport UNGASS	NASA	Dépenses			\$6.40	\$6.50	
Rwanda	Rapport UNGASS	NHA ou NASA indépendante	Dépenses			\$1.30	\$2.70	\$1.70
Sénégal	Rapport UNGASS	NASA	Dépenses			\$5.90	\$11.90	
Afrique du Sud*	Rapport UNGASS	Estimations des dépenses nationales	Dépenses	\$79.50	\$121.20	\$219.20	\$340.50	\$446.50
Swaziland	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Budget			\$2.60		\$4.00
Togo*	Rapport UNGASS	AD	Dépenses			\$0.70	\$0.90	\$0.60
Ouganda	Rapport UNGASS	Estimations budgétaires	Dépenses				\$18.80	
Tanzanie, République-Unie de	Rapport UNGASS	Allocations budgétaires	Budget	\$2.80		\$5.60	\$22.10	\$45.00
Zambie*	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Budget					\$32.00
Zimbabwe	Rapport UNGASS	AD	Décaissements			\$6.30	\$9.90	\$12.10
Europe occidentale								
Macédoine, Ex-République yougoslave de	Rapport UNGASS	Allocation budgétaire	Dépenses					\$0.20
Serbie-et-Monténégro*	Rapport UNGASS	NASA	Dépenses	\$0.20†		\$0.20†	\$5.60††	\$6.30† \$0.40†
							(N = 63)	(N = 54)

*Ces chiffres sont préliminaires et en révision, parce qu'il faut s'assurer qu'ils sont complets et ne comprennent que les fonds publics intérieurs ou parce que le temps a manqué pour les vérifications, qu'il y a eu des différences dans la période de référence ou que les pays ont déclaré qu'il s'agissait d'estimations partielles.

**Les rapports de pays comprenaient des estimations pour plusieurs années. Il faudra procéder à un travail supplémentaire pour ventiler par année.

†Valeur pour le Monténégro

††Valeur pour la Serbie

NASA = Evaluation des dépenses nationales relatives au SIDA

AD = A déterminer

IHPP = Programme international relatif aux politiques sanitaires, Thaïlande

SIDALAC = Initiative régionale sur le SIDA pour l'Amérique latine et les Caraïbes

NAA = Comptes nationaux relatifs au SIDA

NHA = Comptes nationaux relatifs à la santé

GE-3 : Apprentissage des compétences essentielles relatives au VIH dans les écoles						
Pays	2003			2005*		
	Rapport national UNGASS 2003			Rapport national UNGASS 2005		
	Pourcentage d'écoles dont les enseignants ont été formés à l'apprentissage des compétences essentielles relatives au VIH et les ont enseignées au cours de l'année écoulée			Pourcentage d'écoles dont les enseignants ont été formés à l'apprentissage des compétences essentielles relatives au VIH et les ont enseignées au cours de l'année écoulée		
	Primaire	Secondaire	Ensemble	Primaire	Secondaire	Ensemble
Afrique subsaharienne						
Botswana			50.0			
Burundi				100.0	0.0	78.9
Cap-Vert			0.0			
République centrafricaine				-	-	-
Côte d'Ivoire				0.0	38.4	19.3
Ethiopie	100.0	77.0	97.0	75.0	81.8	
Guinée				-	-	-
Kenya			5.0	61.6	49.4	60.8
Malawi			6.2	100.0	100.0	100.0
Mali				82.7	73.8	77.2
Maurice	100.0	30.0				
Nigéria						19.0
Seychelles	88.5	77.0	84.5			
Swaziland			25.0			90.2
Tanzanie, République-Unie de			19.0			
Togo				0.0	40.4	7.1
Ouganda	100.0					
Zambie			1.5			60.0
Zimbabwe			75.0			
Asie de l'Est et Pacifique						
Mongolie	3.3	67.7	35.5			
Asie du Sud et du Sud-Est						
Lao, République démocratique populaire			7.7			
Myanmar	32.0	46.5	39.0			
Thaïlande			100.0	-	-	-
Viet Nam	100.0	100.0	100.0			
Europe orientale et Asie centrale						
Arménie		15.5				
Kazakhstan	0.0	54.7				
Kirghizistan		13.0				
Fédération de Russie			100.0			
Tadjikistan		3.0				
Afrique du Nord et Moyen-Orient						
Jordanie		26.0				
Maroc			28.0			
Caraïbes						
Antigua-et-Barbuda				-	-	-
Barbade			100.0			
Dominique				100.0	100.0	100.0
République dominicaine			18.8			
Sainte-Lucie						11.1
Saint-Vincent-et-Grenadines						22.8
Trinité-et-Tobago				-	-	-

GE-3 : Apprentissage des compétences essentielles relatives au VIH dans les écoles

Pays	2003			2005 ^a		
	Rapport national UNGASS 2003			Rapport national UNGASS 2005		
	Pourcentage d'écoles dont les enseignants ont été formés à l'apprentissage des compétences essentielles relatives au VIH et les ont enseignées au cours de l'année écoulée			Pourcentage d'écoles dont les enseignants ont été formés à l'apprentissage des compétences essentielles relatives au VIH et les ont enseignées au cours de l'année écoulée		
	Primaire	Secondaire	Ensemble	Primaire	Secondaire	Ensemble
Amérique latine						
Belize			80.0			
Brésil	41.4					25.8
Guatemala			7.0			
Honduras				16.7	18.4	15.4
Mexique						75.1
Pays à revenu élevé						
Bahamas	44.0	41.0	42.5			
	(N = 44)	(N = 30)			(N = 21)	

^aLe rapport est daté de 2005, mais la collecte peut varier entre 2000 et 2005

(-) = En analyse au moment de l'impression

GE-4 : Lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail				
Pays	2003	2005		
	Rapport national UNGASS 2003*	Rapport national UNGASS 2005**		
	Pourcentage de grandes entreprises publiques et privées qui ont adopté des politiques globales concernant le VIH/SIDA sur le lieu de travail	Pourcentage de grandes entreprises/compagnies disposant de politiques et programmes concernant le VIH/SIDA sur le lieu de travail		
		Publiques	Privées	Toutes
Afrique subsaharienne				
Angola		-	-	-
Botswana	70.0			
Burundi		-	-	-
Cameroon		35.7	5.0	17.6
Cap-Vert	0.0			
République centrafricaine		-	-	-
Comores	0.0			
Congo		3.0	70.0	28.3
Congo, République démocratique du		0.0	9.1	4.8
Côte d'Ivoire	48.0	-	-	-
Ethiopie	92.5	33.3	33.3	33.3
Gabon		0.0	16.0	13.3
Ghana	100.0	0.0	12.0	10.0
Guinée		60.0	24.0	30.0
Kenya	70.0	-	-	-
Lesotho		0.0	0.0	0.0
Malawi	17.5			47.0
Mali		0.2	0.2	0.2
Maurice	40.0			
Mozambique		0.0	6.3	3.2
Namibie	49.5			
Nigéria	53.0			46.9
Rwanda	6.0			
Seychelles	50.0			
Afrique du Sud	77.0			
Swaziland	100.0			47.7
Ouganda	20.0			
Zambie				80.0
Zimbabwe	80.0			
Asie du Sud et du Sud-Est				
Lao, République démocratique populaire	97.2			
Malaisie				
Philippines	13.0			
Thaïlande		-	-	-
Viet Nam	87.5			
Europe orientale et Asie centrale				
Ukraine		0.0	0.0	0.0
Caraïbes				
Jamaïque	5.0			
Saint-Kitts-et-Nevis		-	-	-
Saint-Vincent-et-Grenadines				14.3
Trinité-et-Tobago				11.9
Amérique latine				
Honduras	0.5			
Suriname	24.0			
	(N = 41)	(N = 23)	(N = 24)	

*Le rapport est daté de 2005, mais la collecte peut varier entre 2001 to 2003

**Le rapport est daté de 2005, mais la collecte peut varier entre 2003 to 2005

(-) = En analyse au moment de l'impression

GE-5 : Infections sexuellement transmissibles—prise en charge globale des cas				
Pays	2003	2005		
	Rapport national UNGASS 2003	Rapport national UNGASS 2005*		
	Pourcentage de patients atteints d'infections sexuellement transmissibles qui sont correctement diagnostiqués (D), conseillés (C) et traités (T)	Pourcentage de femmes et d'hommes atteints d'infections sexuellement transmissibles dans des établissements de soins, qui sont correctement diagnostiqués, conseillés et traités.		
		Hommes	Femmes	Tous
Afrique subsaharienne				
Bénin				100.0
Botswana	30.0 ¹			
Burkina Faso	4.0 (D+T) 13.0 (C)			
Guinée-Bissau		-	-	-
Kenya	50.0			
Madagascar	20.0 (D+T) 44.0 (C)			
Maurice	100.0			
Nigéria		46.0 ²	41.0 ²	
Rwanda		36.6 ³	26.6 ³	28.3 ³
Seychelles	37.0			
Togo		97.9	91.8	92.4
Ouganda	21.0			40.0 ⁴
Zambie				10.0
Zimbabwe	57.0			
Asie de l'Est et Pacifique				
Mongolie	100.0 ⁶			
Samoa	100.0 ⁷			
Asie du Sud et du Sud-Est				
Cambodge	88.0 ⁸			
Thaïlande		69.2 ⁴	71.5 ⁴	70.2 ⁴
Viet Nam	38.0			
Europe orientale et Asie centrale				
Bélarus	75.0			
Kazakhstan	98.0			
Kirghizistan	82.0			
Slovaquie	100.0 ⁹			
Tadjikistan	76.0			
Ukraine		38.6	44.4	41.4
Afrique du Nord et Moyen-Orient				
Djibouti	16.0 ¹⁰			
Maroc	49.0			
Caraïbes				
Antigua-et-Barbuda				100.0
Trinité-et-Tobago		-	-	-
Amérique latine				
Honduras		80.0	80.2	80.2
Pays à revenu élevé				
Guam	100.0 (D), 34.0 (T), 18.0 (C) ⁵			
	(N = 31)	(N = 20)	(N = 12)	

*Le rapport est daté de 2005, mais la collecte peut varier entre 2000 to 2005

(-) = En analyse au moment de l'impression

¹données 1998

²données 2003

³données 2000

⁴données 2004

⁵Enquête dans des dispensaires publics et privés 2002

⁶Rapport annuel au Centre national des maladies transmissibles 2002

⁷Ministère de la santé 2002 (tous traités et conseillés, mais le diagnostic n'est pas fait en laboratoire)

⁸OMS 2002

⁹Programme national de lutte contre le SIDA 2002

¹⁰Ministère de la santé 2002

GE-6 : Prévention de la transmission mère-enfant—Prophylaxie antirétrovirale				
Pays	2003		2005	
	Rapport national UNGASS 2003 [*]	Enquête de couverture ^{**}	Rapport national UNGASS 2005 [†]	Enquête de couverture ^{††}
	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale complète pour réduire le risque de transmission mère-enfant	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale complète pour réduire le risque de transmission mère-enfant	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale
Afrique subsaharienne				
Angola		0.0	2.3	
Bénin	0.0 ¹	94.0	18.0	38.0
Botswana	34.0	18.8		
Burkina Faso	<1.0	0.1		1.1
Burundi		1.2	13.2	2.4
Cameroon		6.9		4.2
République centrafricaine			16.4 ¹⁰	
Tchad	0.0 ¹		-	0.2
Congo		13.3	98.6	
Congo, République démocratique du	0.0 ¹	0.6		
Côte d'Ivoire		1.5	4.4	4.3
Erythrée		0.9		
Ethiopie	<1.0	0.2	3.0	0.3
Gabon			10.7	0.7
Gambie		2.8		16.6
Ghana		1.3	0.5	1.3
Guinée		0.0		0.4
Guinée-Bissau			19.5	
Kenya	1.0	3.4	9.3	27.0
Lesotho			5.3 ¹⁰	5.1
Madagascar			0.0 ¹⁰	0.0
Malawi	<1.0	1.7	2.3 ¹⁰	
Mali		0.5	0.7	0.8
Mauritanie				
Maurice	100.0	40.4		
Mozambique		1.3	4.9	3.4
Namibie	7.0	1.3	25.0	17.4
Niger	0.0 ¹			
Nigéria	<1.0	0.1		0.2
Rwanda		13.8	9.4	
Sénégal		0.4		1.4
Seychelles	100.0		97.7 ¹⁰	
Sierra Leone	0.0			
Somalie			3.3	
Afrique du Sud	<1.0 ¹	8.9	78.7	14.6
Swaziland		1.7	16.2	11.9
Tanzanie, République-Unie de	0.0	0.3		
Togo		0.3	32.8	1.8
Ouganda	4.6	6.6	12.0	25.9
Zambie		6.3	25.0	4.0
Zimbabwe		4.1	6.6 ¹⁰	4.4
Asie de l'Est et Pacifique				
Chine		0.4		1.3
Mongolie	0.0			
Samoa	0.0 ⁴			

GE-6 : Prévention de la transmission mère-enfant—Prophylaxie antirétrovirale

Pays	2003		2005*	
	Rapport national UNGASS 2003*	Enquête de couverture**	Rapport national UNGASS 2005†	Enquête de couverture††
	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale complète pour réduire le risque de transmission mère-enfant	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale complète pour réduire le risque de transmission mère-enfant	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale
Océanie				
Fidji			25.0 ¹⁰	
Asie du Sud et du Sud-Est				
Afghanistan	0.0 ²			
Bhoutan		25.7		
Cambodge	2.7 ³	0.3	5.0	1.4
Inde	<1.0	0.0		1.6
Indonésie		0.5		0.7
Iran, République islamique de		25.7		
Lao, République démocratique populaire		0.0		2.5
Malaisie	0.0 ¹	6.2		6.1
Myanmar	2.0			
Népal	2.1 ¹	0.7		0.9
Philippines		0.5		0.4
Thaïlande		33.3	83.4 ¹⁰	30.6
Viet Nam	2.3	1.7		
Europe orientale et Asie centrale				
Arménie	3.0			
Bélarus	87.5	9.4		
Kazakhstan	4.5	2.2		9.0
Kirghizistan	0.0 ⁸			
Lettonie		9.2		58.6
Moldova, République de	0.0 ⁹	3.5		
Roumanie			0.2 ¹¹	
Fédération de Russie	12.0			14.6
Tadjikistan	0.0			
Ukraine	49.6 ⁴	21.3	86.7 ¹⁰	31.8
Afrique du Nord et Moyen-Orient				
Egypte				7.3
Maroc	1.0 ¹	1.5		
Oman		0.0		
Soudan				0.0
Caraïbes				
Antigua-et-Barbuda			50.2	
Barbade	0.0 ¹	38.7	90.0 ¹⁰	
Cuba	2.5 ⁵	19.8		
Dominique			100.0	
République dominicaine	0.0 ¹	14.2		15.7
Haïti	0.0 ¹	1.6		
Jamaïque				
Sainte-Lucie			20.0	
Saint-Vincent-et-Grenadines			61.6	
Trinité-et-Tobago	0.0 ¹	35.6	71.4 ¹⁰	

GE-6 : Prévention de la transmission mère-enfant—Prophylaxie antirétrovirale

Pays	2003		2005*	
	Rapport national UNGASS 2003 [†]	Enquête de couverture ^{**}	Rapport national UNGASS 2005 [†]	Enquête de couverture ^{††}
	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale complète pour réduire le risque de transmission mère-enfant	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale complète pour réduire le risque de transmission mère-enfant	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui reçoivent une prophylaxie antirétrovirale
Amérique latine				
Argentine	55.0	11.8	87.0	0.0
Belize	70.0	19.0	73.3	
Brésil	33.6	26.2	57.6 ¹⁰	16
Chili		10.8		
Colombie				1.8
Equateur				8.3
El Salvador		21.1		20.8
Guatemala	10.0	3.7		
Guyana	<1.0	14.5		17.6
Honduras		1.9	3.4	
Mexique		3.5		2.1
Nicaragua		1.1		
Panama	0.0 ¹	7.5		0.0
Paraguay	40.0 ¹		2.1	
Pérou	14.8 ³	9.6		3.5
Uruguay	97.8 ³	56.9	19.3	
Venezuela (République bolivarienne du)	0.0 ⁶ 4.2			
Pays à revenu élevé				
Chypre	100.0 ⁷			
Allemagne			80.0	
Guam	0.0 ³			
Qatar	0.0 ⁴			
	(N = 103)	(N = 53)	(N = 45)	(N = 51)

*Le rapport est daté de 2003, mais la collecte peut varier entre 2002 et 2003

**Les données sont des estimations pour 2003 fondées sur les informations les plus récentes disponibles à ce moment

†Le rapport est daté de 2005, mais la collecte peut varier entre 2003 et 2005

†† Les données sont des estimations pour 2003 fondées sur les informations les plus récentes disponibles

(-) = En analyse au moment de l'impression

¹OMS 2002²Bureau de l'OMS dans le pays³Programme national de lutte contre le SIDA 2002⁴Ministère de la santé 2002⁵Cible nationale 2002⁶Rapport mondial sur le VIH/SIDA 2002⁷Département des services médicaux et sanitaires⁸Enquête EURO 2002⁹Programme national de lutte contre le SIDA 2003¹⁰Données 2004¹¹Données 2003

GE-7 : Traitement du VIH—Thérapie par association d'antirétroviraux

Pays	2003		2005			
	Rapport national UNGASS 2003 [†]	Rapport national UNGASS 2005 ^{**}			3 millions d'ici 2005, décembre 2005	Enquête de couverture 2005 [†]
		Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée bénéficiant d'une thérapie par association d'antirétroviraux			Estimation de la couverture par la thérapie antirétrovirale, décembre 2005	Estimation de la couverture
		Tous	Hommes	Femmes		
Afrique subsaharienne						
Angola	<1.0 ¹				6.0	
Bénin	2.5 ²				33.0	32.7
Botswana	7.9				85.0	
Burkina Faso	1.4				24.0	8.9
Burundi	1.9 ²				14.0	9.5
Cameroun	1.5 ³	17.8			22.0	3.8
République centrafricaine	<1.0 ³	4.2	4.4	4.0	3.0	
Tchad		-	-	-	17.0	4.7
Congo					17.0	
Congo, République démocratique du	0.0 ²	2.7			4.0	
Côte d'Ivoire	2.7	22.1	19.3	24.6	17.0	4.9
Djibouti	1.8 ⁶				16.0	
Guinée équatoriale	6.8 ¹				0.0	
Erythrée	<1.0 ¹				5.0	
Ethiopie	<1.0 ¹	7.1	8.2	6.2	7.0	7.7
Gabon		-	-	-	23.0	64.3
Gambie	6.3 ¹				10.0	1.2
Ghana	1.8 ¹	5.0	5.6	4.6	7.0	4.8
Guinée					9.0	9.4
Guinée-Bissau		-	-	-	1.0	
Kenya	3.0	19.7			24.0	17.0
Lesotho	<1.0 ¹				14.0	13.6
Libéria					3.0	
Madagascar		0.4			0.0	0.2
Malawi	1.8	17.7	14.9	19.7	20.0	
Mali	2.5 ¹⁴	11.0	16.8	8.1	32.0	
Mauritanie					40.0	
Maurice	100.0					
Mozambique	0.0 ¹	7.4	7.4	7.4	9.0	8.5
Namibie	0.0 ¹	35.0			71.0	58.6
Niger					5.0	
Nigéria	1.5	7.0			7.0	5.7
Rwanda	<1.0	-	-	-	39.0	
Sénégal	<1.0 ²				47.0	52.3
Seychelles	68.2		78.0 ¹⁷	87.0 ¹⁷		
Sierra Leone	0.0 ¹				2.0	
Somalie		0.8	0.6	1.1	1.0	
Afrique du Sud	0.0 ¹				21.0	13.0
Swaziland	1.7	44.4			31.0	29.7
Tanzanie, République-Unie de	<1.0				7.0	
Togo		-	-	-	27.0	19.6
Ouganda	6.3	56.0			51.0	57.4
Zambie	0.0 ¹	20.0			27.0	19.3
Zimbabwe	0.0 ¹				8.0	9.1
Asie de l'Est et Pacifique						
Chine	5.0 ³				25.0	18.3
Micronésie, Etats fédérés de		0.0	0.0	0.0		

GE-7 : Traitement du VIH—Thérapie par association d'antirétroviraux						
Pays	2003	2005				
	Rapport national UNGASS 2003 [†]	Rapport national UNGASS 2005 ^{**}			3 millions d'ici 2005, décembre 2005	Enquête de couverture 2005 [†]
		Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée bénéficiant d'une thérapie par association d'antirétroviraux	Tous	Hommes	Femmes	Estimation de la couverture par la thérapie antirétrovirale, décembre 2005
Mongolie					0.0	
Samoa	100.0 ¹³					
Tonga	0.0 ⁶					
Océanie						
Fiji			100.0 ¹⁷	100.0 ¹⁷		
Papouasie-Nouvelle-Guinée	0.0 ¹				15.0	
Palaos		33.3	0.0	50.0		
Asie du Sud et du Sud-Est						
Afghanistan	0.0 ⁴				0.0	
Bangladesh	0.0 ¹				1.0	8.9
Bhoutan						
Cambodge	3.0 ⁵	57.0			36.0	35.1
Inde	2.0				7.0	6.8
Indonésie	2.7 ¹				30.0	94.3
Iran, République islamique d'	100.0 ¹	12.7			9.0	
Lao, République démocratique populaire					49.0	84.5
Malaisie					27.0	87.3
Maldives					0.0	
Myanmar	<1.0				7.0	
Népal					1.0	11.1
Pakistan	2.2 ¹				2.0	1.2
Philippines	3.5 ¹				5.0	100.0
Sri Lanka	2.0 ³				6.0	
Thaïlande	4.0 ⁶	39.2 ¹⁷			60.0	57.9
Viet Nam	1.0				12.0	58.9
Europe orientale et Asie centrale						
Arménie	0.0 ⁹				15.0	
Azerbaïdjan	0.0 ⁹				0.0	
Bélarus	<1.0				5.0	
Bosnie-Herzégovine	10.0 ⁹					
Bulgarie	44.5 ⁹					
Croatie	98.7 ⁹					100.0
République tchèque						
Estonie	32.0 ⁹				17.0	
Géorgie	8.0 ⁹	98.5	99.0	100.0	49.0	
Hongrie	97.0 ⁹					
Kazakhstan	1.0				15.0	43.1
Kirghizistan	0.0 ¹⁰				12.0	
Lettonie	51.0 ⁹				31.0	36.8
Lituanie	55.0 ⁹				64.0	
Moldova, République de	8.3 ¹				39.0	100.0
Pologne	92.9 ⁹				100.0	
Roumanie	64.4 ⁹					100.0
Fédération de Russie	83.3 ¹				5.0	3.7
Slovaquie	95.0 ⁹					
Tadjikistan	0.0				16.0	
Turkménistan					0.0	

GE-7 : Traitement du VIH—Thérapie par association d'antirétroviraux

Pays	2003		2005			
	Rapport national UNGASS 2003 [†]	Rapport national UNGASS 2005 ^{**}			3 millions d'ici 2005, décembre 2005	Enquête de couverture 2005 [†]
		Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée bénéficiant d'une thérapie par association d'antirétroviraux			Estimation de la couverture par la thérapie antirétrovirale, décembre 2005	Estimation de la couverture
		Tous	Hommes	Femmes		
Ukraine	<1.0 ⁸	33.5	29.1	41.0	7.0	7.3
Ouzbékistan	0.0 ⁹				0.0	
Afrique du Nord et Moyen-Orient						
Algérie					39.0	
Egypte					12.0	7.5
Irak						
Jordanie	21.3				45.0	
Liban	100.0 ⁶				36.0	
Jamahiriya arabe libyenne					35.0	
Maroc	20.7				48.0	100.0
Oman						
Soudan	<1.0 ¹				1.0	0.0
République arabe syrienne					9.0	
Tunisie					34.0	100.0
Turquie			26.0 ¹⁷	23.5 ¹⁷	9.0	
Yémen					0.0	
Europe occidentale						
Albanie	0.0 ⁹					100.0
Macédoine, Ex-République yougoslave de	20.0 ⁹					
Serbie-Monténégro	26.4 ⁹					
Slovénie	96.3 ⁹					
Caraïbes						
Antigua-et-Barbuda		60.0				
Barbade					95.0	
Cuba					100.0	
Dominique		36.7				
République dominicaine	0.0 ³				17.0	13.7
Haïti					20.0	
Jamaïque	<1.0 ²				56.0	
Sainte-Lucie		80.6				
Saint-Vincent-et-Grenadines		100.0				
Trinité-et-Tobago	<1.0 ²	97.0			38.0	
Amérique latine						
Argentine	91.2	100.0			81.0	100.0
Belize	7.7				31.0	
Bolivie	<1.0 ¹				37.0	
Brésil	100.0				83.0	100.0
Chili					75.0	
Colombie					44.0	94.7
Costa Rica					80.0	
Equateur					42.0	54.9
El Salvador					59.0	61.7
Guatemala	46.0				43.0	35.1
Guyana	0.0 ¹				50.0	100.0
Honduras	<1.0 ¹	36.5	26.0	53.7	35.0	
Mexique	92.0				71.0	100.0

GE-7 : Traitement du VIH—Thérapie par association d'antirétroviraux						
Pays	2003	2005				
	Rapport national UNGASS 2003 [†]	Rapport national UNGASS 2005 ^{**}			3 millions d'ici 2005, décembre 2005	Enquête de couverture 2005 [†]
		Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée bénéficiant d'une thérapie par association d'antirétroviraux	Tous	Hommes	Femmes	Estimation de la couverture par la thérapie antirétrovirale, décembre 2005
Nicaragua	0.0 ¹					
Panama					97.0	100.0
Paraguay	50.0				29.0	54.7
Pérou	19.2 ⁷				52.0	76.1
Suriname					55.0	
Uruguay	50.5 ⁷				69.0	
Venezuela					84.0	100.0
Pays à revenu élevé						
Australie	53.2 ¹⁶					
Autriche	92.6 ⁹					
Bahamas	<1.0 ¹					
Belgique	93.8 ⁹					
Chypre	100.0 ¹¹					
Danemark	90.9 ⁹					
Finlande	94.6 ⁹					
Allemagne	94.7 ⁹					
Hong-Kong (région administrative spéciale de Chine)	100.0 ¹					
Islande	87.5 ⁹					
Italie	72.7 ⁹					
Corée, République populaire démocratique de					0.0	
Luxembourg	96.9 ⁹					
Malte	94.3 ⁹					
Pays-Bas	96.0 ⁹					
Norvège	89.6 ⁹					
Qatar	64.9 ¹²					
Arabie saoudite					14.0	
Singapour	0.0 ¹⁵					
Espagne	92.3 ⁹					
Suède	95.0 ⁹					
Suisse	95.0 ⁹					
Royaume-Uni	92.1 ⁹					
Etats-Unis		70.1 ¹⁸				
	(N = 163)	(N = 114)	(N = 41)		(N = 118)	(N = 61)

¹Rapport daté de 2003, mais la collecte des données a été faite entre 2002 et 2003

^{**}Rapport daté de 2005, mais la collecte des données a été faite entre 2003 et 2005

[†]Les données sont des estimations pour 2005, fondées sur l'information la plus récente disponible

(-) = En analyse au moment de l'impression

¹OMS 2002

²Initiative accélérer l'accès 2002

³Cible nationale 2002

⁴Bureau de l'OMS dans le pays

⁵Centre national pour le VIH/SIDA, la dermatologie et les IST 2002

⁶Programme national de lutte contre le SIDA 2003

⁷Programme national de lutte contre le SIDA 2002

⁸Ministère de la santé, OMS 2002

⁹Enquête OMS EURO sur l'accès aux ARV 2003

¹⁰Enquête EURO 2002

¹¹Dépt. des services médicaux et sanitaires

¹²Registre VIH 2002

¹³Ministère de la santé 2002

¹⁴OMS 2003

¹⁵Ministère de la santé

¹⁶Rapport annuel de surveillance

¹⁷Données 2004

¹⁸Données 2003

GE-8 : Appui aux enfants affectés par le VIH/SIDA								
Pays	2005							
	Rapports nationaux UNGASS 2005*							
	Pourcentage d'orphelins et d'enfants vulnérables dont le foyer bénéficie d'un appui extérieur essentiel gratuit pour la prise en charge de l'enfant							
	Rural			Urbain				
Garçons	Filles	Tous	Garçons	Filles	Tous	Tous		
Afrique subsaharienne								
Congo	-	-	-	-	-	-	-	
Ethiopie	2.9	2.8	2.9	7.1	5.8	6.4	3.6	
Kenya	6.6	6.4	6.5	10.3	18.1	14.0	10.3	
Lesotho								25.0
Madagascar								7.4
Mali	-	-	-	-	-	-	-	
Togo								9.7
Zambie								13.4
	(N = 8)			(N = 8)				

*Rapport daté de 2005, mais la collecte des données a été faite entre 2003 et 2005

(-) = En analyse au moment de l'impression

GE-9 : Sécurité transfusionnelle		
Pays	2001	2005
	Enquête de couverture*	Rapports nationaux UNGASS 2005**
	Dons de sang contrôlés pour le VIH	Pourcentage d'unités de sang transfusées contrôlées pour le VIH
Afrique subsaharienne		
Angola	100.0	
Bénin	100.0	100.0
Botswana	100.0	
Burkina Faso	85.0	
Burundi	100.0	100.0
République centrafricaine	80.0	
Tchad	90.0	-
Congo	80.0	100.0
Congo, République démocratique du	70.0	
Côte d'Ivoire	100.0	100.0
Ethiopie	100.0	100.0
Erythrée	100.0	
Gabon		72.5
Gambie	100.0	
Ghana	100.0	
Guinée	100.0	
Guinée-Bissau		100.0
Kenya	98.0	100.0
Lesotho		100.0
Libéria	80.0	
Madagascar	100.0	99.4
Malawi		100.0
Mali	100.0	100.0
Mauritanie	80.0	
Maurice	100.0	
Mozambique	100.0	100.0
Namibie	100.0	100.0
Niger	100.0	
Nigéria		100.0
Rwanda	100.0	
Sénégal	100.0	
Seychelles	100.0	
Sierra Leone	20.0	
Afrique du Sud	100.0	100.0
Swaziland	100.0	100.0
Tanzanie, République-Unie de	100.0	
Togo	100.0	79.0
Ouganda	100.0	100.0
Zambie	100.0	100.0
Zimbabwe	100.0	100.0
Asie de l'Est et Pacifique		
Chine	100.0	
Océanie		
Fidji		100.0
Micronésie, Etats fédérés de		100.0
Palaos		100.0
Papouasie-Nouvelle-Guinée	0.0	
Asie du Sud et du Sud-Est		
Bangladesh	10.0	
Bhoutan	10.0	
Cambodge	100.0	100.0
Inde	100.0	

GE-9 : Sécurité transfusionnelle		
Pays	2001	2005
	Enquête de couverture*	Rapports nationaux UNGASS 2005**
	Dons de sang contrôlés pour le VIH	Pourcentage d'unités de sang transfusées contrôlées pour le VIH
Indonésie	100.0	
Iran, République islamique d'		100.0
Malaisie	100.0	
Myanmar	35.0	
Népal	99.0	
Pakistan	95.0	
Sri Lanka	100.0	100.0
Thaïlande	100.0	100.0
Viet Nam	100.0	
Europe orientale et Asie centrale		
Bélarus	100.0	
Croatie	100.0	
Lettonie	100.0	
Moldova, République de	100.0	
Roumanie	100.0	
Fédération de Russie	100.0	
Ukraine	100.0	100.0
Ouzbékistan	100.0	
Afrique du Nord et Moyen-Orient		
Algérie		98.9
Maroc	100.0	
Tunisie	100.0	
Caraïbes		
Antigua-et-Barbuda		100.0
Bahamas	100.0	
Barbade	100.0	
Cuba	100.0	
Dominique		92.8
République dominicaine	100.0	
Sainte-Lucie		96.0
Saint-Vincent-et-Grenadines		99.7
Trinité-et-Tobago	0.0	100.0
Amérique latine		
Argentine	96.0	100.0
Belize	100.0	96.8
Bolivie	35.0	
Brésil	100.0	
Chili	100.0	
Colombie	100.0	
Costa Rica	100.0	
Equateur	100.0	
El Salvador	100.0	
Guatemala	100.0	
Guyana	100.0	
Honduras	100.0	
Jamaïque	100.0	
Mexique	100.0	
Nicaragua	100.0	
Panama	100.0	
Paraguay	98.0	
Pérou	0.0	100.0
Suriname	100.0	

GE-9 : Sécurité transfusionnelle		
Pays	2001	2005
	Enquête de couverture*	Rapports nationaux UNGASS 2005**
	Dons de sang contrôlés pour le VIH	Pourcentage d'unités de sang transfusées contrôlées pour le VIH
Uruguay	100.0	
Venezuela	100.0	
Pays à revenu élevé		
Bahamas	100.0	
Etats-Unis		100.0
(N = 100)	(N = 85)	(N = 40)

* Les données sont des estimations pour 2001 fondées sur les informations les plus récentes à ce moment-là

**Le rapport est daté de 2005, mais la collecte des données a été faite entre 2004 et 2005

(-) = En analyse au moment de l'impression

GE-10 : Jeunes—Connaissances relatives à la prévention du VIH														
Pays	2003			2005									Enquête démographique et de santé ^{a,b} (sauf indication contraire)	
	Rapports nationaux UNGASS 2003			Rapports nationaux UNGASS 2005 ^a										
	Pourcentage de jeunes femmes (15–24 ans) ayant des connaissances globales concernant le VIH/SIDA			Pourcentage de jeunes femmes et hommes (15–24 ans) ayant des connaissances globales concernant le VIH/SIDA									Pourcentage de jeunes femmes et hommes (15–24 ans) ayant des connaissances globales concernant le VIH/SIDA	
	Femmes			Hommes			Femmes			Tous			Hommes	Femmes
	Z. urb.	Z. rur.	Toutes	Z. urb.	Z. rur.	Tous	Z. urb.	Z. rur.	Toutes	Z. urb.	Z. rur.	Tous		
Afrique subsaharienne														
Angola				56.7	10.0	42.7	46.3	10.5	35.2	51.5	10.3	39.0		
Bénin				7.9	13.1	10.6	3.4	11.8	8.1	5.7	12.4	9.3	14.0	8.0
Botswana	25.2	29.8	27.9										33.0 [†]	40.0 [†]
Burkina Faso													23.0	15.0
Burundi	40.0	21.0	24.0	0.6	3.9	3.6	0.3	3.8	3.6	0.4	3.9	3.6		
Cameroun	24.0	7.0	16.0	40.6	24.8	34.3	36.5	14.5	27.2	37.8	17.5	30.8	34.0	27.0
République centrafricaine	1.5	8.7	5.1											
Tchad	2.3	12.2	5.0										21.0	8.0
Comores	9.8	10.4	9.9											
Congo				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Côte d'Ivoire	19.0	6.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Guinée équatoriale	1.1	6.1	3.8											
Erythrée														37.0
Ethiopie				56.7	25.1		44.4	14.0						
Gambie	20.0	11.0	15.0											
Ghana				54.4	28.8	40.3	43.8	29.3	35.8	48.2	29.0	38.0	44.0	38.0
Guinée-Bissau	16.0	2.0	8.0											
Kenya	35.0	22.0	26.0	77.8	80.0	79.5	61.5	57.1	58.3	68.2	66.7	68.9	47.0	34.0
Lesotho	27.0	16.0	18.0											
Madagascar						15.7			19.4				16.0	19.0
Malawi	44.0	31.0	34.0	43.3	34.4	36.0	30.9	22.0	23.5	33.7	24.3	29.8		
Mali				-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	9.0
Mozambique													33.0	20.0
Niger	17.0	2.0	5.0											
Nigéria				33.6	19.8		30.5	14.8					21.0	18.0
Rwanda	40.0	23.0	23.0											
Sao Tomé-et-Principe	13.0	7.0	11.0											
Sierra Leone	22.0	10.0	16.0											
Somalie				13.6	11.9	12.5	9.6	7.0	7.9	11.5	9.4	10.2		
Afrique du Sud	26.0	13.0	20.0											
Swaziland	26.1	28.4	26.9											
Tanzanie, République-Unie de	42.0	22.0	26.0										49.0 [†]	44.0 [†]
Togo	21.0	13.0	20.0											
Ouganda	48.0	23.0	28.0											
Zambie	32.0	20.9	25.6			46.1			40.5				33.0	31.0
Zimbabwe				57.7	55.5	56.3	57.8	51.4	54.1	57.7	53.4	55.2		

GE-10 : Jeunes—Connaissances relatives à la prévention du VIH														
Pays	2003			2005									Enquête démographique et de santé ^{z,tt} (sauf indication contraire)	
	Rapports nationaux UNGASS 2003			Rapports nationaux UNGASS 2005 ^o										
	Pourcentage de jeunes femmes (15–24 ans) ayant des connaissances globales concernant le VIH/SIDA			Pourcentage de jeunes femmes et hommes (15–24 ans) ayant des connaissances globales concernant le VIH/SIDA									Pourcentage de jeunes femmes et hommes (15–24 ans) ayant des connaissances globales concernant le VIH/SIDA	
	Femmes			Hommes			Femmes			Tous			Hommes	Femmes
Z. urb.	Z. rur.	Toutes	Z. urb.	Z. rur.	Tous	Z. urb.	Z. rur.	Toutes	Z. urb.	Z. rur.	Tous			
Asie de l'Est et Pacifique														
Mongolie	28.1	36.9	32.1	4.1	2.2	3.0	5.5	4.6	5.0	4.8	3.4	4.0		
Asie du Sud et du Sud-Est														
Cambodge	52.0	33.0	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Indonésie	4.2	10.2	6.8											
Thaïlande				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Viet Nam	20.8	41.3	25.4										50.0 ^t	42.0 ^t
Europe orientale et Asie centrale														
Azerbaïdjan	0.8	3.2	2.1											
Moldova, République de	16.2	22.7	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fédération de Russie													48.0	
Ukraine				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ouzbékistan	2.6	5.3	3.4										7.0	8.0
Europe occidentale														
Albanie	0.3	0.0	0.2											
Afrique du Nord et Moyen-Orient														
Maroc														12.0
Caraïbes														
Barbade														1.0
Cuba	40.2	56.2	51.8											
République dominicaine	33.0	23.0	33.0											
Haiti	24.0	8.0	14.0											
Trinité-et-Tobago			33.0											
Amérique latine														
Bolivie	9.3	29.2	21.6											18.0
Brésil													58.4	
Guyana	35.2	36.4	35.6											
Suriname	21.0	36.8	26.5											
	(N = 57)			(N = 38)			(N = 24)			(N = 18)				

^tRapport daté de 2005, mais la collecte des données a été faite entre 2003 et 2005

^{tt}Chiffres pour 2005 fondés sur des données recueillies entre 2001 et 2005

^oSource: Enquête sur les indicateurs SIDA

(-) = En analyse au moment de l'impression

GE-11 : Rapports sexuels avant l'âge de 15 ans									
Pays	2005								
	Rapports nationaux UNGASS 2005*							Enquête démographique et de santé (sauf indication contraire)	
	Pourcentage des 15–24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans							Pourcentage des 15–19 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	
	Hommes			Femmes			Tous	Femmes	Hommes
	Z. urb.	Z. rur.	Tous	Z. urb.	Z. rur.	Toutes	Tous		
Afrique subsaharienne									
Angola	40.9	60.0	46.7	21.7	30.0	24.3	35.5		
Bénin	15.7	15.7	15.7	9.9	7.5	8.5	12.1	16.0	23.8
Burkina Faso								7.3	4.7
Burundi	14.3	14.0	14.0	2.5	5.7	5.5	9.7		
Cameroun	23.4	22.3	23.0	28.8	42.5	34.6	28.8	18.0	11.5
République centrafricaine	8.2	10.7	9.6	12.3	8.1	9.9	9.8		
Tchad	-	-	-	-	-	-	-	19.0	11.0
Congo	10.0	10.4	10.1	10.0	9.9	9.9	10.0		
Côte d'Ivoire			13.3			14.5	14.1		
Erythrée								8.8	
Ethiopie	47.1	38.5	40.3	49.7	39.5	41.5	40.9		
Gabon	35.1			18.6					
Ghana								7.4	3.9
Guinée	16.5	15.0	15.7	23.0	14.4	17.6	16.6		
Kenya	23.7	19.5	20.4	19.6	16.2	17.1	18.7	14.5	30.9
Lesotho	27.9	27.3	27.5	9.5	16.2	14.4	20.9		
Madagascar			22.3			31.0		16.0	7.7
Mali								26.0	10.6
Mauritanie								13.2	2.1
Mozambique								27.7	
Nigéria			4.9			14.7		20.3	7.9
Tanzanie, République-Unie de								10.1 ¹	10.7 ¹
Ouganda								12.2 ¹	16.3 ¹
Zambie								17.5	
Zimbabwe	6.3	9.7	8.5	5.8	9.8	8.1	8.3		
Asie de l'Est et Pacifique									
Mongolie	5.7	1.1	3.0	0.3	0.0	0.1	1.6		
Asie du Sud et du Sud-Est									
Cambodge	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1		
Népal								9.0	20.0
Thaïlande			10.9			6.6	8.7		
Viet Nam								0.5 ¹	0.3 ¹
Europe orientale et Asie centrale									
Azerbaïdjan								1.0 ²	
Moldova, République de	45.8	26.6	34.1	30.9	19.0	23.5	28.8		
Fédération de Russie			17.2			8.2	13.3		
Caraïbes									
Barbade			35.9			25.6	31.0		
République dominicaine								13.0	18.0
Honduras								13.0 ²	19.0 ²
Saint-Vincent-et-Grenadines			63.0			37.0			

GE-11 : Rapports sexuels avant l'âge de 15 ans										
Pays	2005									
	Rapports nationaux UNGASS 2005*							Enquête démographique et de santé** (sauf indication contraire)		
	Pourcentage des 15–24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans							Pourcentage des 15–19 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans		
	Hommes			Femmes			Tous	Femmes	Hommes	
	Z. urb.	Z. rur.	Tous	Z. urb.	Z. rur.	Toutes	Tous			
Amérique latine										
Argentine								22.6		
Bolivie									6.0	15.0
Equateur									7.0 ²	
Guatemala									7.0 ²	15.0 ²
Nicaragua									11.0	
	(N = 42)			(N = 24)					(N = 24)	

*Rapport daté de 2005, mais la collecte des données s'est faite entre 2003 et 2005

**Les données pour 2005 sont fondées sur des données recueillies entre 2001 et 2005

(-) = En analyse au moment de l'impression

¹Source: Enquête sur les indicateurs SIDA

² Enquête sur la santé reproductive

GE-12 : Rapports sexuels à risque plus élevé parmi les jeunes femmes et hommes

Pays	2003		2005									Enquête démographique et de santé [†] (sauf indication contraire)	
	Rapports nationaux UNGASS 2003*		Rapports nationaux UNGASS 2005**										
	Pourcentage de jeunes hommes et femmes (15–24 ans) qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal noncohabitant au cours des 12 derniers mois		Pourcentage de jeunes hommes et femmes (15–24 ans) qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal noncohabitant au cours des 12 derniers mois									Pourcentage des répondants entre 15 et 24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal noncohabitant au cours des 12 derniers mois par rapport à l'ensemble des répondants qui déclarent une activité sexuelle au cours des 12 derniers mois	
			Z. urb.			Z. rur.			Tous				
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes
Afrique subsaharienne													
Angola			61.5	35.6	49.2	61.1	26.3	43.2	61.4	32.7	47.1		
Bénin			31.0	2.0	9.6	32.6	4.5	13.0	31.8	3.4	17.6	90.0	36.0
Burkina Faso	82.0	19.0										78.0	23.0
Cameroun	86.0	41.0	95.2	57.2	68.6	82.0	27.3	40.1	89.9	44.7	67.3	91.0	44.0
République centrafricaine			42.1	9.4	22.9	40.2	13.7	27.1	41.0	11.9	26.5		
Tchad			-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.0	7.0
Congo			72.0	63.5	67.6	72.0	65.4	68.6	72.0	64.7	68.4		
Côte d'Ivoire	91.0	51.0							57.9	64.3	61.0		
Ethiopie	64.0	7.0	43.5	24.8	30.1	36.5	3.0	12.0	37.9	7.4	22.7		
Ghana												83.0	50.0
Guinée	92.0	23.0											
Kenya	92.0	39.0	13.5	9.8	11.5	16.1	8.2	12.2	15.5	8.6	12.1	84.0	30.0
Lesotho			96.4	57.6	67.4	87.6	38.0	52.5	89.5	43.3	66.4		
Madagascar									71.9	30.9		72.0	31.0
Malawi	71.0	17.0							62.1	13.9			
Mali			100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	16.0	17.0	16.5	85.0	18.0
Mozambique												84.0	37.0
Nigéria			90.5	42.9		73.0	27.7					78.0	29.0
Rwanda	42.0	10.0											
Tanzanie, République-Unie de	87.0	40.0										81.0	36.0
Togo	89.0	51.0											
Ouganda	59.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.0	26.0
Zambie									24.0	13.0		86.0	30.0
Zimbabwe	82.0	20.0	75.0	21.3	40.2	80.7	24.8	47.6	78.6	23.3	51.0		
Asie de l'Est et Pacifique													
Mongolie			93.5	76.4	86.6	93.4	81.1	88.9	93.5	79.2	86.3		

GE-12 : Rapports sexuels à risque plus élevé parmi les jeunes femmes et hommes														
Pays	2003		2005											
	Rapports nationaux UNGASS 2003 ^a		Rapports nationaux UNGASS 2005 ^{**}									Enquête démographique et de santé [†] (sauf indication contraire)		
	Pourcentage de jeunes hommes et femmes (15–24 ans) qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal noncohabitant au cours des 12 derniers mois		Pourcentage de jeunes hommes et femmes (15–24 ans) qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal noncohabitant au cours des 12 derniers mois									Pourcentage des répondants entre 15 et 24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal noncohabitant au cours des 12 derniers mois par rapport à l'ensemble des répondants qui déclarent une activité sexuelle au cours des 12 derniers mois		
			Z. urb.			Z. rur.			Tous					
Hommes Femmes		Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes		
Asie du Sud et du Sud-Est														
Cambodge		72.0	5.4	38.9	18.2	2.1	7.2	26.3	2.6	14.4				
Inde											12.0 ²	2.0 ²		
Thaïlande											56.0			
Viet Nam											21.0 ¹	0.7 ¹		
Europe orientale et Asie centrale														
Ouzbékistan											45.0 ³	1.0 ³		
Caraïbes														
Barbade								26.6	15.9	21.6				
République dominicaine											83.0	29.0		
Amérique latine														
Bolivie											70.0	32.0		
Nicaragua												10.0		
(N = 34)		(N = 12)					(N = 21)						(N = 19)	

^aRapport daté de 2003, mais la collecte des données a pu être faite entre 1998 et 2000

^{**}Rapport daté de 2005, mais la collecte des données a pu être faite entre 2003 et 2005

[†]Les données pour 2005 sont fondées sur des données recueillies entre 2001 et 2005

¹Source: Enquête sur les indicateurs SIDA

²Source: Enquête de surveillance comportementale

³Source: Enquête concernant les examens de santé

GE-13 : Jeunes—Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers														
Pays	2003		2005											
	Rapports nationaux UNGASS 2003*		Rapports nationaux UNGASS 2005**									Enquête démographique et de santé† (sauf indication contraire)		
	Pourcentage de jeunes (15–24 ans) qui ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier		Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15–24 ans qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier									Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15–24 ans qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier		
			Z. urb.			Z. rur.			Tous					
		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes
Afrique subsaharienne														
Angola			63.6	71.2	66.2	63.6	20.0	50.0	63.6	55.2	59.4			
Bénin	34.0	19.0	53.3	25.0	49.1	65.1	71.4	66.7	59.5	50.8	55.2	34.0	19.0	
Botswana	88.0	75.0										88.0 ¹	75.0 ¹	
Burkina Faso	55.0	41.0										67.0	54.0	
Burundi			50.0	7.1	20.0	55.7	48.7	51.1	55.2	46.0	50.6			
Cameroun	31.0	16.0	65.7	53.6	58.6	39.9	27.2	33.3	55.4	42.5	49.0	57.0	46.0	
République centrafricaine			84.1	79.4	83.0	82.5	46.7	72.7	83.2	60.6	71.9			
Tchad			-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	17.0	
Congo, République démocratique du		12.0												
Côte d'Ivoire	56.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ethiopie	30.0	17.0	84.4	46.3	69.5	23.3	6.7	19.5	36.1	14.6	25.4			
Erythrée												81.0		
Gabon	48.0	33.0												
Ghana	33.0	20.0	55.5	38.5	45.9	44.7	27.1	35.9	49.6	32.2	40.9	52.0	33.0	
Guinée	32.0	17.0										42.0	27.0	
Kenya	43.0	14.0	58.4	32.5	45.9	42.6	22.6	33.2	46.1	25.2	35.6	47.0	25.0	
Lesotho			72.0	65.6	67.9	42.0	44.0	43.0	48.6	49.8	49.2	48.0	50.0	
Madagascar												12.0	5.0	
Malawi	38.0	32.0	56.5	51.8	53.8	43.2	29.2	35.6	45.6	33.0	39.3	47.0	35.0	
Mali	30.0	14.0										30.0	14.0	
Mozambique												33.0	29.0	
Nigéria	38.0	21.0	66.8	50.9		54.1	34.1					46.0	24.0	
Rwanda	55.0	23.0										41.0	28.0	
Sénégal												54.0	34.0	
Afrique du Sud		20.0												
Tanzanie, République-Unie de	31.0	21.0										47.0 ²	42.0 ²	
Togo	41.0	22.0												
Ouganda	62.0	44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.0 ²	53.0 ²	
Zambie	38.0	38.0							38.4	26.1		40.0 ³	35.0 ³	
Zimbabwe	69.0	42.0	69.2	52.1	63.2	49.1	35.7	45.0	56.5	42.6	49.6			
Asie de l'Est et Pacifique														
Mongolie			61.4	45.7	55.8	56.5	39.5	50.8	58.5	42.1	50.3			

GE-13 : Jeunes—Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers														
Pays	2003		2005											
	Rapports nationaux UNGASS 2003 [*]		Rapports nationaux UNGASS 2005 ^{**}									Enquête démographique et de santé [†] (sauf indication contraire)		
	Pourcentage de jeunes (15–24 ans) qui ont utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier		Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15–24 ans qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier									Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15–24 ans qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire non régulier		
			Z. urb.			Z. rur.			Tous					
		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes	Tous	Hommes	Femmes
Asie du Sud et du Sud-Est														
Cambodge		43.0												
Inde	51.0	40.0											59.0 ⁴	51.0 ⁴
Népal	52.0													
Thaïlande			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Viet Nam													68.0 ²	
Europe orientale et Asie centrale														
République tchèque									55.0	31.0				
Moldova, République de													63.0	44.0
Fédération de Russie												78.8		
Ukraine			73.5	67.0	71.8	72.2	60.0	69.2	73.2	65.1	69.1			
Ouzbékistan													50.0 ⁵	
Caraïbes														
Barbade									77.8	33.3	49.3			
République dominicaine	48.0	12.0											52.0	29.0
Haïti	30.0	19.0												
Jamaïque		38.0												
Amérique latine														
Argentine													46.0	
Bolivie	22.0	8.0											37.0	20.0
Brésil	59.0	32.0											74.1	
Chili	33.0	18.0												
Colombie		29.0												
Mexique	57.0	57.0												
Nicaragua														17.0
Paraguay		79.0												
Pérou		19.0												
	(N = 54)	(N = 34)							(N = 24)					(N = 27)

^{*}Rapport daté de 2003, mais la collecte des données peut avoir été faite entre 1996 et 2001

^{**}Rapport daté de 2005, mais la collecte des données peut avoir été faite entre 2000 et 2005

[†]Les données pour 2005 sont fondées sur des données recueillies entre 2001 et 2005

(-) = En analyse au moment de l'impression

¹Source: Enquête sur l'impact du SIDA

²Source: Enquête sur les indicateurs SIDA

³Source: Enquête sur les comportements sexuels

⁴Source: Enquête de surveillance comportementale

⁵Source: Enquête sur les examens de santé

GE-14 : Orphelins—Fréquentation scolaire					
Pays	2003			2005	
	Rapports nationaux UNGASS 2003*			Rapports nationaux UNGASS 2005**	Enquête démographique et de santé ¹ (sauf indication contraire)
	Ratio de la fréquentation scolaire—orphelins par rapport aux non-orphelins			Ratio de la fréquentation scolaire actuelle parmi les orphelins et parmi les non-orphelins, âgés de 10 à 14 ans	Ratio de la proportion d'orphelins (mère et père décédés) de 10 à 14 ans qui fréquentent l'école et de la proportion de non-orphelins (vivant avec un parent au moins) de 10 à 14 ans qui fréquentent l'école
	Garçons	Filles	Tous	Tous	Tous
Afrique subsaharienne					
Angola			0.90		0.90 ¹
Botswana			0.99		0.99 ²
Burkina Faso					1.09
Burundi			0.70		0.70 ¹
Cameroun		0.64	0.94		0.99
République centrafricaine			0.91	-	0.91 ²
Tchad			0.96		1.07
Comores			0.59		0.59 ¹
Congo, République démocratique du			0.72	-	0.72 ¹
Côte d'Ivoire			0.83		0.83 ¹
Guinée équatoriale			0.95		0.95 ¹
Erythrée					0.83
Ethiopie	0.58	0.64	0.60	-	0.60
Gabon			0.98		0.98
Gambie			0.85		0.85 ¹
Ghana			0.93		0.79
Guinée	0.86	1.55	1.13		1.13
Guinée-Bissau			1.03		1.03 ¹
Kenya	0.79	0.71	0.74	0.97	0.95
Lesotho			0.87		0.87 ¹
Madagascar			0.65	0.80	0.76
Malawi	0.96	0.90	0.93	0.97	0.93
Mali			0.72		1.04
Mozambique	0.44	0.50	0.47		0.80
Namibie			0.92	0.97	0.92
Niger			1.07		
Nigéria	0.69	1.07	0.87		0.64
Rwanda	0.76	0.86	0.80		0.80 ¹
Sénégal			0.74		0.74 ¹
Sierra Leone			0.71		0.71 ¹
Somalie			0.65		0.65 ¹
Afrique du Sud	0.95	0.96	0.95		
Swaziland			0.91		0.91 ¹
Tanzanie, République-Unie de	0.66		0.74		0.82 ³
Togo			0.96		0.96 ¹
Ouganda	0.90	1.00	0.95		0.95
Zambie			0.87	0.17	0.92 ⁴
Zimbabwe	0.89	0.82	0.85		0.98 ²

GE-14 : Orphelins—Fréquentation scolaire					
Pays	2003			2005	
	Rapports nationaux UNGASS 2003 ^a			Rapports nationaux UNGASS 2005 ^{a,b}	Enquête démographique et de santé ^c (sauf indication contraire)
	Ratio de la fréquentation scolaire—orphelins par rapport aux non-orphelins			Ratio de la fréquentation scolaire actuelle parmi les orphelins et parmi les non-orphelins, âgés de 10 à 14 ans	Ratio de la proportion d'orphelins (mère et père décédés) de 10 à 14 ans qui fréquentent l'école et de la proportion de non-orphelins (vivant avec un parent au moins) de 10 à 14 ans qui fréquentent l'école
	Garçons	Filles	Tous	Tous	Tous
Asie du Sud et du Sud-Est					
Cambodge				0.71	
Indonésie				0.82	
Afrique du Nord et Moyen-Orient					
Soudan			0.96	0.96 ¹	
Caraïbes					
République dominicaine				0.96	
Haïti				0.87	
Sainte-Lucie				-	
Amérique latine					
Guatemala				0.98	
Pérou				0.85	
Suriname				0.89 ¹	
(N = 47)			(N = 37)	(N = 9)	(N = 44)

^aRapport daté de 2003, mais la collecte des données peut avoir été faite entre 1997 et 2001

^bRapport daté de 2005, mais la collecte des données peut avoir été faite entre 2001 et 2005

^cLes données pour 2005 sont fondées sur des données recueillies entre 1999 et 2004

(-) = En analyse au moment de l'impression

¹Source: Enquête en grappes à indicateurs multiples

²Source: Recensement

³Source: Enquête sur les indicateurs SIDA

⁴Source: Enquête sur les comportements sexuels

GE-16 : Traitement du VIH—Survie après 12 mois sous thérapie antirétrovirale									
Pays	2005								
	Rapports UNGASS 2005								
	Hommes			Femmes			Tous		
	<15	15+	Tous	<15	15+	Tous	<15	15+	Tous
Afrique subsaharienne									
Tchad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Côte d'Ivoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethiopie			90.2			86.4			88.6
Madagascar									100.0
Malawi									83.0
Namibie									91.0
Nigéria									98.2
Somalie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe orientale et Asie centrale									
Géorgie			85.0			100.0			88.0
Ukraine	100.0	67.6	68.9	100.0	73.7	75.4	100.0	70.3	71.9
Caraïbes									
Barbade			92.5			94.0			93.3
Dominique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sainte-Lucie									80.0
Saint-Vincent-et-Grenadines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trinité-et-Tobago	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N = 15)				(N = 15)					

(-) = En analyse au moment de l'impression

CLPE-3 : Populations les plus exposées au risque—Test VIH				
Pays	2005			
	Rapports UNGASS 2005*			
	Pourcentage de [populations les plus exposées au risque] qui a pratiqué un test VIH au cours des 12 derniers mois et en connaît le résultat			
	Tous	Professionnel(le)s du sexe	Consommateurs de drogues injectables	Hommes qui ont des rapports seuls avec des hommes
Afrique subsaharienne				
Burundi		37.6		
Congo		3.3		8.3
Sénégal				10.8
Asie de l'Est et Pacifique				
Mongolie		67		23.2
Asie du Sud et du Sud-Est				
Bangladesh	1.3	1.6**	3.2	
Inde	28.9			
Indonésie		14.8	18.1	15.4
Iran, République islamique d'			9.4	
Lao, République démocratique populaire		8.9		
Viet Nam		-	-	
Europe orientale et Asie centrale				
Arménie		33.2	21.1	42
Bélarus		48.5	39.2	55.4
Géorgie		24.4	6.4	27.1
Roumanie		35.5	36	
Ukraine	17.9	32.4	27.1	24.6
Europe occidentale				
Macédoine, Ex-République yougoslave de		66.7	31.8	7.4
Serbie-et-Monténégro				52.5††
Afrique du Nord et Moyen-Orient				
Algérie			15.1	
Maroc			12.5	
Turquie		26		
Caraïbes				
Jamaïque		43.0†		
Amérique latine				
Argentine		35.9		96.3
Panama		76.5		44.8
	(N = 23)		(N = 23)	

*Rapport daté de 2005, mais la collection des données peut avoir été faite entre 2003 et 2005

**Professionnelles du sexe

†Personnes travaillant dans de commerce du sexe

††Valeur pour la Serbie

(-) = En analyse au moment de l'impression

CLPE-4 : Populations les plus exposées au risque—Programmes de prévention

Pays	2005					
	Hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes		Consommateurs de drogues injectables		Professionnel(le)s du sexe	
	Rapports nationaux UNGASS 2005*	Enquête de couverture**	Rapports nationaux UNGASS 2005*	Enquête de couverture**	Rapports nationaux UNGASS 2005*	Enquête de couverture**
	Pourcentage de [populations les plus exposées au risque] touché par des programmes de prévention	Pourcentage de HSH couverts par des programmes extra-institutionnels	Pourcentage de [populations les plus exposées au risque] touché par des programmes de prévention	Pourcentage de CDI couverts par des services de réduction des risques	Pourcentage de [populations les plus exposées au risque] touché par des programmes de prévention	Pourcentage de professionnel(le)s du sexe couvert(e)s par des programmes extra-institutionnels
Afrique subsaharienne						
Bénin						100.0±
Burkina Faso					42.1	60.0
Burundi					77.7	
Tchad						5.0
Congo	33.3				53.4	
Côte d'Ivoire				100.0±		71.0
Ghana						50.0
Guinée				100.0±		50.0
Kenya		2.0				17.0
Mali					45.3	
Mozambique				< 0.5		5.0
Niger						92.0
Sénégal		100.0±				100.0±
Togo						30.0
Ouganda						10.0
Zimbabwe						40.0
Asie de l'Est et Pacifique						
Chine		8.0	45.0	8.0	25.0	38.0
Mongolie	68.1				58.0	
Asie du Sud et du Sud-Est						
Bangladesh	77.0		82.0	7.0	71.6†	
Cambodge		17.0		97.0		60.0
Inde	45.0	45.0	47.8	48.0	52.4	52.0
Indonésie	1.3	10.0	15.0	89.0	37.3†	50
Iran/République islamique d'			11.4			
Lao, République démocratique populaire					70.7	100.0±
Malaisie		10.0		4.0		
Népal	5.4	36.0	8.6	<0.50	35.2†	68.0
Pakistan	22.0	15.0	28.4	100.0±	11.0†	20.0
Philippines		2.0		<0.50		7.0
Viet Nam			69.1		81.0	
Europe orientale et Asie centrale						
Arménie	0.7		25.1		28.9	
Bélarus	7.1		16.4		8.8	
Croatie				20.0		
République tchèque			60.0			
Géorgie			25.0		75.6	
Kazakhstan		1.0		8.0		31.0
Kirghizistan	79.2		8.4		75.3	
Lettonie		2.0	7.9	2.0		17.0
Moldova, République de		90.0	22.4	74.0	14.1††	50.0

CLPE-4 : Populations les plus exposées au risque—Programmes de prévention

Pays	2005					
	Hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes		Consommateurs de drogues injectables		Professionnel(le)s du sexe	
	Rapports nationaux UNGASS 2005*	Enquête de couverture**	Rapports nationaux UNGASS 2005*	Enquête de couverture**	Rapports nationaux UNGASS 2005*	Enquête de couverture**
	Pourcentage de [populations les plus exposées au risque] touché par des programmes de prévention	Pourcentage de HSH couverts par des programmes extra-institutionnels	Pourcentage de [populations les plus exposées au risque] touché par des programmes de prévention	Pourcentage de CDI couverts par des services de réduction des risques	Pourcentage de [populations les plus exposées au risque] touché par des programmes de prévention	Pourcentage de professionnel(le)s du sexe couvert(e)s par des programmes extra-institutionnels
Roumanie	3.1		9.3	43.0	3.6	
Fédération de Russie		1.0	4.9	9.0	15.6	
Ukraine		5.0	38.4	13.0	33.7	5.0
Europe occidentale						
Albanie				7.0		
Afrique du Nord et Moyen-Orient						
Algérie			15.0			
Egypte				100.0 [‡]		
Tunisie		5.0		2.0		20.0
Turquie					13.8	
Caraïbes						
République dominicaine		10.0		100.0 [‡]		30.0
Jamaïque					60.0	
Amérique latine						
Argentine		30.0		93.0		30.0
Colombie		30.0				75.0
Equateur		5.0				50.0
El Salvador		17.0				60.0
Guatemala		10.0				75.0
Panama	43.8				48.0	71.0
Paraguay		50.0				10.0
Pérou	22.6					20.0
Venezuela		1.0				30.0
	(N = 57)	(N = 13)	(N = 19)	(N = 24)	(N = 24)	(N = 36)

*Rapport daté de 2003, mais la collecte des données peut avoir été faite entre 2003 et 2005

**Les données sont des estimations pour 2005 fondées sur les informations les plus récentes disponibles

†Professionnelles du sexe

‡Personnes travaillant dans le commerce du sexe

‡En analyse au moment de l'impression

CLPE-5 : Populations les plus exposées au risque—Connaissances relatives à la prévention du VIH				
Pays	2005			
	Rapports nationaux UNGASS 2005*			
	Pourcentage de [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] qui à la fois identifie correctement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et rejette les principales idées fausses concernant la transmission du VIH			
	Tous	HSH	CDI	Professionnel(le)s du sexe
Afrique subsaharienne				
Bénin		42.2		
Burundi				4.3
Congo		3.3		66.7
Mali				90.1
Asie de l'Est et Pacifique				
Chine		37.3	36.0	23.5**
Asie du Sud et du Sud-Est				
Bangladesh	28.2	13.5	14.0	23.3
Indonésie		43.3	6.7	23.8
Lao, République démocratique populaire				20.5
Népal		27.3	49.9	16.9
Viet Nam			34.4	24.2
Europe orientale et Asie centrale				
Arménie		54.0	60.0	49.2
Bélarus		62.8	61.4	23.8
Géorgie			36.2	1.3
Kirghizistan		6.9		1.1
Moldova, République de		38.3	37.1	34.7
Roumanie			18.0	14.1
Ukraine	39.4	48.9	21.2	8.1
Europe occidentale				
Macédoine, Ex-République yougoslave de		33.9	26.7	9.9
Afrique du Nord et Moyen-Orient				
Maroc			6.9	72.2
Turquie				21.7
Caraïbes				
Jamaïque				26.1†
Amérique latine				
Argentine		55.9		69.4
Costa Rica		48.8		
Pérou		72.6		
	(N = 24)		(N = 24)	

*Rapport daté de 2005, mais la collecte des données peut avoir été faite entre 2003 et 2005

**Professionnelles du sexe

†Personnes pratiquant le commerce du sexe

HSH = Hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes

CDI = Consommateurs de drogues injectables

CLPE-6 : Professionnel(le)s du sexe—Utilisation du préservatif			
Pays	2005		
	Rapports UNGASS 2005*		
	Pourcentage de professionnels du sexe (femmes et hommes) qui déclarent avoir utilisé un préservatif avec leur client le plus récent		
	Tous	Hommes	Femmes
Afrique subsaharienne			
Burkina Faso	95.9		
Burundi	73.7		73.8
Sénégal	86.3		86.6
Asie de l'Est et Pacifique			
Chine			68.5
Mongolie	94.1	50.0	96.4
Asie du Sud et du Sud-Est			
Bangladesh	39.8	44.1	31.8
Cambodge	96.0		96.0
Indonésie	54.7	47.5	56.2
Lao, République démocratique populaire	83.2	58.8	88.9
Népal	67.1		
Pakistan	22.6	6.6	37.0
Sri Lanka			64.9
Viet Nam	90.4		90.4
Europe orientale et Asie centrale			
Arménie	89.2	100.0 [†]	89.2
Bélarus	77.4	100.0 [†]	77.3
Géorgie			95.0
Kirghizistan	80.9		
Moldova, République de	98.4 ^{††}		
Roumanie			85.0
Fédération de Russie	77.0		
Europe occidentale			
Macédoine, Ex-République yougoslave de	85.9	87.5	84.4
Afrique du Nord et Moyen-Orient			
Maroc	37.7		37.8
Caraïbes			
Jamaïque	84.3		
Amérique latine			
Panama	91.5	90.8	91.6
	(N = 24)		(N = 24)

*Rapport daté de 2005, mais la collecte des données peut avoir été faite entre 2003 et 2005

[†]En analyse au moment de l'impression

^{††}Personnes pratiquant le commerce du sexe

CLPE-7 : Hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes—Utilisation du préservatif			
Pays	2005		
	Rapports nationaux UNGASS 2005*		
	Pourcentage d'hommes qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel anal avec un partenaire masculin		
	Tous	Age <25	Age 25+
Afrique subsaharienne			
Congo	23.3	23.5	23.1
Sénégal	44.5		44.7
Asie de l'Est et Pacifique			
Chine	41.1		
Mongolie	13.0	17.6	10.3
Océanie			
Fidji	20.0		
Asie du Sud et du Sud-Est			
Bangladesh	49.2	52.9	48.8
Indonésie	47.6	45.6	48.6
Pakistan	7.6	9.8	4.9
Europe orientale et Asie centrale			
Arménie	30.4	40.0	12.5
Bélarus	61.6	57.2	66.0
Géorgie	53.6		
Kirghizistan	68.3		
Moldova, République de	63.0	60.5	64.9
Fédération de Russie	38.8		
Ukraine	71.6	71.1	71.9
Europe occidentale			
Macédoine, Ex-République yougoslave de	29.2		
Amérique latine			
Panama	84.2	83.8	84.4
Pérou	46.3	47.2	45.5
Pays à revenu élevé			
Etats-Unis			50.5
	(N = 19)	(N = 19)	

*Rapport daté de 2005, mais la collecte des données peut avoir été faite entre 2003 et 2005

CLPE-8 : Consommateurs de drogues injectables—Pratiques d'injection et sexuelles sans danger					
Pays	2005				
	Rapports nationaux UNGASS 2005*				
	Pourcentage de CDI qui ont adopté des comportements susceptibles de réduire la transmission du VIH, c.-à-d. qui à la fois ont évité d'utiliser un matériel d'injection non stérile et utilisé des préservatifs au cours du mois écoulé (pour les pays où la consommation de drogues injectables est un mode établi de transmission du VIH).				
	Tous les âges	Age < 25		Age 25 +	
Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
Asie de l'Est et Pacifique					
Chine	-	-	-	-	-
Asie du Sud et du Sud-Est					
Bangladesh	-	8.3	31.3	16.2	68.3
Indonésie	-	18.9	27.3	19.2	8.7
Népal	-	-	-	-	-
Pakistan	-	-	-	-	-
Thaïlande	-	18.8	28.6	27.4	15.6
Viet Nam	-	81.8		89.1	
Europe orientale et Asie centrale					
Arménie	-	46.4	66.7	30.6	33.3
Bélarus	-	50.7	66.7	45.8	43.5
Géorgie	-	-	-	-	-
Kirghizistan	-	-	-	-	-
Lettonie	-	-	-	-	-
Moldova, République de	-	61.9	57.1	37.3	36.2
Roumanie	-	-	-	1.5	0.9
Ukraine	-	18.3	21.3	20.6	17.4
Europe occidentale					
Macédoine, Ex-République yougoslave de	-	28.7	18.5	30.7	35
Serbie-et-Monténégro	20.1**	2.0†	-	-	-
Afrique du Nord et Moyen-Orient					
Algérie	-				
	(N = 18)		(N = 18)		

*Rapport daté de 2005, mais la collecte des données peut avoir été faite entre 2003 et 2005

**Valeur pour la Serbie

†Valeur pour le Monténégro

(-) = En analyse au moment de l'impression

CDI = Consommateurs de drogues injectables

NOTES CONCERNANT DES INDICATEURS PARTICULIERS

On trouvera d'autres détails concernant les indicateurs suivants dans le document de l'ONUSIDA intitulé 'Directives pour l'élaboration d'indicateurs de base' (2005).

Indicateurs pour des épidémies généralisées (GE)

Depuis la publication du rapport intitulé *Suivi de l'UNGASS 2001 : Rapport d'activité sur la riposte mondiale à l'épidémie de VIH/SIDA* (2003), de nouveaux indicateurs de base ont été élaborés afin de mieux comprendre la nature et l'ampleur de la riposte au VIH et au SIDA dans les pays. De plus, il existe maintenant des recommandations concernant l'utilisation d'ensembles distincts d'indicateurs pour les pays qui connaissent des épidémies généralisées et ceux dont les épidémies sont concentrées ou à faible prévalence.

Pour les pays connaissant des épidémies généralisées, on dispose de cinq nouveaux indicateurs de base (voir Encadré ci-dessous). (Veuillez noter que l'un des indicateurs nationaux originaux—à savoir le pourcentage de consommateurs de drogues injectables qui ont adopté des comportements susceptibles de réduire la transmission du VIH—a été transféré dans la série des indicateurs destinés aux pays dont les épidémies sont concentrées ou à faible prévalence.)

ENCADRÉ 1: CINQ NOUVEAUX INDICATEURS DE BASE POUR LES ÉPIDÉMIES GÉNÉRALISÉES

- Pourcentage d'orphelins et d'enfants vulnérables dont le foyer bénéficie d'un appui extérieur gratuit pour la prise en charge de l'enfant.
- Pourcentage d'unités de sang transfusées contrôlées pour le VIH.
- Pourcentage de jeunes femmes et hommes qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans.
- Pourcentage de jeunes femmes et hommes entre 15 et 24 ans qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal, non cohabitant au cours des 12 derniers mois.
- Pourcentage d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH encore en vie et sous traitement 12 mois après le début d'une thérapie antirétrovirale.

1. GE-1: FONDS NATIONAUX PROVENANT DE SOURCES INTÉRIEURES DÉPENSÉS PAR LES GOUVERNEMENTS POUR COMBATTRE LE SIDA

Cet indicateur constitue une approche globale du suivi des dépenses relatives au VIH et au SIDA dans tous les secteurs. On le mesure en effectuant une Evaluation des dépenses nationales sur le SIDA, ou dans d'autres cas par des examens sur dossiers ou autres mesures supplétives. Il s'applique à tous les pays, y compris ceux qui connaissent des épidémies concentrées ou à faible prévalence.

Définition(s) et composantes de l'indicateur

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS** : Total des fonds nationaux décaissés par les gouvernements dans les pays à faible ou moyen revenu.

L'indicateur a pour but de mesurer les dépenses des gouvernements et autres institutions publiques provenant de leurs propres sources aux niveaux central ou décentralisé, en excluant les fonds internationaux (même si ces derniers sont décaissés par l'intermédiaire des autorités nationales).

Le graphique résumant les indicateurs a été assemblé pour montrer l'évolution entre 2001, date à laquelle la Déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA a été adoptée, et fin 2005. Pour préparer ce graphique, on s'est appuyé sur les rapports des pays sur le suivi de la Déclaration ainsi que sur d'autres sources fournies par les membres du Consortium ONUSIDA pour le suivi des ressources mondiales.

La plupart des pays font rapport sur la dernière année disponible et plusieurs méthodologies ont été appliquées par divers pays pour élaborer cet indicateur. Il s'agit notamment de l'application du cadre d'Evaluation des dépenses nationales sur le SIDA recommandé par l'ONUSIDA, qui mesure les dépenses réelles par fonction pertinente aux politiques dans le domaine de la fourniture des services liés au SIDA. Parmi les autres sources d'information utilisées par les pays ayant fait rapport, on peut noter l'analyse des budgets SIDA, des examens sur dossiers de l'exécution des budgets, des rapports au projet UNFPA/

ONUSIDA/NIDI sur les flux de ressources, des examens des activités des programmes nationaux et une sous-analyse du domaine SIDA dans les comptes nationaux relatifs à la santé.

Les meilleures estimations, qui reflètent les dépenses réelles pour la période 2001-2005, ont été choisies lorsqu'elles étaient disponibles. On s'est efforcé de séparer et de déduire les fonds internationaux remis aux autorités gouvernementales afin d'isoler les dépenses propres des pays.

Dans les cas où les pays bénéficiaient d'un prêt ou d'un crédit en cours consenti par une banque de développement, on a tenté de séparer l'élément remboursable de ces prêts. Cet élément a été classé dans les dépenses intérieures ainsi que la composante nationale et les frais engagés pour l'exécution du projet au cours de l'année civile, lorsque cette donnée était disponible.

Les pays ayant fait rapport sur cet indicateur, mais dont les chiffres sont encore en examen, ne figurent pas ici. Pour d'autres, on dispose d'estimations et de totaux préliminaires qui pourraient changer lorsque des informations supplémentaires seront disponibles.

2. GE-3: APPRENTISSAGE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES CONCERNANT LE VIH DANS LES ÉCOLES

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès dans la mise en œuvre de l'apprentissage des compétences essentielles concernant le VIH dans toutes les écoles et il s'applique à tous les pays. On le mesure tous les deux ans au moyen d'enquêtes en milieu scolaire ou par l'examen des programmes d'enseignement.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS** : Pourcentage d'écoles disposant d'enseignants formés à l'apprentissage des compétences essentielles concernant le VIH et qui les ont enseignées au cours de l'année scolaire écoulée.

Numérateur: Nombre d'écoles disposant de personnels formés à l'apprentissage des compétences essentielles concernant le VIH et qui les enseignent régulièrement.

Dénominateur: Nombre d'écoles interrogées.

3. GE-4: LUTTE CONTRE LE VIH ET LE SIDA SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès dans la mise en œuvre de politiques et programmes de lutte contre le VIH sur le lieu de travail. Il s'applique à tous les pays et on le mesure tous les deux ans par des enquêtes auprès d'un échantillon représentatif des principaux employeurs des secteurs public et privé. Les employeurs du secteur public comprennent au minimum les ministères des transports, de l'emploi, du tourisme, de l'éducation et de la santé. Les employeurs du secteur privé seront choisis en fonction de la taille de leur effectif.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS**: Pourcentage des grandes entreprises ou compagnies qui ont mis en place des politiques et programmes sur le VIH et le SIDA sur le lieu de travail.

Numérateur: Nombre d'employeurs disposant de politiques et programmes complets sur le VIH et le SIDA (tels que les définissent les Directives de l'ONUSIDA sur l'élaboration des indicateurs de base—2005).

Dénominateur: Nombre d'employeurs interrogés.

4. GE-5: INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES—PRISE EN CHARGE GLOBALE DES CAS

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès dans la mise en œuvre de programmes universellement efficaces de diagnostic, de traitement et de conseil concernant les infections sexuellement transmissibles. Il s'applique à tous les pays et on le mesure tous les deux ans par des enquêtes dans les établissements de santé.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS**: Pourcentage de femmes et d'hommes atteints d'infections sexuellement transmissibles fréquentant des établissements de santé qui sont correctement diagnostiqués, traités et conseillés.

Numérateur: Nombre de personnes atteintes d'une infection sexuellement transmissible pour qui des méthodes correctes ont été suivies pour ce qui est : (a) des antécédents ; (b) de l'examen ; (c) du diagnostic et du traitement ; et (d) du conseil concernant la notification aux partenaires, l'utilisation du préservatif et le dépistage du VIH.

Dénominateur: Nombre de personnes atteintes d'une infection sexuellement transmissible pour lesquelles on a pu observer les interactions entre soignant et client.

5. GE-6: PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT—PROPHYLAXIE ANTIRÉTROVIRALE

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès dans la prévention de la transmission verticale du VIH. L'indicateur s'applique à tous les pays et on le mesure tous les deux ans grâce au suivi des programmes et au calcul d'estimations.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH qui bénéficient d'une prophylaxie antirétrovirale complète destinée à réduire le risque de transmission mère-enfant.

Numérateur: Nombre de femmes enceintes infectées par le VIH qui ont bénéficié d'une prophylaxie antirétrovirale destinée à réduire le risque de transmission mère-enfant conforme au protocole de traitement approuvé à l'échelle nationale (ou aux normes OMS/ONUSIDA) au cours des 12 derniers mois..

Dénominateur: Nombre estimé de femmes enceintes infectées par le VIH.

Autres sources de données disponibles :

Enquête de couverture: pour d'autres détails concernant cette enquête, veuillez vous référer au document USAID, UNAIDS, WHO, UNICEF, and POLICY Project—Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low- and middle-income countries in 2003 (juin 2004).

6. GE-7: TRAITEMENT DU VIH—ASSOCIATION D'ANTIRÉTROVIRAUX

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès dans la fourniture d'une thérapie par association d'antirétroviraux à toutes les personnes atteintes d'une infection à VIH avancée. Il s'applique à tous les pays et on le mesure tous les deux ans grâce au suivi des programmes.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée bénéficiant d'une thérapie par association d'antirétroviraux.

Numérateur: Nombre de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée bénéficiant d'une thérapie par association d'antirétroviraux conforme au protocole de traitement approuvé à l'échelle nationale (ou aux normes OMS/ONUSIDA) ; il est calculé comme suit : nombre de personnes sous traitement au début de l'année, plus nombre de personnes qui ont été placées sous traitement au cours des 12 derniers mois, moins nombre de personnes dont le traitement a été interrompu au cours des 12 derniers mois (y compris les personnes qui sont décédées).

Dénominateur: Nombre de personnes dont on sait qu'elles sont atteintes d'une infection à VIH avancée (c.-à-d. celles qui ont besoin d'un traitement par association d'antirétroviraux).

Autres sources de données disponibles :

Enquête de couverture—couverture par la thérapie antirétrovirale. Pour d'autres détails, veuillez vous référer au document USAID, UNAIDS, WHO, UNICEF, and POLICY Project—Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low- and middle-income countries in 2003 (juin 2004).

Initiative '3 millions d'ici 2005'—Couverture par la thérapie antirétrovirale (décembre 2005). Pour d'autres détails, se référer au document OMS et ONUSIDA—Progress on global access to HIV antiretroviral therapy: a report on "3 by 5" and beyond (mars 2006).

7. GE-8: APPUI AUX ENFANTS AFFECTÉS PAR LE VIH ET LE SIDA

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès dans la fourniture d'un appui aux foyers qui s'occupent d'enfants orphelins ou vulnérables ; l'indicateur est mesuré dans les pays à forte prévalence du VIH. On le mesure tous les 4-5 ans au moyen d'enquêtes dans la population telles que les Enquêtes démographiques et de santé et les Enquêtes en grappes à indicateurs multiples.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage d'enfants orphelins et vulnérables dont le foyer bénéficie d'un appui extérieur pour la prise en charge de l'enfant.

Numérateur: Nombre d'enfants orphelins et vulnérables vivant dans des ménages qui ont répondu « oui » à une question au moins sur quatre concernant le type et la fréquence de l'appui reçu. (Le ménage a reçu un soutien médical au cours des 12 derniers mois ; une aide associée à l'école au cours des 12 derniers mois ; un soutien émotionnel/psychologique au cours des 3 derniers mois ; ou un appui social au cours des 3 derniers mois.)

Dénominateur: Nombre total d'enfants orphelins et vulnérables.

8. GE-9: SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès en matière de contrôle du VIH dans les unités de sang transfusées. L'indicateur s'applique à tous les pays et on le mesure tous les deux ans au moyen du protocole relatif à la sécurité transfusionnelle MEASURE Evaluation.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage d'unités de sang transfusées contrôlées pour le VIH.

Numérateur: Nombre d'unités de sang contrôlées pour le VIH au cours des 12 derniers mois, conformément aux normes OMS ou aux normes nationales.

Dénominateur: Nombre d'unités de sang transfusées au cours des 12 derniers mois.

Autres sources de données disponibles :

Enquête de couverture—pourcentage des transfusions sanguines qui sont contrôlées pour le VIH. Pour d'autres détails, veuillez vous référer au document USAID, UNAIDS, WHO, UNICEF, and POLICY Project—Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low- and middle-income countries in 2003 (juin 2004).

9. GE-10: JEUNES—CONNAISSANCES RELATIVES À LA PRÉVENTION DU VIH

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès dans la connaissance universelle des informations essentielles concernant la transmission du VIH. L'indicateur s'applique à tous les pays et devrait être mesuré au minimum tous les 4-5 ans ; cependant une mesure tous les deux ans est préférable. On le mesure au moyen d'enquêtes dans la population telles que les Enquêtes démographiques et de santé, les Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, et les Enquêtes de surveillance comportementale (section jeunesse).

Cibles: 2005—90%; 2010—95%

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de jeunes entre 15 et 24 ans capables à la fois d'identifier correctement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et de rejeter les principales idées fausses.

Numérateur: Nombre de répondants entre 15 et 24 ans qui ont donné des réponses correctes aux cinq questions concernant la transmission du VIH.

1. Peut-on réduire le risque de transmission du VIH en ayant des rapports sexuels avec un seul partenaire fidèle et non infecté ?
2. Peut-on réduire le risque de transmission du VIH en utilisant des préservatifs ?
3. Une personne qui a l'air en bonne santé peut-elle être infectée par le VIH ?
4. Une personne peut-elle contracter le VIH par les piqûres des moustiques ?
5. Une personne peut-elle contracter le VIH en partageant le repas d'une personne infectée ?

Dénominateur: Nombre de répondants entre 15 et 24 ans qui ont répondu aux cinq questions (y compris en disant « je ne sais pas »).

Autres sources de données disponibles :

Enquêtes démographiques et de santé: pourcentage des personnes interrogées qui identifient correctement les deux principaux moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH (utiliser le préservatif et n'avoir de rapports sexuels qu'avec un seul partenaire fidèle et non infecté), qui rejettent les deux idées fausses les plus répandues concernant la transmission du VIH et qui savent qu'une personne peut être infectée même si elle a l'air en bonne santé.

10. GE-11: RAPPORTS SEXUELS AVANT L'ÂGE DE 15 ANS

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis pour retarder l'âge auquel les jeunes hommes et femmes entre 15 et 24 ans ont leur premier rapport sexuel. Il s'applique à tous les pays et devrait être

mesuré tous les 4-5 ans par des enquêtes dans la population telles que les Enquêtes démographiques et de santé, les Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, et les Enquêtes de surveillance comportementale (section jeunesse).

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de jeunes femmes et hommes qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans.

Numérateur: Nombre de répondants, âgés de 15–24 ans, qui déclarent qu'ils avaient moins de 15 ans lors de leur initiation sexuelle.

Dénominateur: Nombre de répondants entre 15 et 24 ans.

Autres sources de données disponibles :

Enquêtes démographiques et de santé: pourcentage de jeunes femmes et hommes entre 15 et 19 ans qui ont eu leur premier rapport sexuel à 15 ans exactement.

11. GE-12: RAPPORTS SEXUELS À PLUS HAUT RISQUE PARMİ LES JEUNES FEMMES ET HOMMES

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis pour réduire le pourcentage de jeunes entre 15 et 24 ans qui ont des rapports sexuels à plus haut risque. Il s'applique à tous les pays et devrait être mesuré tous les 4-5 ans par des enquêtes dans la population telles que les Enquêtes démographiques et de santé, les Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, et les Enquêtes de surveillance comportementale (section jeunesse).

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de jeunes femmes et hommes entre 15 et 24 ans qui avaient eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal non cohabitant au cours des 12 derniers mois.

Numérateur: Nombre de répondants, âgés de 15–24 ans, qui avaient eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal non cohabitant au cours des 12 derniers mois.

Dénominateur: Nombre de répondants entre 15 et 24 ans, qui déclarent avoir eu une activité sexuelle au cours des 12 derniers mois.

Autres sources de données disponibles :

Enquêtes démographiques et de santé: pourcentage de répondants, qui ont eu des rapports sexuels avec un partenaire extraconjugal non cohabitant au cours des 12 derniers mois par rapport au total des personnes qui déclarent avoir eu une activité sexuelle avec un tel partenaire au cours des 12 derniers mois.

12. GE-13: JEUNES—UTILISATION DU PRÉSÉRATIF AVEC DES PARTENAIRES NON RÉGULIERS

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis pour prévenir une exposition au VIH par des rapports sexuels non protégés avec des partenaires non réguliers chez les très jeunes gens. L'indicateur s'applique à tous les pays et devrait être mesuré au minimum tous les 4-5 ans ; toutefois une mesure tous les deux ans est préférable. On mesure l'indicateur au moyen d'enquêtes dans la population telles que les Enquêtes démographiques et de santé, les Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, et les Enquêtes de surveillance comportementale (section jeunesse).

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de jeunes entre 15 et 24 ans qui déclarent avoir utilisé un préservatif au cours de rapports sexuels avec un partenaire non régulier.

Numérateur: Nombre de répondants entre 15 et 24 ans qui déclarent avoir eu un partenaire sexuel non régulier (c.-à-d. extraconjugal et non cohabitant) au cours des 12 derniers mois et qui déclarent aussi avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec ce partenaire.

Dénominateur: Nombre de répondants entre 15 et 24 ans qui déclarent avoir eu un partenaire sexuel non régulier au cours des 12 derniers mois.

Autres sources de données disponibles :

Enquêtes démographiques et de santé: pourcentage de répondants, qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel avec un partenaire extraconjugal non cohabitant par rapport au total de ceux qui ont eu des rapports sexuels avec un tel partenaire au cours des 12 derniers mois.

13. GE-14: ORPHELINS—FRÉQUENTATION SCOLAIRE

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis pour atténuer le désavantage relatif des orphelins par rapport aux non-orphelins en matière de fréquentation scolaire. Cet indicateur s'applique à tous les pays et on le mesure au moyen d'enquêtes dans la population telles que les Enquêtes démographiques et de santé, les Enquêtes en grappes à indicateurs multiples et autres enquêtes représentatives. Il devrait être mesuré au minimum tous les 4-5 ans, mais une mesure tous les deux ans est préférable.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Ratio de la fréquentation scolaire actuelle parmi les orphelins à celle des non-orphelins âgés de 10 à 14 ans.

Fréquentation scolaire des orphelins

Numérateur: Nombre d'enfants qui ont perdu leurs deux parents et fréquentent toujours l'école.

Dénominateur: Nombre d'enfants qui ont perdu leurs deux parents.

Fréquentation scolaire des non-orphelins

Numérateur: Nombre d'enfants dont les deux parents sont en vie, qui vivent avec un parent au moins et fréquentent toujours l'école.

Dénominateur: Nombre d'enfants dont les deux parents sont en vie et qui vivent avec un parent au moins.

Autres sources de données disponibles :

Enquête démographique et de santé: ratio de la proportion d'orphelins (mère et père décédés) âgés de 10 à 14 ans fréquentant l'école et de la proportion des non-orphelins (vivant avec un parent au moins) âgés de 10 à 14 ans, qui fréquentent l'école.

14. GE-16: TRAITEMENT DU VIH—SURVIE APRÈS 12 MOIS DE THÉRAPIE ANTIRÉTROVIRALE

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis pour accroître la survie des adultes et des enfants infectés en les plaçant sous thérapie antirétrovirale. Il s'applique à tous les pays et se mesure tous les deux ans par un suivi des programmes.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH toujours en vie et dont on sait qu'ils sont sous traitement 12 mois après le début de la thérapie antirétrovirale.

Numérateur: Nombre d'adultes et d'enfants sous traitement antirétroviral continu 12 mois après le début de la thérapie.

Dénominateur:

(a) Survie minimum : nombre total d'adultes et d'enfants qui ont entamé une thérapie antirétrovirale dans le groupe de lancement de la thérapie 12 mois plus tôt, y compris ceux qui ont interrompu leur thérapie, ceux qui ont été transférés ailleurs et les personnes perdues au cours du suivi.

(b) Survie maximum : nombre total d'adultes et d'enfants qui ont entamé une thérapie antirétrovirale dans le groupe de lancement de la thérapie 12 mois plus tôt, à l'exclusion de ceux qui ont interrompu leur thérapie, de ceux qui ont été transférés ailleurs et des personnes perdues au cours du suivi.

Indicateurs pour des épidémies concentrées ou à faible prévalence (CLPE)

Depuis la publication du rapport intitulé *Suivi de l'UNGASS 2001 : Rapport d'activité sur la riposte mondiale à l'épidémie de VIH/SIDA (2003)*, de nouveaux indicateurs de base ont été élaborés afin de mieux comprendre la nature et l'ampleur de la riposte au VIH et au SIDA à l'échelon national. De plus, il existe maintenant des recommandations concernant l'utilisation d'ensembles distincts d'indicateurs pour les pays qui connaissent des épidémies généralisées et ceux dont les épidémies sont concentrées ou à faible prévalence.

Pour les pays connaissant des épidémies concentrées ou à faible prévalence, l'ensemble de neuf indicateurs prioritaires comprend quatre indicateurs relatifs à la catégorie de l'engagement et de l'action à

l'échelle nationale, quatre concernant la catégorie des connaissances et du comportement et un dans la catégorie de l'impact (voir Encadré 2).

ENCADRÉ 2 : NEUF INDICATEURS DE BASE POUR LES ÉPIDÉMIES CONCENTRÉES OU À FAIBLE PRÉVALENCE

- Montant des fonds nationaux décaissés par les gouvernements dans les pays à faible ou moyen revenu.
- Indice composite des politiques nationales.
- Pourcentage de [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] qui a été testé pour le VIH au cours des 12 derniers mois et en connaît le résultat.
- Pourcentage de population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] touché par des programmes de prévention du VIH/SIDA.
- Pourcentage de [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] qui à la fois identifie correctement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et rejette les principales idées fausses concernant la transmission du VIH.
- Pourcentage de professionnels du sexe (femmes et hommes) qui déclarent avoir utilisé un préservatif avec leur client le plus récent.
- Pourcentage d'hommes qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel anal avec un partenaire masculin.
- Pourcentage de consommateurs de drogues injectables qui ont adopté des comportements susceptibles de réduire la transmission du VIH, c.-à-d. qui ont évité d'échanger leur matériel d'injection et utilisé des préservatifs au cours du mois écoulé (*ne s'applique qu'aux pays où la consommation de drogues injectables constitue un mode établi de transmission du VIH*).
- Pourcentage de [population la plus exposée au risque] qui est infecté par le VIH (*indicateur d'impact*).

Les pays connaissant des épidémies généralisées ont parfois aussi une sous-épidémie concentrée dans une ou plusieurs des populations les plus exposées au risque. Dans ce cas, il leur serait utile de calculer et de rapporter les indicateurs concernant ces populations.

1. CLPE-3: POPULATIONS LES PLUS EXPOSÉES AU RISQUE—TEST VIH

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis en matière de conseil et de test VIH parmi les populations les plus exposées au risque. L'indicateur s'applique aux pays connaissant des épidémies concentrées ou à faible prévalence, y compris les pays qui ont des sous-épidémies concentrées au sein d'une épidémie généralisée. On le mesure tous les deux ans par le suivi des programmes ou des enquêtes spéciales telles que l'Enquête de surveillance comportementale de Family Health International.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] qui a fait un test VIH au cours des 12 mois écoulés et en connaît le résultat.

L'expression « population(s) la(les) plus exposée(s) au risque » figurant dans la définition sera remplacée par le segment de la population sur lequel porte la mesure (p. ex. professionnel(le)s du sexe, consommateurs de drogues injectables, hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes). Dans les pays où se trouvent plusieurs populations très exposées au risque, l'indicateur sera calculé et annoncé pour chaque population.

Numérateur: Nombre de répondants parmi les [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] qui a effectué un test VIH au cours des 12 derniers mois et en connaît le résultat.

Dénominateur: Nombre de [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] compris dans l'échantillon ou méthodes d'estimation de la prévalence pour la population la plus exposée au risque pour le dénominateur.

2. CLPE-4: POPULATIONS LES PLUS EXPOSÉES AU RISQUE—PROGRAMMES DE PRÉVENTION

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis dans l'exécution des programmes de prévention à l'intention des populations les plus exposées au risque. L'indicateur s'applique aux pays

connaissant des épidémies concentrées ou à faible prévalence, y compris les pays qui ont des sous-épidémies concentrées au sein d'une épidémie généralisée. On le mesure tous les deux ans par le suivi de programmes ou des enquêtes spéciales telles que l'Enquête de surveillance comportementale de Family Health International.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] touché par les programmes de prévention du VIH.

L'expression « population(s) la(les) plus exposée(s) au risque » figurant dans la définition sera remplacée par le segment de la population sur lequel porte la mesure (p. ex. professionnel(le)s du sexe, consommateurs de drogues injectables, hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes). Dans les pays où se trouvent plusieurs populations très exposées au risque, l'indicateur sera calculé et annoncé pour chaque population.

Numérateur: Nombre de répondants parmi les [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] qui a été touché par un programme de prévention du VIH au moins au cours des 12 derniers mois. Selon les contextes locaux, les programmes de prévention pourront comprendre : des projets extra-institutionnels et d'éducation pour les pairs, une exposition à des campagnes ciblées dans les médias, le dépistage et/ou le traitement des infections sexuellement transmissibles, le conseil et le test VIH, et la thérapie de substitution et les pratiques d'injection à moindre risque pour les consommateurs de drogues.

Dénominateur: Nombre de [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] compris dans l'échantillon ou méthodes d'estimation de la prévalence pour la population la plus exposée au risque pour le dénominateur.

Autres sources de données disponibles :

Enquête de couverture—pourcentage de [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] touché par une intervention par année. Pour d'autres détails concernant cette enquête, veuillez vous référer au document USAID, UNAIDS, WHO, UNICEF, and POLICY Project—Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low- and middle-income countries in 2003 (juin 2004).

3. CLPE-5: POPULATIONS LES PLUS EXPOSÉES AU RISQUE—CONNAISSANCES RELATIVES À LA PRÉVENTION DU VIH

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis dans le développement des connaissances essentielles concernant la transmission du VIH parmi les populations les plus exposées au risque. L'indicateur s'applique aux pays connaissant des épidémies concentrées ou à faible prévalence, y compris les pays qui ont des sous-épidémies concentrées au sein d'une épidémie généralisée. On le mesure tous les deux ans par des enquêtes spéciales telles que l'enquête de surveillance comportementale de Family Health International.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] qui à la fois identifie correctement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH et rejette les principales idées fausses concernant la transmission du VIH.

Numérateur: Nombre de répondants parmi les [population(s) la(les) plus exposée(s)] qui a donné des réponses justes aux cinq questions concernant la transmission du VIH.

1. Peut-on réduire le risque de transmission du VIH en ayant des rapports sexuels avec un seul partenaire fidèle et non infecté ?
2. Peut-on réduire le risque de transmission du VIH en utilisant des préservatifs ?
3. Une personne qui a l'air en bonne santé peut-elle être infectée par le VIH ?
4. Une personne peut-elle contracter le VIH par les piqûres de moustiques ?
5. Une personne peut-elle contracter le VIH en partageant le repas d'une personne infectée ?

Dénominateur: Nombre de répondants parmi les [population(s) la(les) plus exposée(s) au risque] qui ont fourni des réponses, y compris « ne sait pas » aux cinq questions.

4. CLPE-6: PROFESSIONNEL(LE)S DU SEXE—UTILISATION DU PRÉSERVATIF

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis pour prévenir l'exposition au VIH par les rapports sexuels non protégés avec des clients parmi les professionnel(le)s du sexe. L'indicateur s'applique aux pays connaissant des épidémies concentrées ou à faible prévalence, y compris les pays qui ont des sous-épidémies concentrées au sein d'une épidémie généralisée. On le mesure tous les deux ans par des

enquêtes spéciales telles que l'enquête de surveillance comportementale de Family Health International à l'intention des professionnel(le)s du sexe.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de professionnels du sexe (femmes et hommes) qui déclarent avoir utilisé un préservatif avec leur client le plus récent.

Numérateur: Nombre de répondants qui déclarent avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client au cours des 12 derniers mois.

Dénominateur: Nombre de répondants qui déclarent avoir eu des rapports sexuels tarifés au cours des 12 derniers mois.

Autres sources de données disponibles :

Enquête de couverture—pour d'autres détails concernant cette enquête, veuillez vous référer au document USAID, UNAIDS, WHO, UNICEF, and POLICY Project—Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low- and middle-income countries in 2003 (juin 2004).

5. CLPE-7: HOMMES QUI ONT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES—UTILISATION DU PRÉSERVATIF

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis pour prévenir l'exposition au VIH des hommes qui ont des rapports sexuels anaux non protégés avec un partenaire masculin. L'indicateur s'applique aux pays connaissant des épidémies concentrées ou à faible prévalence, y compris les pays qui ont des sous-épidémies concentrées au sein d'une épidémie généralisée. On le mesure tous les deux ans par des enquêtes spéciales telles que l'enquête de surveillance comportementale de Family Health International à l'intention des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage d'hommes qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel anal avec un partenaire masculin.

Numérateur: Nombre de répondants qui déclarent avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel anal.

Dénominateur: Nombre de répondants qui déclarent avoir eu un rapport sexuel anal avec un partenaire masculin au cours des 6 derniers mois.

6. CLPE-8: CONSOMMATEURS DE DROGUES INJECTABLES—PRATIQUES D'INJECTION ET PRATIQUES SEXUELLES SÛRES

Le but de cet indicateur est d'évaluer les progrès accomplis pour prévenir la transmission du VIH associée à la consommation de drogues injectables. L'indicateur s'applique aux pays où la consommation de drogues injectables constitue un mode établi de transmission du VIH et on le mesure tous les deux ans par des enquêtes spéciales telles que l'enquête de surveillance comportementale de Family Health International à l'intention des consommateurs de drogues injectables.

Définition(s) et composantes de l'indicateur :

- **Rapport national de suivi de l'UNGASS:** Pourcentage de consommateurs de drogues injectables qui ont adopté des comportements susceptibles de réduire la transmission du VIH, c.-à-d. qui ont à la fois évité d'utiliser un matériel d'injection non stérile et utilisé des préservatifs au cours des 12 derniers mois.

Numérateur: Nombre de répondants qui déclarent n'avoir jamais utilisé de matériel d'injection non stérile au cours du mois écoulé et qui déclarent également avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel.

Dénominateur: Nombre de répondants qui déclarent s'injecter des drogues et avoir eu des rapports sexuels au cours du mois écoulé.

Descriptions—ressources supplémentaires

ENQUÊTE DE COUVERTURE

Cette étude a tenté de mesurer la couverture nationale de plusieurs services essentiels en recueillant les statistiques relatives à ces services et des évaluations d'experts. Dans chaque pays, l'information a été recueillie par l'intermédiaire de consultants nationaux. Ces derniers ont identifié des répondants bien informés pour chacun des services. Les répondants ont été priés de fournir des statistiques concernant le nombre de personnes ayant bénéficié du service au cours de l'année écoulée, si cette information était disponible. Ils ont également été chargés d'estimer le pourcentage de la population ayant besoin du service qui y avait accès. Les consultants ont utilisé un questionnaire standard.

L'étude porte principalement sur les services facilement mesurables. L'Encadré 3 décrit les services inclus dans cette étude.

ENCADRÉ 3 : SERVICES ESSENTIELS LIÉS AU VIH ET AU SIDA FIGURANT DANS CETTE ÉTUDE

- **Conseil et test volontaires.** Services offrant le conseil pré-test, le test VIH et le conseil post-test à toute personne souhaitant connaître sa sérologie VIH. Ne comprend pas les tests effectués pour des raisons médicales sur des patients hospitalisés.
- **Prévention de la transmission mère-enfant.** Services offrant le conseil et le test volontaires aux femmes enceintes ainsi que des services de prévention à celles qui sont séropositives au VIH. Les services de prévention doivent comprendre le traitement à la zidovudine, à la névirapine ou autres antirétroviraux et peuvent aussi inclure le conseil en matière d'allaitement au sein et les suppléments alimentaires.
- **Préservatifs.** Nombre de préservatifs distribués chaque année.
- **Réduction des risques.** Services visant à réduire les risques associés à la consommation de drogues injectables, y compris l'éducation à la réduction des risques et le soutien, l'échange des aiguilles et seringues et les médicaments de substitution.
- **Education.** Education au SIDA à l'intention des élèves des écoles primaires et secondaires.
- **Soins à domicile.** Services qui s'occupent des personnes infectées par le VIH à leur domicile et offrent des soins palliatifs, un appui psychosocial et des services de planification.
- **Traitement des infections opportunistes.** Niveau de prise en charge offert aux patients séropositifs au VIH qui ont besoin d'un traitement pour des maladies spécifiques.
- **Prophylaxie des infections opportunistes.** Fourniture de cotrimoxazole ou d'isoniazide aux personnes identifiées comme séropositives au VIH.
- **Thérapie antirétrovirale.** Traitement des adultes ou enfants séropositifs au VIH par une association de trois antirétroviraux au moins.
- **Orphelins et enfants vulnérables.** Services à l'appui des orphelins et enfants vulnérables, y compris l'aide alimentaire, le soutien à la scolarisation, les soins de santé, les services de protection, l'appui psychosocial et l'indépendance économique.

Le degré de couverture est calculé en divisant le nombre d'utilisateurs du service par la population qui en aurait besoin.

