

## Азия

### Последние тенденции в развитии эпидемии

- По оценкам, в 2007 году число людей, живущих с ВИЧ в Азии, составляло 5 [4,1–6,2] миллиона человек.
- В 2007 году число новых ВИЧ-инфекций и людей, умерших от болезней, связанных со СПИДом, оказалось сравнительно одинаковым: соответственно 380 000 [200 000–650 000] и 380 000 [270 000–490 000].
- Самые высокие национальные уровни распространения ВИЧ отмечаются в Юго-Восточной Азии. Число новых ВИЧ-инфекций также постоянно растет в таких густонаселенных странах, как **Бангладеш** и **Китай**, хотя и намного более медленными темпами.

### Основные пути передачи ВИЧ

- В этом регионе существует несколько путей передачи ВИЧ, что делает эпидемию в Азии одной из наиболее многообразных эпидемий в мире.
- В ряде стран Азии одним из основных факторов риска является употребление инъекционных наркотиков. По оценкам, в 2006 году в **Китае** чуть менее половины всех людей, живущих с ВИЧ, заразились через использование зараженного инъекционного инструментария. Также считается, что аналогичные сценарии имеют место в некоторых районах **Вьетнама**, **Индии** и **Пакистана**.
- Все большую озабоченность в регионе вызывает тот факт, что одни и те же люди употребляют инъекционные наркотики и имеют незащищенные половые контакты – это явление постоянно нарастает в рамках ряда эпидемий в Азии, в частности в **Индии**, **Индонезии** и **Пакистане**.
- Особенно опасная ситуация возникла в **Афганистане**, где была отмечена одна из последних вспышек ВИЧ в Азии. Здесь находят распространение инъекционные наркотики; только в Кабуле 3% недавно опрошенных потребителей инъекционных наркотиков оказались ВИЧ-позитивными, причем многие из них указали на то, что пользовались общими иглами и шприцами.
- Как и в других частях мира, незащищенные половые контакты между мужчинами представляют собой потенциально значительный, но недостаточно изученный аспект развития эпидемий ВИЧ в Азии. По данным последних исследований, проведенных в крупных городах региона, от Бангкока до Хошимина, показатель распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, нарастает.

### Дополнительные страновые данные <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> См. *Азия: Развитие эпидемии СПИДа: региональное резюме, 2007 г.*

- Сочетание употребления инъекционных наркотиков и секс-бизнеса является важным аспектом эпидемии ВИЧ в **Китае**; здесь растет число женщин, употребляющих инъекционные наркотики, а в некоторых местах до половины таких женщин также продают сексуальные услуги. Между тем это сочетание усугубляется низкими уровнями просвещения и информирования о ВИЧ, слабым распространением практики пользования презервативами и незаконным статусом секс-бизнеса, что еще более увеличивает риск заражения ВИЧ среди женщин, занятых в секс-бизнесе.
- В **Китае** уделялось относительно малое внимание проблеме распространения ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. По некоторым данным, до 7% ВИЧ-инфекций могут быть обусловлены небезопасными половыми контактами между мужчинами. Ряд данных указывает на модели поведения, которые могут привести к повышению риска контакта с ВИЧ в рамках сетей, объединяющих мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и вне таких сетей.
- В **Китае** усилия по снижению вреда, хотя они носят частичный и неравномерный характер, начинают приносить положительные изменения в рискованном поведении. Проекты пропаганды презервативов для работников секс-бизнеса и их клиентов приносят свои плоды, в некоторых городах, участвующих в проектах, наблюдаются серьезные изменения в практике пользования презервативами. В городе **Liuzhou** (провинция Гуанси) частота пользования презервативами среди работников секс-бизнеса увеличилась за два года с 48% до 80%.
- В некоторых штатах **Индии** имеющиеся данные указывают на высокий показатель распространенности ВИЧ среди работников секс-бизнеса и на возможное увеличение такого показателя среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Несмотря на то что ВИЧ распространился среди широких слоев населения и в некоторых штатах охватывает все большее число женщин, которым, как считается, грозит невысокий риск заражения, эпидемия в стране в основном обусловлена передачей ВИЧ внутри групп, которым грозит самый высокий риск, между такими группами и среди тех, кто их непосредственно окружает. Кроме того, значительную роль играют половые контакты между мужчинами, хотя этот аспект в развитии эпидемии ВИЧ в Индии изучен недостаточно.
- В соседнем **Пакистане** слабые знания о ВИЧ и широкое распространение рискованных моделей поведения среди групп, которым грозит самый высокий риск, могут привести к дальнейшему росту эпидемии. По данным одного исследования, проведенного в Карачи, показатель распространенности ВИЧ среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, вырос менее чем с 1% в начале 2004 года до 26% в марте 2005 года. Кроме того, выражается озабоченность относительно потенциальной роли трудящихся-мигрантов, которые представляют собой в основном неженатых мужчин, имеющих незащищенные платные половые контакты. Если уровни распространения ВИЧ среди работников секс-бизнеса вырастут, такие работники могут оказаться потенциальным звеном для распространения ВИЧ среди широких слоев населения. По оценкам, в 2006 году лишь 5% женщин, занятых в секс-бизнесе, были охвачены мероприятиями по профилактике ВИЧ.
- Во **Вьетнаме** наблюдается отдача от вложения средств в усилия по профилактике ВИЧ. Проекты по пропаганде презервативов, осуществленные среди населения в пяти провинциях, помогли сделать более безопасным поведение работников секс-бизнеса, работающих на улице, и их клиентов; показатель пользования

презервативами среди них увеличился примерно с 20% в 2001 году до 60% в 2004 году, в то время как частота пользования презервативами во время контактов с мужьями и интимными партнерами за тот же период увеличилась более чем в два раза – с 16% до 38%.

- Эпидемия ВИЧ в **Индонезии** является одной из самых быстро растущих в Азии. Эта эпидемия, которая первоначально концентрировалась в основном среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики в Бали, Джакарте и Западной Яве, сейчас охватила большое число их сексуальных партнеров, не употребляющих инъекционные наркотики, а также заключенных, работников секс-бизнеса и их клиентов и распространилась на 32 провинции; в 2000 году число провинций, где были отмечены случаи ВИЧ или СПИДа, было в два раза меньше.
- По данным исследования, проведенного в 2007 году в **Камбодже**, целенаправленные и устойчивые усилия по профилактике помогают обратить вспять распространение ВИЧ. Одним из важных факторов в последнее десятилетие был значительный рост практики пользования презервативами во время платного секса в публичных домах, как и информация о том, что меньшее число мужчин покупают сексуальные услуги.
- Несмотря на то что число ВИЧ-инфекций в **Таиланде** продолжает уменьшаться, значительная доля новых инфекций регистрируется среди групп, которым грозит риск – работников секс-бизнеса, лиц, употребляющих инъекционные наркотики, и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
- Эпидемия ВИЧ в **Малайзии** в основном концентрируется среди тех, кто использует небезопасную практику употребления инъекционных наркотиков; по оценкам, на данный момент более двух третей ВИЧ-инфекций были зарегистрированы среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики.

Лицо для контактов:

Софи Бартон-Нотт | tel. +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org) | [www.unaids.org](http://www.unaids.org)