

Caribe

Tendencias epidemiológicas más recientes

- En 2007, se estima que en el Caribe había 230 000 [210 000–270 000] personas viviendo con el VIH, de las cuales aproximadamente 20 000 [16 000–25 000] se habían infectado aquel año, mientras que alrededor de 14 000 [11 000–16 000] personas fallecieron como consecuencia de enfermedades relacionadas con el sida.
- A pesar de que en diversos países los sistemas de vigilancia son claramente insuficientes, los datos disponibles señalan que la mayor parte de las epidemias de VIH en la región parecen haberse estabilizado, mientras que unas pocas se han reducido en las zonas urbanas: esto es particularmente constatable en la **República Dominicana** y **Haití**, países que presentan las mayores epidemias en el Caribe.
- Al final de 2007, se estima que 30 000 personas que vivían con el VIH estaban recibiendo tratamiento antirretrovírico en la región. Esto significa un incremento del 50% desde finales de 2006, cuando seguían tratamiento 20 000 personas.¹

Principales fuentes de transmisión

- El coito heterosexual sin protección constituye el principal factor de transmisión del VIH en la región; no obstante, las relaciones sexuales sin protección entre varones también son un factor significativo en algunas epidemias.
- La elevada cifra de una de cada ocho (12%) infecciones por el VIH notificadas en la región se produce a través de las relaciones sexuales sin protección entre varones. Este es el principal modo de transmisión confirmado en **Cuba**, mientras que diversos estudios llevados a cabo en **Trinidad y Tabago** establecen una prevalencia del VIH del 20% entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.
- En la **República Dominicana**, las encuestas han puesto de manifiesto que aumenta el número de profesionales del sexo que se protegen a sí mismas –y protegen a sus clientes– contra el VIH, en particular en los principales centros urbanos y turísticos. En **Jamaica** y **Guyana**, se ha encontrado una prevalencia del VIH entre profesionales del sexo femeninas del 9% y el 31%, respectivamente.

Datos nacionales adicionales²

- El sida continúa siendo una de las principales causas de mortalidad entre personas de 25 a 44 años de edad en el Caribe, pero todo parece indicar que la ampliación gradual del tratamiento antirretrovírico está reduciendo las cifras de personas VIH positivas cuya enfermedad avanza progresivamente a sida y en último término fallecen por enfermedades relacionadas con este síndrome.

¹ De *Towards Universal Access: Scaling Up Priority HIV/AIDS Interventions in the Health Sector*, junio de 2007

² De *Caribbean: AIDS epidemic update 2007, regional summary*

- Las epidemias del Caribe se producen en el contexto de unos niveles elevados de pobreza y desempleo, desiguales en función del sexo y de otro tipo, y un considerable estigma, todo lo cual puede favorecer la propagación del VIH y menoscabar los esfuerzos para controlarlas.
- En algunos países, como **Barbados**, **Guyana** y **Jamaica**, la ampliación progresiva de los programas de prevención de la transmisión maternoinfantil ha reducido significativamente la tasa de transmisión a los lactantes.
- El programa de **Guyana** para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH también se está expandiendo, y actualmente cuenta con cerca de 94 centros que ofrecen tales servicios en ocho regiones. En una encuesta efectuada en 2006, cerca del 80% de las mujeres embarazadas dijeron haber aceptado servicios de prevención de la transmisión maternoinfantil cuando se los ofrecieron.
- En **Cuba**, todas las mujeres embarazadas se someten a la prueba del VIH; las que dan resultado positivo reciben medicamentos antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión del virus a sus hijos.
- En contraste con el resto de la región, el consumo de drogas inyectables es el factor clave de la transmisión del VIH en las epidemias de **Bermuda** y **Puerto Rico**. Sigue encontrándose una prevalencia del VIH muy alta entre las personas que se inyectan drogas en **Puerto Rico**, donde la tasa de infección por el VIH (26 por 100 000) duplica la del territorio continental de los Estados Unidos y donde más de las dos terceras partes de las infecciones por el VIH corresponden a varones.

Contacto:

Sophie Barton-Knott | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org