



Восточная Европа и Центральная Азия

Последние тенденции в развитии эпидемии

- В 2007 году оценочное число взрослых и детей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, увеличилось до 1,5 [1,1–1,9] миллионов человек – почти 90% инфицированных живут либо в **Российской Федерации** (69%), либо в **Украине** (29%). Эта цифра выросла более чем в два раза с 2001 года, когда оценочное число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 650 000 [510 000–1,1 миллиона] человек.
- В 2007 году ВИЧ заразились около 110 000 [67 000–180 000] человек и около 58 000 [41 000–88 000] человек умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.
- Самая крупная эпидемия ВИЧ в регионе развивается в **Российской Федерации** – и эта эпидемия продолжает нарастать, хотя и более медленными темпами по сравнению с **Украиной**, где с 2001 года ежегодное число новых ВИЧ-инфекций увеличилось более чем в два раза.

Основные пути передачи ВИЧ

- Эпидемии в регионе концентрируются в основном среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, работников секс-бизнеса и их различных сексуальных партнеров. Из общего числа новых зарегистрированных случаев ВИЧ – где имеется информация о способе передачи ВИЧ – почти две трети (62%) случаев заражения были обусловлены употреблением инъекционных наркотиков.
- В **Российской Федерации** показатель распространенности ВИЧ среди тех, кто употребляет инъекционные наркотики, колеблется от 3% в Волгограде до более 70% в Бийске. Показатель распространенности также является высоким среди потребителей инъекционных наркотиков в **Украине**; среди потребителей инъекционных наркотиков, обследованных в рамках национальных диагностических исследований, этот показатель увеличился с 11% в 2001 году до 17% в 2006 году.
- По мере развития эпидемий в этом регионе растет пропорция женщин, зараженных ВИЧ. В 2006 году около 40% новых случаев ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии были зарегистрированы среди женщин. В целом в регионе, по оценкам, около 35% ВИЧ-позитивных женщин заразились через использование инфицированного инъекционного инструментария и около 50% заразились ВИЧ через незащищенные половые контакты с партнерами, употребляющими инъекционные наркотики.
- В 2006 году менее 1% новых случаев ВИЧ (где имеется информация о способе передачи инфекции) были обусловлены незащищенными половыми контактами между мужчинами; эта цифра, вероятно, занижает роль данного способа передачи ВИЧ.

Дополнительные страновые данные¹

¹ См. *Восточная Европа и Центральная Азия: Развитие эпидемии СПИДа: региональное резюме, 2007 г.*

- Ежегодное число новых зарегистрированных диагнозов ВИЧ растет в **Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Республике Молдова, Таджикистане и Узбекистане**, где сейчас развивается самая крупная эпидемия в Центральной Азии.
- В регионе по-прежнему нарастают усилия, направленные на внедрение и в некоторых случаях на расширение программ снижения вреда. В 2007 году в **Российской Федерации** действовало более 50 проектов по обмену игл и шприцев; после 2005 года в **Казахстане** национальная программа снижения вреда осуществлялась более чем на 120 участках. Некоторые страны внедрили пилотные проекты для лечения с использованием заместителей опиоидов, в том числе **Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстане, Республика Молдова и Узбекистане**
- В **Российской Федерации** эпидемия ВИЧ в основном концентрируется в городских и промышленных центрах страны. Почти 60% случаев ВИЧ, зарегистрированных на сегодняшний день, приходится на 10 крупных городов и регионов, включая города Санкт-Петербург и Москву.
- В **Украине** предприняты значительные шаги для ограничения уровня передачи ВИЧ от матери ребенку. В 2006 году 95% всех беременных женщин прошли тестирование на ВИЧ и 93% ВИЧ-позитивных женщин, родивших ребенка, получали антиретровирусную профилактику для предупреждения передачи ВИЧ во время беременности и деторождения.
- В 2006 году в **Казахстане** две трети новых ВИЧ-инфекций были зарегистрированы среди тех, кто употребляет инъекционные наркотики. В **Кыргызстане и Таджикистане** эпидемии ВИЧ также в основном концентрируются среди потребителей инъекционных наркотиков. В **Туркменистане** официально были зарегистрированы лишь два случая ВИЧ, а информация о потенциальной возможности для передачи ВИЧ в стране очень ограничена.
- В **Беларуси** эпидемия ВИЧ, вероятно, стабилизировалась: после 2003 года ежегодное число новых регистрируемых диагнозов ВИЧ колебалось лишь незначительно – от 713 до 778 случаев. Большинство ВИЧ-инфекций регистрируется в городских или пригородных районах, таких как столица страны Минск, и в основном среди тех, кто употребляет инъекционные наркотики. Растет число женщин, затронутых проблемой ВИЧ. По данным широкомасштабного тестирования на ВИЧ, проведенного в 2006 году, 80% новых случаев ВИЧ среди женщин были обусловлены небезопасными половыми контактами – это выше по сравнению с 56% в 2003 году.
- С 2003 года число новых случаев ВИЧ, зарегистрированных в **Республике Молдова**, увеличилось более чем в два раза и в 2006 году составило 621 случай. Из них почти 60% случаев были обусловлены незащищенными половыми контактами.

Лицо для контактов:

Софи Бартон-Нотт | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaid.org | www.unaids.org