



# Глобальные факты и цифры

08

[Источник: Доклад о глобальной эпидемии СПИДа 2008 года, август 2008 г.]

## Эпидемия СПИДа сегодня

- В 2007 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ, составляло 33 [30,3 – 36,1] миллиона человек. В прошлом году зарегистрировано 2,7 [2,2 – 3,2] миллиона новых ВИЧ-инфекций и 2 [1,8 – 2,3] миллиона смертей, связанных со СПИДом.
- В ряде стран темпы роста новых ВИЧ-инфекций снизились, однако в глобальном масштабе эти благоприятные тенденции, по крайней мере частично, нивелируются ростом числа новых инфекций в других странах.
- На Африку к югу от Сахары приходится две трети (67%) всех людей, живущих с ВИЧ во всем мире.
- В глобальном масштабе на женщин приходится половина всех ВИЧ-инфекций – этот процент остается стабильным в течение нескольких последних лет.
- По оценкам, в 2007 году ВИЧ заразились 370 000 [330 000 – 410 000] детей (моложе 15 лет). Общее число детей, живущих с ВИЧ, увеличилось с 1,6 [1,4 – 2,1] миллиона в 2001 до 2 [1,9 – 2,3] миллиона в 2007 году – почти 90% из них живут в Африке к югу от Сахары.
- Глобальный процент взрослых, живущих с ВИЧ, с 2000 года выровнялся. Фактически во всех регионах за исключением Африки к югу от Сахары ВИЧ диспропорционально сильно воздействует на тех, кто употребляет инъекционные наркотики, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и работников секс-бизнеса.

## Региональная статистика

	Число людей, живущих с ВИЧ	Число новых ВИЧ-инфекций в 2007 году	Число смертей вследствие СПИДа в 2007 году	Показатель распространенности ВИЧ среди взрослых (%)
<b>Африка к югу от Сахары</b>	22 миллиона [20,5 – 23,6 миллиона]	1,9 миллиона [1,6 – 2,1 миллиона]	1,5 миллиона [1,3 – 1,7] миллиона	5% [4,6% – 5,4%]
<b>Южная и Юго-Восточная Азия</b>	4,2 миллиона [3,5 – 5,3 миллиона]	330 000 [150 000 – 590 000]	340 000 [230 000 – 450 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]
<b>Восточная Азия</b>	740 000 [480 000 – 1,1 миллиона]	52 000 [29 000 – 84 000]	40 000 [24 000 – 63 000]	0,1% [<0,1% – 0,2%]
<b>Латинская Америка</b>	1,7 миллиона [1,5 – 2,1 миллиона]	140 000 [88 000 – 190 000]	63 000 [49 000 – 98 000]	0,5% [0,4% – 0,6%]
<b>Северная Америка</b>	1,2 миллиона [760 000 – 2 миллиона]	54 000 [9600 – 130 000]	23 000 [9100 – 55 000]	0,6% [0,4% – 1,0%]
<b>Западная и Центральная Европа</b>	730 000 [580 000 – 1 миллион]	27 000 [14 000 – 49 000]	8000 [4800 – 17 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]

Объединить мир против СПИДа

<b>Восточная Европа, Центральная Азия</b>	1,5 миллиона [1,1 – 1,9 миллиона]	110 000 [67 000 – 180 000]	58 000 [41 000 – 88 000]	0,8% [0,6% – 1,1%]
<b>Карибский бассейн</b>	230 000 [210 000 – 270 000]	20 000 [16 000 – 25 000]	14 000 [11 000 – 16 000]	1,1% [1,0% – 1,2%]
<b>Океания</b>	74 000 [66 000 – 93 000]	13 000 [12 000 – 15 000]	1000 [<1000 – 1400]	0,4% [0,3% – 0,5%]
<b>Всего</b>	<b>33 миллиона</b> [30,3 – 36,1 миллиона]	<b>2,7 миллиона</b> [2,2 – 3,2 миллиона]	<b>2 миллиона</b> [1,8 – 2,3 миллиона]	<b>0,8%</b> [0,7% – 0,9%]

Примечание: Некоторые цифры при суммировании не совпадают вследствие округления.

## Профилактика

- В последние два года был достигнут прогресс в профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.
  - Процент беременных женщин, живущих с ВИЧ, которые получают антиретровирусное лечение для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку, увеличился с 9% в 2004 году до 33% в 2007 году.
  - В таких странах как Ботсвана, Намибия, Свазиленд и Южная Африка расширился охват услугами для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.
- Расширение программ профилактики ВИЧ во всем мире имеет первостепенное значение.
  - Последние данные, полученные из 64 стран, указывают на то, что менее 40% молодых людей имеют основную информацию о ВИЧ.
  - Существуют положительные признаки улучшения положения во всех 18 наиболее пострадавших странах, в том числе данные об изменении основных моделей поведения – начало половой жизни до 15 лет, наличие нескольких партнеров и пользование презервативами, – однако позитивные изменения во всех трех моделях поведения отмечены лишь в 2 странах (Замбия и Камерун).
- Что касается тех, кому грозит самый высокий риск, после 2005 года масштабы усилий по профилактике ВИЧ, нацеленные на работников секс-бизнеса, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и потребителей инъекционных наркотиков, были расширены в три раза.
  - Дискриминация остается препятствием на пути получения доступа к профилактике для групп населения, которым грозит самый высокий риск; с другой стороны, страны, которые обеспечивают защиту этих групп населения от дискриминации, как правило, охватывают все большее число таких людей программами по профилактике ВИЧ.
- Число новых ВИЧ-инфекций продолжает опережать число людей, получающих лечение: на каждые два человека, получающих антиретровирусное лечение, приходится пять новых ВИЧ-инфицированных.

## Лечение

- По состоянию на конец 2007 года в странах с низким и средним уровнем доходов антиретровирусное лечение получали почти 3 [2,7 – 3,2] миллиона человек. Это составляет 31% от общего оценочного числа лиц, нуждающихся в лечении; в то же время этот показатель на 45% выше по сравнению с 2006 годом.
- Во всем мире охват лечением среди женщин выше, чем среди мужчин.

- В то же время уровень охвата детей ниже уровня охвата взрослых. В Африке к югу от Сахары дети, живущие с ВИЧ, в три раза реже получают антиретровирусное лечение по сравнению с взрослыми.
- Во многих странах очень сильно увеличился процент охвата лечением.
  - В Намибии охват лечением увеличился с 1% в 2003 году до 88% в 2007 году; такой же рост наблюдался в Руанде – с 3% до 71% за тот же период.
  - Ботсвана достигла одного из самых высоких в мире уровней охвата лечением в связи с ВИЧ: в 2007 году более 90% нуждающихся получали лекарственные препараты.
- Рост смертности, который наблюдался в течение нескольких десятилетий, в последние два года сменился снижением числа смертей вследствие СПИДа, отчасти в результате расширения доступа к лечению.
- Расходы на лечение в связи с ВИЧ будут продолжать расти, поскольку многие получающие лечение нуждаются в схемах лечения второго и третьего ряда, а более позднее начало лечения усложняет процесс ведения больных, поскольку, по оценкам, 30 миллионов ВИЧ-позитивных людей во всем мире никогда не получали лечения.
  - В Бразилии оценочные затраты на предоставление лекарственных препаратов в 2008 году составляют 525 миллионов долларов США – это более чем в два превышает затраты в 2004 году.
- Большинство стран имеют политику, предусматривающую бесплатное предоставление антиретровирусных препаратов; в то же время многие пациенты вынуждены самостоятельно нести такие расходы, как оплата за диагностические тесты, лечение при оппортунистических инфекциях и расходы на проезд, которые могут оказаться весьма значительными в зависимости от местного контекста.
  - Понимая потребность в таких затратах, в 2007 году Правительство Камеруна сделало лечение в связи с ВИЧ бесплатным, в то время как Национальное управление железных дорог Индии в 2008 году ввело сниженные тарифы оплаты за проезд для ВИЧ-позитивных при переезде к местам лечения.

### Охват антиретровирусным (АРВ) лечением

Географический регион	Оценочное число людей, получающих АРВ-лечение, декабрь 2007 г.	Оценочное число людей, нуждающихся в АРВ-лечении, декабрь 2007 г.	Охват АРВ-лечением, декабрь 2007 г.
Африка к югу от Сахары	2,1 миллиона	7 миллионов	30%
Латинская Америка и Карибский бассейн	390 000	630 000	62%
Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия	420 000	1,7 миллиона	25%
Европа, Центральная Азия	54 000	320 000	17%
Ближний Восток, Северная Африка	7000	100 000	7%
<b>Всего</b>	<b>2,9 миллиона</b>	<b>9,7 миллиона</b>	<b>31%</b>

Примечание: Некоторые цифры при суммировании не совпадают вследствие округления.  
 Источник: *В направлении всеобщего доступа: расширение приоритетных мер вмешательства в связи с ВИЧ/СПИДом в секторе здравоохранения: отчет о ходе выполнения за 2008 г.*, ВОЗ/ЮНЭЙДС/ЮНИСЕФ, июнь 2008 г.

## Туберкулез и ВИЧ

- Туберкулез остается одной из основных причин смертности среди людей, живущих с ВИЧ, в странах с низким и средним уровнем доходов.
- В то время как в последние годы смертность от туберкулеза снизилась в глобальном масштабе, число случаев туберкулеза продолжает увеличиваться в районах, сильно затронутых проблемой ВИЧ или лекарственно-устойчивого ТБ.
  - По оценкам, 22% случаев туберкулеза в Африке регистрируется среди людей, живущих с ВИЧ, причем в некоторых странах этого континента эта цифра достигает 70%.
  - Среди больных ТБ с ВИЧ туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) встречается в два раза чаще, чем среди больных, не имеющих ВИЧ.
- Несмотря на наличие доступных схем лечения от туберкулеза, лишь 32% людей, живущих с ВИЧ и больных ТБ, получали антиретровирусные и противотуберкулезные препараты – причем самая сильная потребность в таком двойном лечении отмечается в Африке к югу от Сахары.
- Необходимо активизировать усилия, направленные на профилактику, диагностику и лечение в связи с ТБ в условиях ухода за людьми, живущими с ВИЧ.

Лицо для контактов:

**Эдуард Мишо** | +41 22 791 5587 | [mishaude@unaids.org](mailto:mishaude@unaids.org) | [www.unaids.org](http://www.unaids.org)