



Латинская Америка

Последние тенденции в развитии эпидемии

- В 2007 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций составило 140 000 [88 000–190 000], в результате чего общее число людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, достигло 1,7 [1,5–2,1 million] миллиона человек. По оценкам, в прошлом году от болезней, связанных со СПИДом, умерли 63 000 [49 000–98 000] человек.
- Самые крупные эпидемии в регионе развиваются в странах с самой большой численностью населения, в частности в **Бразилии**, на которую приходится более 40% (730 000 [600 000–890 000]) человек, живущих с этим вирусом; далее следует **Мексика**, где проживают 200 000 [150 000–310 000] ВИЧ-позитивных.
- Эпидемии ВИЧ в Латинской Америке остаются в целом устойчивыми, изменившись в последнее десятилетие незначительно; однако передача ВИЧ в регионе в основном имеет место среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, работников секс-бизнеса и (в меньшей степени) среди тех, кто употребляет инъекционные наркотики.

Основные пути передачи ВИЧ

- Скрытые эпидемии ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, имеют место в ряде стран Центральной Америки – в **Мексике** более половины (57%) диагнозов ВИЧ, зарегистрированных на данный момент в стране, было обусловлено незащищенными половыми контактами между мужчинами.
- Исследования показали высокие уровни распространенности ВИЧ среди женщин, занятых в секс-бизнесе, в **Гондурасе** (10%), **Гватемале** (4%) и **Сальвадоре** (3%). В то же время в последнее время были получены некоторые данные, указывающие на резкое снижение показателя распространенности ВИЧ среди женщин, занятых в секс-бизнесе, в Гондурасе, где в последние годы были активизированы действия, направленные на пропаганду презервативов.
- В ряде стран растет число женщин, зараженных этим вирусом. В **Уругвае**, по оценкам, на незащищенные половые приходится две трети новых случаев ВИЧ; причем женщины в основном заражаются через своих партнеров-мужчин, которые в свою очередь заразились ВИЧ через незащищенные половые контакты с другими мужчинами или через использование зараженных игл или шприцев.
- Передача ВИЧ в результате употребления инъекционных наркотиков по-прежнему играет роль в развитии эпидемий в ряде стран Южной Америки, хотя в целом в регионе на этот путь передачи приходится все меньшее число новых ВИЧ-инфекций. Например, в **Аргентине** употребление инъекционных наркотиков обусловило всего лишь около 5% новых ВИЧ-инфекций, зарегистрированных в Буэнос-Айресе с 2003 по 2005 годы.

Дополнительные страновые данные ¹

¹ См. *Латинская Америка: Развитие эпидемии СПИДа: региональное резюме, 2007 г.*

- Для повышения уровня понимания нынешних тенденций в развитии эпидемий во многих странах региона необходимо улучшить системы эпиднадзора за ВИЧ.
- Несмотря на то что в **Бразилии** проживает около одной трети всех людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, уделение внимания вопросам обеспечения доступа к услугам по профилактике и лечению в связи с ВИЧ помогло сохранить устойчивый характер эпидемии в стране. Между тем широкое распространение антиретровирусной терапии позволило снизить с 1996 по 2002 годы показатели смертности вследствие СПИДа в два раза.
- Высокий показатель распространенности ВИЧ обнаружен среди заключенных в **Бразилии**. Почти 6% заключенных мужчин, прошедших тестирование в тюрьме в Сан-Паулу, оказались ВИЧ-позитивными. Уровни знаний о ВИЧ среди заключенных оказались высокими, однако доступ к услугам для профилактики ВИЧ в тюрьмах остается неадекватным.
- В последние годы незащищенные половые стали основным путем передачи ВИЧ в **Аргентине**. Как и в других странах региона, самый высокий показатель распространенности ВИЧ был обнаружен среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
- По оценкам, в **Уругвае** на незащищенные половые контакты (в основном гетеросексуальные) приходится две трети всех случаев ВИЧ. Уровни распространения инфекции также высоки среди определенных групп в столице Монтевидео: показатель распространенности ВИЧ составляет 22% среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и 19% среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики.
- В **Чили** большая часть ВИЧ-инфекций регистрируется среди мужчин, хотя растет число женщин, заражающихся ВИЧ от своих партнеров-мужчин, которые могли заразиться через незащищенные половые контакты с другими мужчинами. По данным исследований, опубликованным в 2007 году, показатель распространенности ВИЧ оказался низким среди женщин, занятых в секс-бизнесе; следовательно, небезопасные гетеросексуальные платные контакты, вероятно, обуславливают лишь небольшой процент нынешних ВИЧ-инфекций.
- Половые контакты между мужчинами по-прежнему являются основным путем передачи ВИЧ в **Боливии, Колумбии, Перу и Эквадоре**.

Лицо для контактов:

Софи Бартон-Нотт | tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org
