

América del Norte, Europa Occidental y Central

Tendencias epidemiológicas más recientes

- Se estima que en 2007 correspondían a los **Estados Unidos de América** cerca de 1,2 millones [690 000–1,9 millones], o aproximadamente el 60%, de los 2 millones [1,4–2,8 millones] de personas que vivían con el VIH en América del Norte y Europa Occidental y Central. En el conjunto de esas regiones, en 2007 se infectaron por el VIH 81 000 [30 000–170 000] personas y fallecieron por enfermedades relacionadas con el VIH 31 000 [16 000–67 000] personas.
- A ambos lados del Atlántico, la cifra estimada de personas que viven con el VIH continúa aumentando por razón del amplio acceso al tratamiento antirretrovírico. Sin embargo, las regiones divergen en cuanto al recuento de nuevas infecciones por el VIH: en América del Norte ha permanecido relativamente estable en los últimos años, mientras que en Europa Occidental los diagnósticos de VIH están aumentando.

Principales fuentes de transmisión

- En todas las regiones están presentes los factores impulsores comunes de la transmisión del VIH.
- Las relaciones sexuales sin protección entre varones siguen siendo el principal modo de transmisión en el **Canadá** y los **Estados Unidos**: en 2006 contabilizaron el 40% de los nuevos diagnósticos de VIH en el primero de esos países, y en 2005 el 53% en el último de ellos.
- En diversos países de **Europa Occidental**, las relaciones sexuales sin protección de alto riesgo entre varones parecen estar relacionadas con el creciente número de nuevos diagnósticos de VIH en este colectivo. En **Alemania**, las nuevas infecciones por el VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres crecieron en un 96% (alcanzando la cifra de 1370) entre 2002 y 2006.
- En los **Estados Unidos**, cerca de una tercera parte (32%) de los nuevos casos de infección por el VIH y de sida diagnosticados en 2005 se atribuyeron al coito heterosexual de alto riesgo. Se ha detectado una situación similar en Europa Occidental, donde las relaciones sexuales sin protección entre hombres y mujeres fueron las causantes de la mayor parte (42%) de los nuevos diagnósticos de VIH en la región en 2006.
- En Europa Occidental, una proporción cada vez menor de los diagnósticos de VIH (6% en 2006) está relacionada con el uso de equipo de inyección contaminado. En **Dinamarca** y los **Países Bajos**, el número de diagnósticos de VIH entre personas que se inyectan drogas se redujo en un 72% y un 91%, respectivamente, en 2002-2006. En Europa Central, las nuevas infecciones por el VIH notificadas en personas que se inyectan drogas también descendieron.

Datos nacionales adicionales¹

¹ De *North America, Western and Central Europe: AIDS epidemic update 2007, regional summary*

- En América del Norte, las epidemias de VIH continúan afectando de modo desproporcionado a los afroamericanos en los **Estados Unidos** y a la población aborigen en el **Canadá**.
- En 2007, se obtuvo más información sobre los efectos del acceso más generalizado a la terapia antirretrovírica eficaz en los **Estados Unidos**. De acuerdo con un estudio efectuado en seis estados, los ingresos hospitalarios de personas con el VIH decayeron en un 44% entre 2000 y 2004, y la edad promedio de las personas ingresadas en el hospital por esta causa también se redujo.

Contacto:

Sophie Barton-Knott | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org