

## Oceanía

### Tendencias epidemiológicas más recientes

- Se estima que en 2007 en Oceanía vivían con el VIH 74 000 [66 000–93 000] personas, de las cuales 13 000 [12 000–15 000] eran nuevas infecciones.
- La epidemia de la región es relativamente pequeña, excepto en el caso de **Papúa Nueva Guinea**, donde el número de personas que viven con el VIH ha aumentado de 10 000 [9800–10 000] en 2001 a 54 000 [53 000 – 55 000] en 2007. En **Australia**, el total de personas que vivían con el VIH alcanzó la cifra de 18 000 [11 000–36 000] el mismo año.

### Principales fuentes de transmisión

- Todo parece indicar que el modo principal de transmisión del VIH en **Papúa Nueva Guinea** es el coito heterosexual sin protección, y las relaciones sexuales remuneradas no protegidas también son un factor de gran importancia.
- Las relaciones sexuales sin protección entre varones es la causa principal de la infección por el VIH en **Australia** y **Nueva Zelandia**. Tras descender pronunciadamente en el decenio de 1990, en Australia los nuevos diagnósticos de VIH han aumentado, pasando de 763 casos notificados en 2000 a 998 casos notificados en 2006.

### Datos nacionales adicionales<sup>1</sup>

- En **Papúa Nueva Guinea**, se ha detectado una elevada prevalencia de infecciones de transmisión sexual sin tratar tanto en la población general como en grupos de alto riesgo de exposición. En recientes estudios comunitarios se ha encontrado que alrededor del 40% de las personas estaban infectadas por al menos una infección de transmisión sexual.
- **Papúa Nueva Guinea** está realizando algunos progresos en la ampliación de los puntos de asesoramiento y pruebas voluntarias —en todo el país hay cerca de 75 en funcionamiento—, lo cual ha tenido como resultado un mayor número de personas sometidas a la prueba del VIH: la cifra se ha triplicado desde 2002. No obstante, el sida continúa siendo la principal causa de ingreso hospitalario y muerte. En el Hospital General de Port Moresby, hasta el 70% de las camas están ocupadas por pacientes con enfermedades relacionadas con el VIH.
- Ninguno de los otros países y territorios de Oceanía ha comunicado más de 300 casos de VIH desde que se iniciaron las pruebas. Sin embargo, los factores de riesgo asociados a los brotes de VIH son prevalentes en muchos de ellos; por ej., en los pequeños estados insulares de **Fiji**, **Kiribati** y **Tonga**, la utilización del preservativo es sumamente baja en todos los grupos de población.

Contacto:

<sup>1</sup> De *Oceania: AIDS epidemic update 2007, regional summary*

Sophie Barton-Knott | +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org) | [www.unaids.org](http://www.unaids.org)