

Océanie

Tendances épidémiologiques récentes

- On estime que 74 000 [66 000–93 000] personnes vivaient avec le VIH en Océanie en 2007, dont 13 000 [12 000–15 000] étaient atteintes de nouvelles infections.
- Les épidémies de la région sont relativement modestes, à l'exception de celle de la **Papouasie-Nouvelle-Guinée**, où le nombre de personnes vivant avec le VIH a passé de 10 000 [9800–10 000] en 2001 à 54 000 [53 000 – 55 000] en 2007. Cette année-là, en **Australie**, un total de 18 000 [11 000–36 000] personnes vivaient avec le VIH.

Principaux modes de transmission du VIH

- Les rapports hétérosexuels non protégés semblent être la principale voie de transmission du VIH en **Papouasie-Nouvelle-Guinée**, et les rapports sexuels tarifés sans protection constituent également un facteur important.
- Les rapports sexuels non protégés entre hommes sont la principale cause d'infection à VIH en **Australie** et en **Nouvelle-Zélande**. Après avoir nettement baissé dans les années 1990, les nouveaux diagnostics de VIH sont en hausse en Australie, passant de 763 cas notifiés en 2000 à 998 notifications en 2006.

Autres données par pays¹

- En **Papouasie-Nouvelle-Guinée**, on relève une forte prévalence d'infections sexuellement transmissibles non traitées, tant dans la population générale que dans les groupes exposés à un risque plus élevé. De récentes études communautaires ont observé que 40% environ des personnes interrogées étaient atteintes d'une infection sexuellement transmissible au moins.
- La **Papouasie-Nouvelle-Guinée** a fait quelques progrès dans l'augmentation des sites de conseil et de test volontaires—quelque 75 sites sont maintenant opérationnels dans l'ensemble du pays—avec pour résultat une augmentation du nombre de personnes testées, nombre qui a été multiplié par trois depuis 2002. Mais le sida reste la principale cause d'hospitalisation et de décès. A l'hôpital général de Port Moresby, jusqu'à 70% des lits sont occupés par des personnes atteintes de maladies liées au VIH.
- Aucun des autres pays et territoires d'Océanie n'a signalé plus de 300 cas de VIH depuis le début du dépistage. Mais les facteurs de risque associés aux flambées de VIH sont fréquents dans un grand nombre d'entre eux ; les petits Etats insulaires de **Fiji**, **Kiribati** et **Tonga** indiquent que le recours au préservatif est extrêmement rare dans tous les groupes de la population.

Contact:

Sophie Barton-Knott | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org

¹ Source: *Océanie: le Point sur l'épidémie de sida 2007, résumés par région.*