



Океания

Последние тенденции в развитии эпидемии

- По оценкам, в 2007 году число людей, живущих с ВИЧ в Океании, составляло 74 000 [66 000–93 000] человек, включая 13 000 [12 000–15 000] новых ВИЧ-инфицированных.
- Эпидемии в регионе являются относительно небольшими, за исключением **Папуа – Новой Гвинеи**, где число людей, живущих с ВИЧ, увеличилось с 10 000 [9800–10 000] человек в 2001 году до 54 000 [53 000 – 55 000] человек в 2007 году. В том же году общее число людей, живущих с ВИЧ в **Австралии**, составляло 18 000 [11 000–36 000] человек.

Основные пути передачи ВИЧ

- Основным путем передачи ВИЧ в **Папуа – Новой Гвинее** являются небезопасные гетеросексуальные контакты; другим основным фактором является платный секс.
- Основным путем заражения ВИЧ в **Австралии и Новой Зеландии** являются незащищенные половые контакты между мужчинами. После резкого уменьшения в 1990-х годах число новых диагнозов ВИЧ увеличилось – с 763 в 2000 году до 998 в 2006 году.

Дополнительные страновые данные ¹

- В **Папуа – Новой Гвинее** высокий показатель распространенности инфекций, передающихся половым путем, отмечается как среди населения в целом, так и среди групп с повышенным риском контакта с инфекцией. По данным исследования, проведенного недавно среди населения, около 40% инфицированных имели по крайней мере одну инфекцию, передающуюся половым путем.
- В **Папуа – Новой Гвинее** отмечается некоторый прогресс в плане расширения участков, где проводится добровольное консультирование и тестирование, – всего в стране действует 75 таких участков – что привело к увеличению числа людей, проходящих тестирование на ВИЧ; их число увеличивалось ежегодно в три раза начиная с 2002 года. Тем не менее СПИД остается основной причиной госпитализации и смертности среди населения. В общей больнице Порт-Морсби до 70% коек занимают пациенты с болезнями, связанными с ВИЧ.
- После начала проведения тестирования ни одна другая страна или территория Океании не имела более 300 случаев ВИЧ. Однако во многих странах широко распространены факторы риска, связанные со вспышками ВИЧ; по данным, полученным из малых островных государств **Кирибати, Тонга и Фиджи**, практика пользования презервативами распространена очень слабо среди всех групп населения.

¹ См. *Океания: Развитие эпидемии СПИДа: региональное резюме, 2007 г.*

Лицо для контактов:

Софи Бартон-Нотт | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org | www.unaids.org