


Estadísticas y características regionales del VIH y del sida, 2007

	Adultos y niños que vivían con el VIH	Nuevas infecciones por el VIH en adultos y niños	Prevalencia del VIH en adultos (15-49) [%]	Defunciones de adultos y niños por causa del sida
África subsahariana	22,0 millones [20,5 – 23,6 millones]	1,9 millones [1.6 – 2.1 millones]	5,0% [4,6% – 5,4%]	1,5 millones [1,3 – 1,7 millones]
África del norte y Oriente Medio	380 000 [280 000 – 510 000]	40 000 [20 000 – 66 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	27 000 [20 000 – 35 000]
Asia meridional y sudoriental	4,2 millones [3,5 – 5,3 millones]	330 000 [150 000 – 590 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	340 000 [230 000 – 450 000]
Asia oriental	740 000 [480 000 – 1,1 millones]	52 000 [29 000 – 84 000]	0,1% [<0,1% – 0,2%]	40 000 [24 000 – 63 000]
América Latina	1,7 millones [1,5 – 2,1 millones]	140 000 [88 000 – 190 000]	0,5% [0,4% – 0,6%]	63 000 [49 000 – 98 000]
Caribe	230 000 [210 000 – 270 000]	20 000 [16 000 – 25 000]	1,1% [1,0% – 1,2%]	14 000 [11 000 – 16 000]
Europa oriental y Asia central	1,5 millones [1,1 – 1,9 millones]	110 000 [67 000 – 180 000]	0,8% [0,6% – 1,1%]	58 000 [41 000 – 88 000]
Europa occidental y central	730 000 [580 000 – 1,0 millones]	27 000 [14 000 – 49 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	8 000 [4 800 – 17 000]
América del Norte	1,2 millones [760 000 – 2,0 millones]	54 000 [9 600 – 130 000]	0,6% [0,4% – 1,0%]	23 000 [9 100 – 55 000]
Oceanía	74 000 [66 000 – 93 000]	13 000 [12 000 – 15 000]	0,4% [0,3% – 0,5%]	1 000 [<1 000 – 1 400]
TOTAL	33 millones [30 – 36 millones]	2,7 millones [2,2 – 3,2 millones]	0,8% [0,7% - 0,9%]	2,0 millones [1,8 – 2,3 millones]

Número estimado de adultos y niños fallecidos por causa del sida, 2007



Total: 2,0 (1,8 – 2,3) millones

Estimaciones mundiales 2007

Niños (< 15 años)

- **Niños que vivían con el VIH** ----- **2,0 millones** [1,9 – 2,3 millones]
- **Nuevas infecciones por el VIH en 2007** **370 000** [330 000 – 410 000]
- **Defunciones causadas por el sida en 2007** ----- **270 000** [250 000 – 290 000]