


Estimation du nombre de personnes vivant avec le VIH et prévalence du VIH chez les adultes, dans le monde et en Afrique subsaharienne, 1990-2007*

Monde

Nombre de personnes vivant avec le VIH (millions)


% prévalence VIH adulte (15-49)



Afrique subsaharienne

Nombre de personnes vivant avec le VIH (millions)

% prévalence VIH adulte (15-49)




- Nombre de personnes vivant avec le VIH
- % prévalence VIH, adulte (15-49)
- ┆┆ Ces lignes indiquent la fourchette entourant l'estimation

*Même si la prévalence du VIH s'est stabilisée en Afrique subsaharienne, le nombre réel des personnes infectées poursuit sa hausse en raison de la croissance démographique.

Infections à VIH 2007: un aperçu mondial

33 millions de personnes [30 – 36 millions] vivaient avec le VIH en 2007



Prévalence chez les adultes (%)

- 15,0% – 28,0%
- 5,0% – <15,0%
- 1,0% – <5,0%
- 0,5% – <1,0%
- 0,1% – <0,5%
- <0,1%
- Pas de données disponibles




Statistiques et caractéristiques régionales du VIH et du sida, 2007

	Adultes & enfants vivant avec le VIH	Nouveaux cas d'infection à VIH chez les adultes et les enfants	Prévalence chez les adultes (15-49) [%]	Décès dus au sida chez l'enfant et l'adulte
Afrique subsaharienne	22,0 millions [20,5 – 23,6 million]	1,9 million [1,3 – 2,4 millions]	5,0% [4,6% – 5,4%]	1,5 million [1,3 – 1,7 million]
Moyen-Orient & Afrique du Nord	380 000 [280 000 – 510 000]	40 000 [18 000 – 69 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	27 000 [20 000 – 35 000]
Asie du Sud & du Sud-Est	4,2 millions [3,5 – 5,3 million]	330 000 [76 000 – 680 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	340 000 [230 000 – 450 000]
Asie de l'Est	740 000 [480 000 – 1,1 million]	51 000 [27 000 – 86 000]	0,1% [<0,1% – 0,2%]	40 000 [24 000 – 63 000]
Amérique latine	1,7 million [1,5 – 2,1 million]	110 000 [37 000 – 200 000]	0,5% [0,4% – 0,6%]	63 000 [49 000 – 98 000]
Caraïbes	230 000 [210 000 – 270 000]	20 000 [14 000 – 27 000]	1,1% [1,0% – 1,2%]	14 000 [11 000 – 16 000]
Europe orientale & Asie centrale	1,5 millions [1,1 – 1,9 million]	110 000 [53 000 – 200 000]	0,8% [0,6% – 1,1%]	58 000 [41 000 – 88 000]
Europe occidentale et centrale	730 000 [580 000 – 1,0 million]	27 000 [3200 – 69 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	8000 [4800 – 17 000]
Amérique du Nord	1,2 million [760 000 – 2,0 million]	54 000 [7600 – 130 000]	0,6% [0,4% – 1,0%]	23 000 [9100 – 55 000]
Océanie	74 000 [66 000 – 93 000]	13 000 [12 000 – 15 000]	0,4% [0,3% – 0,5%]	1000 [<1000 – 1400]
TOTAL	33 millions [30 – 36 million]	2,7 millions [1,6 – 3,9 million]	0,8% [0,7% - 0,9%]	2,0 millions [1,8 – 2,3 million]


Dans ce Tableau, les fourchettes autour des estimations définissent les limites dans lesquelles se situent les chiffres mêmes, sur la base des meilleures informations disponibles.

Rapport sur l'épidémie
mondiale de sida, 2008


Prévalence du VIH (%) chez les femmes enceintes en consultations prénatales en Afrique subsaharienne, 1997-2007



Prévalence du VIH (%) parmi les 15 à 24 ans, par sexe, pour des pays choisis, 2005-2007




Nouvelles infections à VIH chez les enfants, 1990-2007




┆ Ce trait indique la fourchette entourant l'estimation

Décès dus au sida chez les enfants, 1990-2007




┆ Ce trait indique la fourchette entourant l'estimation

Estimation du nombre de décès dus au sida chez les adultes et les enfants à l'échelle mondiale, 1990-2007



┆ Ce trait indique la fourchette entourant l'estimation


Nombre et pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant un traitement antirétroviral, 2004–2007




Source: ONUSIDA, UNICEF & OMS, 2008; données fournies par les pays..

Pourcentage médian de population accédant aux services de prévention du VIH au sein du contexte juridique spécifié


Pourcentage médian de population accédant aux services de prévention du VIH
(UNGASS indicator 9)



Connaissances complètes sur le VIH chez les jeunes (15-24 ans), 1999–2007




Pourcentage des populations les plus à risque atteintes par les programmes de prévention du VIH, 2005–2007



* Pourcentage de professionnel(le)s du sexe et d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes déclarant savoir où ils/elles peuvent se soumettre à un test de dépistage du VIH et avoir reçu des préservatifs.


** Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant savoir où ils peuvent se soumettre à un test de dépistage du VIH et avoir reçu des préservatifs et des aiguilles/des seringues stériles.

Nombre de personnes sous traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 2002-2007



Source: Données fournies par l'ONUSIDA et l'OMS, 2008.

Comparaison de la couverture de la thérapie antirétrovirale en 2007 entre les hommes et les femmes (pour les pays fournissant des données par sexe sur le nombre de personnes sous traitement)



Note: Les estimations de couverture utilisent le ratio du nombre d'hommes et de femmes bénéficiant d'une thérapie antirétrovirale à la valeur finale projetée de toutes les personnes sous thérapie antirétrovirale en décembre 2007. Ceci nous donne des estimations pour décembre 2007 du nombre d'hommes et de femmes sous thérapie antirétrovirale, qui sont ensuite divisées par le nombre estimatif des hommes et femmes respectivement qui ont besoin d'un traitement antirétroviral.

Dépenses VIH par habitant provenant de sources intérieures publiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 2004-2007

