



Annexe

Indicateurs de progrès par pays



Annexe 2



Indicateurs de progrès par pays

Rapports par pays et validation des données

A la date de mars 2008, 147 pays avaient remis à l'ONUSIDA leur rapport d'activité sur la mise en œuvre de la *Déclaration d'engagement sur le VIH/sida*. Les indicateurs repris dans ce document provenaient de la *Déclaration d'engagement sur le VIH/sida* originale de la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies (2001). Les données des tableaux ci-joints reprennent les données des rapports d'activité des pays ainsi que des informations provenant d'autres sources.

Les spécialistes en évaluation travaillant à l'ONUSIDA ont procédé à un examen attentif des données pour vérifier que les rapports de pays étaient complets, exacts et en harmonie avec les indicateurs retenus. L'ONUSIDA a envoyé des questions de suivi à 118 pays; 80% des questions relatives aux données ont pu être résolues au cours de ce suivi. Les questions non résolues à temps pour être publiées n'ont pas été incluses dans les analyses du présent rapport. On a procédé en outre à l'harmonisation des données parvenues à l'ONUSIDA; au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme; à l'UNICEF; au Plan présidentiel d'urgence d'aide à la lutte contre le sida (Etats-Unis); à l'OMS; et au programme de mesure et d'évaluation [Measure Evaluation] qui concerne les données recueillies au cours du programme d'Enquêtes démographiques et de santé. Des messages envoyés aux bureaux de l'ONUSIDA dans 122 pays ont permis de clarifier certaines discordances: 88% de ces 122 pays ont fourni des éclaircissements sur la couverture par médicaments antirétroviraux et la prévention de la transmission mère-enfant; 50% ont répondu en ce qui concerne les autres indicateurs. Seules les données ainsi harmonisées ont été utilisées pour les analyses du présent rapport.

L'Indice composite des politiques nationales (NCPI), un questionnaire qui évalue les progrès en matière de politiques et stratégies nationales sur le

VIH, a été validé séparément. Deux spécialistes en évaluation ont vérifié les rapports NCPI en termes d'exhaustivité et en termes de cohérence interne; on a procédé ensuite à la correction des valeurs incohérentes ou illogiques et on a pris contact avec les pays en cas d'insuffisances significatives de données, ou encore de rapports NCPI multiples et non consolidés. Dans l'ensemble, l'ONUSIDA a pris contact avec 34 pays pour résoudre des problèmes de données concernant le NCPI et 31 pays ont répondu. Comme il y a plus de 200 entrées par pays, les données NCPI ne sont pas reprises en Annexe 2 – elles sont disponibles avec les rapports de pays individuels sur le site web de l'ONUSIDA. Les analyses contenues dans le présent rapport intègrent des données validées en provenance de 130 Etats Membres des Nations Unies.

Tabulation des données

Les tableaux qui suivent présentent les données fournies à l'ONUSIDA par les rapports d'activité des pays dans le cadre du suivi de la *Déclaration d'engagement*. L'ensemble des données disponibles pour les années précédentes a été repris chaque fois que ces données étaient cohérentes au cours des années, afin de permettre l'examen des changements au cours du temps. Dans la mesure du possible, on a distingué l'année de collecte et l'année de notification. Les chiffres et pourcentages ont été arrondis à l'unité la plus proche. Certains de ces rapports étaient encore en discussion avec le pays d'origine lors de la publication de cette Annexe – dans ce cas, le fait est explicitement mentionné dans une note au bas du tableau des données relatives aux indicateurs.

Là où les données manquent pour un pays et un indicateur donnés, ce pays a été exclu du tableau correspondant. Un pays peut ne pas avoir soumis de données pour un indicateur soit parce que les données ne permettaient pas de construire cet indicateur selon la définition de l'UNGASS, soit parce que le pays, considérant que l'indicateur n'était pas pertinent pour son type d'épidémie, n'a pas donné d'information sur cet indicateur.

Les valeurs affichées sur les tableaux sont celles que le pays reconnaît. Il peut arriver que ces valeurs diffèrent des valeurs soumises à l'origine, par suite du processus d'harmonisation, et donc des valeurs publiées dans les rapports d'activité des pays.

Là où les données en provenance d'un pays manquent pour un indicateur donné mais où il existe des données provenant d'autres sources, par exemple les enquêtes démographiques et de santé, ces dernières données ont été incluses dans le tableau bien qu'elles ne constituent pas nécessairement les données officielles du gouvernement national. Dans ce dernier cas, la source et l'année des données sont clairement indiquées dans le tableau des indicateurs ; l'indicateur en question est spécifiquement défini et référencé dans la section 'Notes' qui suit cette Annexe. Le personnel du Siège de l'ONUSIDA à Genève qui a dressé ces tableaux à partir de diverses sources ne peut être tenu responsable de l'exactitude des sources originales.

Indicateurs

Depuis la publication en 2003 du premier rapport de suivi de l'UNGASS : *Mise en œuvre de la Déclaration d'engagement de l'UNGASS : Actualisation*, des indicateurs fondamentaux ont été mis au point et consolidés à chaque étape, en collaboration avec les partenaires mondiaux et le Groupe de référence de l'ONUSIDA pour le suivi et l'évaluation (MERG), lequel fixe les normes internationales pour le suivi et l'évaluation. Le tableau ci-dessous résume les modifications apportées aux indicateurs UNGASS depuis le dernier cycle (Tableau 1). On trouvera des instructions sur la mise en place des indicateurs sur le site web de l'ONUSIDA dans le document : *Suivi de la Déclaration d'engagement sur le VIH/sida – Directives pour l'élaboration d'indicateurs de base UNGASS* (avril 2007).

Lors du cycle précédent des rapports UNGASS, les indicateurs avaient été groupés en deux catégories selon la nature de l'épidémie. Pour le présent cycle, on n'a pas établi de distinction entre un ensemble d'indicateurs pour épidémie généralisée et un ensemble pour épidémie concentrée/de prévalence faible. Cela tient au fait que les épidémies ne se conforment pas nécessairement à des dichotomies aussi simples. En 2006, par exemple, certains pays à

épidémie généralisée et à prévalence relativement élevée ont reconnu que les sous-épidémies au sein des populations les plus exposées au risque – professionnel(le)s du sexe, consommateurs de drogues injectables et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – jouaient un rôle important dans leur épidémie et que les programmes de prévention destinés à ces populations constituaient un élément essentiel de la riposte nationale. Avec raison, ces pays ont choisi de documenter les indicateurs visant ces populations en plus des informations sur l'ensemble des indicateurs généralisés.

Pour le cycle actuel tous les pays, quel que soit leur statut économique ou épidémiologique, ont été priés de répondre sur tous les indicateurs appropriés à leur cas. Chaque pays devait envisager chaque indicateur en fonction de la dynamique individuelle de son épidémie. Si un pays choisissait de ne pas répondre à un indicateur particulier, il lui était demandé d'expliquer la raison de cette décision, afin de permettre une analyse qui fasse la différence entre l'absence de données et la non-pertinence d'un ou plusieurs indicateurs particuliers à une situation propre au pays donné.

Tableau 1

Révision des indicateurs UNGASS depuis le cycle précédent de rapports

2005	2007	Commentaires
Engagement et action sur le plan national		
Montant des fonds nationaux déboursés par les gouvernements dans les pays à revenu faible ou intermédiaire	Dépenses consacrées au sida, par catégorie et source de financement	Définition modifiée
Indice composite des politiques nationales (NCPI)	Indice composite des politiques nationales (NCPI)	Questions ajoutées
Pourcentage d'unités de sang transfusées et soumises au dépistage du VIH	Pourcentage d'unités de sang provenant de dons et soumises à un dépistage du VIH selon les principes de l'assurance de la qualité	'Sang transfusé' remplacé par 'don de sang'. Une seconde partie ajoutée à l'indicateur sur la proportion de sang soumis à un dépistage selon les procédures d'opération standard et l'assurance de la qualité
Pourcentage de femmes et d'hommes atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé sous association d'antirétroviraux	Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé sous association d'antirétroviraux	Enfants inclus
Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH recevant un traitement complet de prophylaxie antirétrovirale en vue de réduire le risque de transmission mère-enfant du VIH	Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant	Définition modifiée
	Pourcentage des cas estimés de tuberculose liés à une séropositivité concomitante auxquels ont été administrés un traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH	Indicateur ajouté à la liste de base
	Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat	Indicateur ajouté à la liste de base
Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat	Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat	Sans changement
Pourcentage de groupes de population les plus à risque bénéficiant de programmes de prévention	Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes que les programmes de prévention du VIH parviennent à atteindre	Définition modifiée
Pourcentage d'orphelins et d'enfants vulnérables vivant dans des foyers bénéficiant d'une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge	Pourcentage d'orphelins et d'enfants vulnérables vivant dans des foyers bénéficiant d'une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge	Sans changement
Pourcentage d'écoles dont les enseignants ont été formés à dispenser un enseignement relatif au VIH basé sur des aptitudes utiles à la vie et qui l'ont dispensé au cours de la dernière année scolaire	Pourcentage d'écoles ayant inclus un enseignement relatif au VIH dans le cadre des programmes de préparation à la vie active au cours de la dernière année scolaire	Définition modifiée
Pourcentage de grandes entreprises/sociétés ayant mis en place des politiques et programmes de riposte au VIH sur le lieu de travail		Retiré de la liste des indicateurs de base, incorporé à l'Indice composite des politiques nationales
Pourcentage de femmes et d'hommes atteints d'infections sexuellement transmissibles se rendant dans un centre de santé et y recevant un diagnostic, un traitement et des conseils appropriés		Retiré de la liste des indicateurs de base, actuellement révisé en vue du cycle de rapports de 2010

Indicateurs de connaissances et de comportements		
Ratio de la fréquentation actuelle de l'école par les orphelins et celle constatée chez les non-orphelins âgés de 10 à 14 ans	Fréquentation actuelle de l'école par les orphelins et les non-orphelins âgés de 10 à 14 ans	Le calcul de ce ratio n'est plus requis
Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 ans qui tout à la fois possèdent des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus	Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 ans qui tout à la fois possèdent des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus	Il est suggéré de remplacer les deux questions concernant les idées fausses par des versions locales, lorsque la situation s'y prête
Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes qui tout à la fois possèdent des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus	Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes qui tout à la fois possèdent des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus	Il est suggéré de remplacer les deux questions concernant les idées fausses par des versions locales, lorsque la situation s'y prête
Pourcentage de jeunes femmes et hommes ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Extension de la fourchette d'âge
Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels hors mariage avec un(e) partenaire ne vivant pas sous le même toit au cours des 12 derniers mois	Pourcentage de femmes et hommes de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un(e) partenaire au cours des 12 derniers mois	Extension de la fourchette d'âge, définition modifiée
Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15 à 24 ans déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel hors mariage ou avec un(e) partenaire ne vivant pas sous le même toit au cours des 12 derniers mois	Pourcentage de femmes et hommes de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un(e) partenaire au cours des 12 derniers mois et déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel	Extension de la fourchette d'âge, définition modifiée
Pourcentage de professionnel(le)s du sexe déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client	Pourcentage de professionnel(le)s du sexe déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client	Sans changement
Pourcentage d'hommes déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport anal avec un partenaire masculin	Pourcentage d'hommes déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport anal avec un partenaire masculin	Sans changement
Pourcentage de consommateurs de drogues injectables ayant adopté des comportements propres à réduire la transmission du VIH, c'est-à-dire qui ont évité de partager leur matériel d'injection et qui ont utilisé des préservatifs au cours des 12 derniers mois (pour les pays où la consommation de drogues injectables est un mode de transmission du VIH établi de longue date)	Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel	Indicateur composite divisé en éléments constitutifs (partie 1)
	Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant avoir utilisé du matériel stérile la dernière fois qu'ils se sont injecté de la drogue	Indicateur composite divisé en éléments constitutifs (partie 2)
Indicateurs de l'impact du VIH		
Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 ans infectés par le VIH	Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 ans infectés par le VIH	Sans changement
Pourcentage de personnes séropositives au VIH parmi les populations les plus à risque	Pourcentage de personnes séropositives au VIH parmi les populations les plus à risque	Sans changement
Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'infection par le VIH qui sont encore en vie 12 mois après le début de la thérapie antirétrovirale	Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'infection par le VIH dont on sait qu'ils sont toujours sous traitement 12 mois après le début de la thérapie antirétrovirale	Définition modifiée
Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives qui sont infectés par le VIH	Pourcentage de nourrissons nés de mères séropositives qui sont infectés par le VIH	Toujours un indicateur de base mais calculé par l'ONUSIDA/Genève

Défis posés par le suivi des populations les plus à risque

Des défis éthiques et techniques importants entourent la mise en place d'échantillons représentatifs au niveau des pays et d'un système d'information sur la riposte mondiale en ce qui concerne la couverture par les programmes et les comportements à risque pour les populations à risque accru. Les méthodes destinées à obtenir un échantillonnage représentatif chez ces populations difficiles à atteindre (échantillonnage dépendant des personnes interrogées) sont en cours de mise au point – en attendant, il faut accepter que les pays ne pourront pas nécessairement attester que les échantillons utilisés pour les populations les plus à risque sont représentatifs. Les données fournies par de telles enquêtes de surveillance comportementale proviennent souvent d'échantillons de commodité urbains au sein de la zone de couverture des programmes et tendent à introduire un biais dans la mesure des comportements à risque et de la couverture par les services. Il est donc recommandé aux pays d'inclure des données pour ces indicateurs en ayant recours à la plus récente parmi les enquêtes auprès des populations les plus à risque, examinée et approuvée par les experts techniques du pays, comme par exemple les groupes de travail techniques sur le suivi et l'évaluation ou les conseils nationaux pour la recherche.

L'analyse mondiale des données a mis en évidence des différences de méthode d'un pays à l'autre quant à la collecte de données sur les populations les plus exposées au risque. Ces différences concernent principalement la définition des groupes, les outils de mesure et la durée de collecte de données. Les notes en bas de page fournies dans les tableaux présentent systématiquement les différences identifiées.

Au niveau des pays, ces indicateurs doivent être interprétés à la lumière de l'Indice composite des politiques nationales (NCPI) fourni par le pays ; cet indice apporte une vue d'ensemble de l'environnement politique et des programmes de riposte à l'égard des populations les plus exposées au risque dans un pays donné, tant pour le gouvernement que pour les groupes non gouvernementaux et la société civile.

L'Indice composite des politiques nationales (NCPI)

Pour remplir le questionnaire NCPI, on utilise une analyse des documents pertinents et des entretiens avec des spécialistes des sujets étudiés. Les responsables gouvernementaux remplissent une partie¹ du NCPI, une autre étant confiée² à des représentants de la société civile et d'organisations bilatérales ou multilatérales. Le processus recommandé vise à encourager un environnement menant à l'inclusion de perspectives tant gouvernementales que non gouvernementales dans la réponse intégrée sur le NCPI, qui sera incluse par le gouvernement dans son rapport UNGASS. Tel n'est pas toujours le cas, cependant. Le rapport régional de l'UNGASS pour la Région des Caraïbes en 2006 note qu'il n'est pas toujours clairement indiqué quelle est la réponse qui domine quand les opinions diffèrent (*Keeping score : AIDS responses in the Caribbean : a consolidated analysis based on Caribbean reports submitted to the UNGASS 2006*, page 25). Afin d'assurer la pleine indépendance des réponses du gouvernement et des réponses non gouvernementales, le Gouvernement du Rwanda, par exemple, n'a délibérément pas pris part à la réunion de consensus qui a réuni et consolidé les réponses de la société civile sur le NCPI (Rapport UNGASS du Rwanda, 2008). Dans l'ensemble, les réponses des gouvernements sur le NCPI sont souvent plus optimistes que celles des responsables non gouvernementaux. Là où elles sont disponibles, les deux valeurs ont été enregistrées pour le NCPI tout au long du rapport.

¹ Les responsables gouvernementaux traitent des questions relatives au plan stratégique national, à l'appui politique et aux stratégies et orientations politiques clés des programmes VIH.

² Les représentants non gouvernementaux traitent des questions relatives au contexte national en ce qui concerne les droits de l'homme et le VIH ; à l'implication de la société civile dans la riposte au VIH ; aux orientations politiques et stratégiques principales des programmes VIH.

Notes pour les indicateurs spécifiques

1. Fonds alloués à la lutte contre le sida

Au fur et à mesure que la riposte nationale et internationale au sida continue de croître, il devient de plus en plus important de suivre en détails : i) la façon dont les fonds sont dépensés au niveau des pays et ii) l'origine des fonds. Ces données servent à mesurer l'engagement et l'action au niveau national – parties importantes de la *Déclaration d'engagement sur le VIH/sida* de l'UNGASS. Elles aident en outre les décideurs au niveau national à suivre l'ampleur et l'efficacité de leurs programmes. Une fois réunies pour de nombreux pays, les données aident aussi la communauté internationale à évaluer la riposte mondiale. Cette information stratégique soutient le rôle coordonnateur de l'Autorité nationale pour le sida dans chaque pays et apporte une justification pour l'allocation des ressources et pour les améliorations aux processus de planification stratégique.

Les pays peuvent choisir parmi des méthodes et des outils différents pour suivre les flux de financement pour le sida – par exemple l'estimation nationale des dépenses relatives au sida (NASA), les sections sida des comptes nationaux de la santé (NHA) et les enquêtes ad hoc pour le flux des ressources ; la matrice nationale de financement comporte un tableur qui permet d'entrer, d'analyser et de signaler aisément les données de chacune de ces trois sources. On a établi un 'pont' entre NASA et NHA pour les dépenses sanitaires liées au sida et il n'y a donc plus de différence entre ces outils, destinés à suivre ces dépenses ; NASA fournit simplement plus de détails sur les dépenses engagées hors du système de santé, comme par exemple l'atténuation sociale, l'éducation, la justice et autres domaines. On a mis en place un processus d'alignement semblable pour le Projet interdisciplinaire sur les flux de ressources de l'Institut démographique néerlandais/UNFPA/ONUSIDA.

Le but de cet indicateur est d'assembler des données exactes et cohérentes sur la façon dont les fonds sont dépensés au niveau national et sur l'origine de ces fonds.

Définition : Dépenses intérieures et internationales relatives au sida, par catégorie et source de financement

On mesure cet indicateur grâce à une estimation nationale des dépenses relatives au sida (NASA), qui documente les dépenses effectives selon huit catégories de dépenses liées au sida et par source de financement – notamment les dépenses publiques de source propre (sources gouvernementales telles que les impôts) et les sources internationales :

1. Prévention ;
2. Prise en charge et traitement ;
3. Orphelins et enfants vulnérables³ ;
4. Gestion du programme et renforcement de l'administration ;
5. Encouragement pour les ressources humaines ;
6. Protection sociale et services sociaux (sauf orphelins et enfants vulnérables) ;
7. Environnement habilitant et développement communautaire ;
8. Recherche (sauf recherche opérationnelle incluse dans la gestion des programmes).

Trois groupes principaux de financement :

1. Fonds publics nationaux ;
2. Fonds internationaux ;
3. Fonds privés nationaux (signalement facultatif pour l'UNGASS).

³ Dans le contexte des estimations de ressources et de l'estimation nationale des dépenses relatives au sida, les enfants vulnérables sont définis comme les enfants dont au moins un parent est vivant mais gravement malade (le plus souvent à cause du VIH) et incapable d'en prendre soin.

2. Politiques gouvernementales concernant la lutte contre le VIH et le sida

Indice composite des politiques nationales

Le but de l'Indice composite des politiques nationales est d'évaluer l'avancement vers l'élaboration et la mise en œuvre des orientations politiques et stratégiques nationales relatives au VIH et au sida.

Cet indice composite couvre les orientations suivantes en matière de mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes :

Partie A : à compléter par les responsables du gouvernement

1. Plan stratégique
2. Soutien politique
3. Prévention
4. Traitement, prise en charge et soutien
5. Evaluation et suivi

Partie B : à compléter par les responsables de la société civile

1. Droits de l'homme
2. Implication de la société civile
3. Prévention
4. Prise en charge et soutien.

3. Sécurité transfusionnelle

Cet indicateur sert à estimer les progrès vers un approvisionnement en sang sûr. Il s'applique à tous les pays et on le mesure chaque année selon le protocole de la base de données OMS sur la sécurité transfusionnelle.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage d'unités de sang provenant de dons et soumises à un dépistage du VIH selon les principes de l'assurance de la qualité.

Numérateur : Nombre d'unités de sang provenant de dons et soumises à un dépistage du VIH dans des centres de transfusion/laboratoires de dépistage sanguin ayant : 1) suivi des procédures d'opération standard et 2) participé à un système d'assurance externe de la qualité.

Dénominateur : Nombre total d'unités de sang provenant de dons.

4. Traitement du VIH : thérapie antirétrovirale

Cet indicateur sert à mesurer le progrès des pays à fournir un traitement par une association d'antirétroviraux aux adultes et aux enfants présentant une infection à VIH avancée. L'indicateur s'applique à tous les pays ; les données sont récoltées en continu (chaque mois ou chaque trimestre) avec une estimation du dénominateur.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé sous association d'antirétroviraux.

Numérateur : Nombre d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et recevant actuellement une association d'antirétroviraux conformément au protocole de traitement approuvé sur le plan national (ou aux normes de l'OMS/ONUSIDA) à la fin de la période de transmission des rapports.

Dénominateur : Nombre estimatif d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé.

Notes sur la méthode : Toutes les analyses de cet indicateur mises à jour pour le rapport mondial, y compris les chiffres cités par les pays, reflètent des numérateurs qui ont fait l'objet d'une harmonisation par trois organismes (ONUSIDA/OMS/UNICEF) et des dénominateurs estimés directement par la méthode du Groupe de référence ONUSIDA/OMS sur les estimations, modèles et projections (Spectrum).

Le processus d'harmonisation a fait en sorte que tous les organismes notifient le même chiffre – accepté par le pays – qui était le plus récent et rencontrait la définition de 'personne atteinte d'une infection à VIH avancée en cours de traitement'. En cas de désaccord parmi les trois organismes, un effort particulier a été entrepris pour obtenir l'approbation du pays quant à une valeur finale pour l'indicateur. Là où cette approbation n'a pu être obtenue, la

valeur retenue par le pays a été indiquée en note de bas de tableau dans l'Annexe 2.

Pour les données de 2007, certains pays n'avaient pas encore répondu en décembre 2007. On a eu recours à des projections pour décembre afin d'obtenir un laps de temps cohérent.⁴

Les dénominateurs estimés par la méthode du Groupe de référence ONUSIDA/OMS sur les estimations, modèles et projections ont servi pour toutes les analyses et pour les chiffres cités dans le texte afin d'assurer un minimum de cohérence. Les dénominateurs fournis par les pays sont repris en Annexe 2.

5. Prévention de la transmission mère-enfant

En l'absence de toute intervention préventive, les nourrissons nés de mères infectées par le VIH ou allaités par celles-ci courent un risque d'environ un sur trois d'être eux-mêmes infectés. L'infection peut survenir au cours de la grossesse, pendant le travail, au moment de l'accouchement ou encore au cours de l'allaitement. Il est possible de réduire significativement le risque d'infection en utilisant les approches complémentaires d'une prophylaxie antirétrovirale pour la mère pendant la grossesse – avec ou sans prophylaxie pour le nourrisson – du recours à des pratiques d'accouchement sans risque et d'alternatives sûres à l'allaitement au sein. On peut aussi limiter le risque de transmission verticale en pratiquant une prophylaxie antirétrovirale suivie d'un allaitement au sein exclusif limité à six mois.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la suppression de la transmission verticale du VIH.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage de femmes enceintes infectées par le VIH à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant.

Numérateur : Nombre de femmes enceintes infectées par le VIH à qui l'on a administré des antirétroviraux au cours des 12 derniers mois dans le but de réduire la transmission mère-enfant.

Dénominateur : Nombre estimé de femmes enceintes infectées par le VIH au cours des 12 derniers mois.

Toutes les analyses de cet indicateur mises à jour pour le rapport mondial, y compris les chiffres cités par les pays, reflètent des numérateurs qui ont fait l'objet d'une harmonisation par trois organismes (ONUSIDA/OMS/UNICEF) et des dénominateurs estimés directement par la méthode du Groupe de référence ONUSIDA/OMS sur les estimations, modèles et projections (Spectrum).

Le processus d'harmonisation a fait en sorte que tous les organismes notifient le même chiffre – accepté par le pays – qui était le plus récent et rencontrait la définition de 'femme enceinte infectée par le VIH à qui l'on a administré des antirétroviraux au cours des 12 mois écoulés', couvrant ainsi une année pleine. En cas de désaccord parmi les trois organismes, un effort particulier a été entrepris pour obtenir l'approbation du pays quant à une valeur finale pour l'indicateur. Là où cette approbation n'a pu être obtenue, la valeur retenue par le pays a été indiquée en note de bas de tableau dans l'Annexe 2.

Pour les données de 2007, certains pays n'avaient pas encore répondu en décembre 2007. On a eu recours à des projections pour décembre afin d'obtenir un laps de temps cohérent.⁵

Les dénominateurs estimés par la méthode du Groupe de référence ONUSIDA/OMS sur les estimations, modèles et projections ont servi pour toutes les analyses et pour les chiffres cités dans le texte afin d'assurer un minimum de cohérence. Les dénominateurs fournis par les pays sont repris en Annexe 2.

6. Prise en charge conjointe de la tuberculose et de l'infection à VIH

La tuberculose est une des causes les plus courantes de morbidité et de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH, même chez celles qui sont sous traitement antirétroviral. La recherche intensifiée des cas de tuberculose et l'accès à un diagnostic et à un traitement de qualité conformes aux directives internationales et nationales sont indispensables pour améliorer la durée et la qualité de vie chez les personnes vivant avec le VIH, d'où l'importance de pouvoir mesurer le pourcentage de cas de tuberculose séropositifs ayant accès à un traitement adéquat pour leur tuberculose et leur infection à VIH.

⁴ Méthode de projection – toutes les valeurs signalées correspondant à une période antérieure à décembre 2007 sont projetées à partir des deux dernières données en calculant la croissance mensuelle pour calculer la projection à décembre 2007.

⁵ Méthode de projection – toutes les valeurs signalées qui correspondent à une période de moins de 12 mois sont projetées en prenant le nombre de femmes enceintes séropositives sous antirétroviraux chaque mois, en divisant ce chiffre par le nombre de mois correspondant aux données puis en multipliant le résultat par 12.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la détection et le traitement de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage des cas estimés de tuberculose liés à une séropositivité concomitante auxquels ont été administrés un traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH.

Numérateur : Nombre d'adultes présentant une infection à VIH parvenue à un stade avancé recevant actuellement une association d'antirétroviraux conformément au protocole approuvé sur le plan national (ou aux normes OMS/ONUSIDA) et qui ont entrepris un traitement antituberculeux (conformément aux directives du programme national contre la tuberculose) au cours de l'année où le rapport est soumis.

Dénominateur : Estimation du nombre de nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH.

7. Dépistage du VIH au sein de la population générale

Afin de nous protéger nous-mêmes et ne pas infecter les autres, il est important que tous et toutes connaissent leur statut VIH. C'est aussi un facteur critique quand il s'agit de décider si l'on doit commencer un traitement.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la mise en œuvre du test VIH et du conseil.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat.

Numérateur : Nombre de répondants de 15 à 49 ans ayant subi un test VIH et qui en connaissent le résultat.

Dénominateur : Nombre total des répondants de 15 à 49 ans.

Plusieurs pays ont choisi de répondre sur cet indicateur en ayant recours à des données obtenues grâce à des programmes de test VIH. Ces données, qui ne peuvent être comparées aux données obtenues au moyen d'enquêtes démographiques, sont reprises dans des notes en bas de tableau.

8. Dépistage du VIH au sein des populations les plus à risque

Afin d'être protégées et d'éviter qu'elles en infectent d'autres, il est important que les populations les plus à risque connaissent leur statut VIH. C'est aussi un facteur critique quand il s'agit de décider si l'on doit commencer un traitement. Cet indicateur devra être calculé séparément pour chacune des populations considérées comme les plus à risque dans un pays donné : professionnel(le)s du sexe, consommateurs de drogues injectables et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la mise en œuvre du test VIH et du conseil au sein des populations les plus à risque.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat.

Numérateur : Nombre de personnes faisant partie des groupes les plus à risque ayant fait l'objet d'un dépistage du VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat.

Dénominateur : Nombre de personnes faisant partie des groupes les plus à risque incluses dans l'échantillon.

9. Programmes de prévention destinés aux populations les plus à risque

Les populations les plus à risque sont souvent difficiles à atteindre par des programmes de prévention du VIH, alors qu'il est important qu'elles bénéficient de ces services afin de prévenir la propagation du VIH en leur sein et dans la population générale. Cet indicateur devra être calculé séparément pour chacune des populations considérées comme les plus à risque dans un pays donné : professionnel(le)s du sexe, consommateurs de drogues injectables et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la mise en œuvre des programmes de prévention du VIH pour les populations les plus à risque.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes que les programmes de prévention du VIH parviennent à atteindre.

Numérateur: Nombre de membres interrogés parmi les populations les plus à risque ayant répondu « oui » aux questions 1 et 2 ci-après (les trois pour les consommateurs de drogues injectables):

1. Savez-vous où aller pour un test VIH?
2. Vous a-t-on fourni des préservatifs au cours des 12 mois écoulés?
2. (Consommateurs de drogues injectables) Au cours des 12 mois écoulés, vous a-t-on fourni des aiguilles et seringues stériles?

Dénominateur: Nombre total de personnes interrogées incluses dans l'enquête.

10. Soutien destiné aux enfants affectés par le VIH et le sida

Le nombre d'orphelins ou d'enfants vulnérables continue d'augmenter et il convient d'assurer un soutien adéquat aux familles et aux communautés concernées. En pratique, ces communautés assurent une prise en charge et un soutien aux enfants rendus orphelins ; pour soutenir cet effort, il conviendra de fournir un appui extérieur supplémentaire aux foyers concernés.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la fourniture d'un appui externe aux foyers qui prennent en charge des orphelins ou des enfants vulnérables âgés de 0 à 17 ans.

Définition et composantes de l'indicateur:

Définition: Pourcentage d'orphelins et d'enfants vulnérables (0 à 17 ans) vivant dans des foyers bénéficiant d'une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge.

Numérateur: Nombre d'orphelins et d'enfants vulnérables vivant dans des foyers ayant bénéficié d'au moins un des quatre types de soutien pour chaque enfant (médical, scolarisation, psychique, social).

Dénominateur: Nombre total d'orphelins et d'enfants vulnérables âgés de 0 à 17 ans.

Aux fins de cet indicateur et en accord avec les définitions de l'UNICEF (voir ci-dessous), on considérera comme orphelin tout enfant de moins de 18 ans qui a perdu un parent ou ses deux parents.

Un enfant vulnérable en raison du VIH a moins de 18 ans et:

- i) a perdu un de ses parents ou les deux; ou
- ii) un de ses parents est atteint de maladie chronique (indépendamment du fait que celui-ci vive ou non sous le même toit que l'enfant); ou
- iii) vit dans un foyer où, au cours des 12 derniers mois, un adulte au moins est décédé après avoir été malade pendant trois des quatre mois qui ont précédé son décès; ou
- iv) vit dans un foyer où un des adultes au moins a été gravement malade pendant au moins trois des 12 mois écoulés.

Plusieurs pays ont choisi de répondre sur cet indicateur en ayant recours à des données obtenues grâce à des programmes de test VIH. Ces données, qui ne peuvent être comparées aux données obtenues par des enquêtes démographiques, sont reprises dans des notes en bas de tableau.

11. Enseignement relatif au VIH dans le cadre des programmes scolaires de préparation à la vie active

L'éducation basée sur les compétences vitales est une méthode efficace qui a recours à des exercices de participation afin d'apprendre aux jeunes des comportements qui les aident à faire face aux défis et aux exigences de la vie quotidienne. Il peut s'agir de compétences en résolution de problèmes et en prise de décisions, en réflexion créatrice et critique, en conscience de soi, en communication et en relations interpersonnelles. Cette méthode peut aussi apprendre aux jeunes comment faire face à leurs émotions et aux causes de stress. Adaptée spécifiquement à l'éducation VIH en milieu scolaire, cette approche aide les jeunes à comprendre et à évaluer les facteurs individuels, sociaux et environnementaux qui modifient le risque de transmission du VIH. Appliquée de façon correcte, elle peut avoir un effet positif sur les comportements, tels que le recul de l'âge des premiers rapports sexuels et la réduction du nombre de partenaires sexuels.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la mise en place d'une éducation fondée sur les compétences vitales dans toutes les écoles.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage d'écoles ayant dispensé un enseignement relatif au VIH dans le cadre des programmes de préparation à la vie active au cours de la dernière année scolaire.

Numérateur : Nombre d'écoles ayant dispensé un enseignement relatif au VIH dans le cadre de l'apprentissage des programmes de préparation à la vie active au cours de la dernière année scolaire.

Dénominateur : Nombre d'écoles ayant fait l'objet d'une enquête.

12. Scolarisation des orphelins

Le sida tue un nombre toujours croissant d'adultes à l'âge où ils fondent une famille et élèvent leurs enfants. Par voie de conséquence, la proportion d'orphelins croît régulièrement dans de nombreux pays, alors même que la diminution du nombre de jeunes adultes dans la famille rend de plus en plus incertain l'avenir des orphelins. Le statut d'orphelin s'accompagne souvent de pauvreté accrue et de préjugés, qui en eux-mêmes peuvent mettre en danger la scolarisation de ces enfants et peuvent aussi les amener à adopter des stratégies de survie qui les rendent plus vulnérables au VIH. Il est donc important de suivre à quel point les programmes de soutien arrivent à assurer des chances de scolarisation aux enfants rendus orphelins.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la prévention du désavantage relatif des orphelins vis-à-vis des non-orphelins en ce qui concerne la scolarisation.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Fréquentation actuelle de l'école par les orphelins et les non-orphelins âgés de 10 à 14 ans.

A : Taux actuel de fréquentation scolaire des orphelins de 10 à 14 ans.

Numérateur : Nombre d'enfants qui ont perdu leurs deux parents et qui fréquentent l'école.

Dénominateur : Nombre d'enfants qui ont perdu leurs deux parents.

B : Taux actuel de fréquentation scolaire des enfants de 10 à 14 ans dont les deux parents sont en vie et qui vivent avec au moins l'un d'entre eux

Numérateur : Nombre d'enfants dont les deux parents sont en vie, qui vivent avec au moins l'un d'entre eux et qui fréquentent l'école.

Dénominateur : Nombre d'enfants dont les deux parents sont en vie et qui vivent avec au moins l'un d'entre eux

13. Connaissances des jeunes en matière de prévention du VIH

C'est surtout par voie sexuelle que les épidémies de VIH se perpétuent au sein de générations successives de jeunes. Une bonne information sur le VIH et le sida constitue une condition préalable essentielle pour adopter des comportements qui diminuent le risque de transmission du VIH – même si souvent elle ne suffit pas.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers une connaissance universelle des faits essentiels concernant la transmission du VIH.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage de jeunes de 15 à 24 ans qui tout à la fois possèdent des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus

Numérateur : Nombre de jeunes de 15 à 24 ans interrogés qui répondent correctement à la totalité des cinq questions ci-après :

1. *Le risque de transmission du VIH peut-il être réduit par le fait d'avoir des rapports sexuels avec un(e) seul(e) partenaire non infecté(e) et qui n'a pas d'autres partenaires ?*
2. *Le risque de transmission du VIH peut-il être réduit par l'utilisation de préservatifs lors de chaque rapport ?*
3. *Une personne paraissant en bonne santé peut-elle être séropositive ?*
4. *Une piqûre de moustique peut-elle transmettre le VIH ?*
5. *Peut-on contracter le VIH en partageant un repas avec une personne séropositive ?*

Dénominateur : Nombre de répondants (âgés de 15 à 24 ans).

14. Connaissances des populations les plus à risque en matière de prévention du VIH

C'est principalement la transmission sexuelle ou l'utilisation de matériel d'injection contaminé qui perpétuent les épidémies concentrées. Une bonne information sur le VIH et le sida constitue une condition préalable essentielle pour adopter des comportements qui diminuent leur risque d'infection. Cet indicateur devra être calculé séparément pour chacune des populations considérées comme les plus à risque dans un pays donné : professionnel(le)s du sexe, consommateurs de drogues injectables et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers une connaissance des faits essentiels parmi les populations les plus à risque en ce qui concerne la transmission du VIH.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes qui tout à la fois possèdent des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus.

Numérateur : Nombre de personnes interrogées parmi les populations les plus à risque qui ont répondu correctement aux cinq questions ci-après :

1. *Le risque de transmission du VIH peut-il être réduit par le fait d'avoir des rapports sexuels avec un(e) seul(e) partenaire non infecté(e) et qui n'a pas d'autres partenaires ?*
2. *Le risque de transmission du VIH peut-il être réduit par l'utilisation de préservatifs lors de chaque rapport ?*
3. *Une personne paraissant en bonne santé peut-elle être séropositive ?*
4. *Une piqûre de moustique peut-elle transmettre le VIH ?*
5. *Peut-on contracter le VIH en partageant un repas avec une personne séropositive ?*

Dénominateur : Nombre de personnes interrogées parmi les populations les plus à risque qui ont répondu aux cinq questions (y compris « je ne sais pas »).

15. Rapports sexuels avant l'âge de 15 ans

Dans de nombreux pays, on s'efforce de retarder l'âge des premiers rapports sexuels parmi les jeunes et de décourager les rapports sexuels avant le mariage, dans le but de réduire le risque d'exposition au VIH. Il semble aussi que le fait de retarder l'âge des premiers rapports diminue aussi le risque d'infection lors de chaque rapport, au moins chez les femmes.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers l'accroissement de l'âge des premiers rapports chez les jeunes femmes et les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans.

Numérateur : Nombre de personnes interrogées (âgées de 15 à 24 ans) qui indiquent avoir eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans.

Dénominateur : Nombre de personnes interrogées âgées de 15 à 24 ans.

16. Rapports sexuels à plus haut risque

Les rapports sexuels non protégés parmi les personnes à partenaires nombreux affectent considérablement la propagation du VIH. Les personnes qui ont des partenaires multiples (consécutivement ou simultanément) encourent un risque plus élevé de transmission du VIH que celles qui ne sont pas liées à un réseau sexuel élargi.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la réduction du nombre de personnes ayant des pratiques sexuelles à risque accru.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage de femmes et d'hommes de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un(e) partenaire au cours des 12 mois écoulés

Numérateur : Nombre de personnes interrogées âgées de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un(e) partenaire au cours des 12 mois écoulés

Dénominateur : Nombre de personnes interrogées âgées de 15 à 49 ans.

17. Utilisation du préservatif lors de rapports sexuels à plus haut risque

Le recours au préservatif est une protection importante contre l'infection à VIH, particulièrement chez les personnes qui ont des partenaires multiples.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la prévention de l'exposition au VIH lors de rapports sexuels non protégés avec des partenaires occasionnels.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage de femmes et d'hommes de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un(e) partenaire au cours des 12 derniers mois déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel.

Numérateur : Nombre de personnes de 15 à 49 ans ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels avec plus d'un(e) partenaire au cours des 12 derniers mois et avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel.

Dénominateur : Nombre de personnes de 15 à 49 ans ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels avec plus d'un(e) partenaire au cours des 12 derniers mois.

18. Utilisation du préservatif par les professionnel(le)s du sexe

Plusieurs facteurs accroissent le risque d'exposition au VIH parmi les professionnel(le)s du sexe, notamment la multiplicité des partenaires occasionnels et la fréquence accrue des rapports sexuels. Les professionnel(le)s du sexe peuvent néanmoins considérablement réduire le risque de transmission du VIH, tant à partir de leur clientèle que vers celle-ci, en utilisant systématiquement et correctement le préservatif.

Note : Les pays à épidémie généralisée peuvent aussi avoir une sous-épidémie concentrée parmi les professionnel(le)s du sexe. Dans ce cas, ils auront avantage à calculer cet indicateur pour cette population et à fournir le résultat.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la prévention de l'exposition au VIH parmi les professionnel(le)s du sexe lors de rapports non protégés avec leur clientèle.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage de professionnel(le)s du sexe déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client.

Numérateur : Nombre de personnes interrogées qui ont indiqué avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client au cours des 12 derniers mois.

Dénominateur : Nombre de personnes interrogées qui ont indiqué avoir eu des rapports sexuels rémunérés au cours des 12 derniers mois.

19. Utilisation du préservatif par les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

Le préservatif peut diminuer significativement le risque de transmission du VIH par voie sexuelle. En conséquence, il est important que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes aient recours systématiquement et correctement au préservatif à cause du risque élevé de transmission du VIH, notamment au cours des rapports anaux non protégés. En outre, les hommes qui pratiquent ce genre de rapports peuvent également avoir des partenaires féminines, qui seront à leur tour infectées. Le recours par ces hommes au préservatif lors de leur plus récent rapport avec un partenaire masculin est considéré comme un indicateur fiable du comportement à plus long terme.

Note : Les pays à épidémie généralisée peuvent aussi avoir une sous-épidémie concentrée parmi les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Dans ce cas, ils auront avantage à calculer cet indicateur pour cette population et à fournir le résultat.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la prévention de l'exposition au VIH parmi les hommes qui ont des rapports sexuels anaux avec un partenaire masculin.

Définition et composantes de l'indicateur :

Définition : Pourcentage d'hommes déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel anal avec un partenaire masculin

Numérateur : Nombre de personnes interrogées indiquant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel anal

Dénominateur : Nombre de personnes interrogées indiquant avoir eu des rapports sexuels anaux avec un partenaire masculin au cours des six derniers mois.

20. Utilisation du préservatif par les consommateurs de drogues injectables

Même dans les pays où prédominent d'autres modes de transmission du VIH, les pratiques sexuelles et d'injection à moindre risque sont essentielles au sein des consommateurs de drogues injectables. En effet: (i) le risque de transmission du VIH à partir de matériel d'injection contaminé est très élevé et (ii) les consommateurs de drogues injectables peuvent propager le VIH (par exemple par voie sexuelle) à la population générale.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la prévention de la transmission sexuelle du VIH.

Définition et composantes de l'indicateur.

Définition: Pourcentage de consommateurs de drogues injectables signalant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel.

Numérateur: Nombre de consommateurs de drogues injectables interrogés signalant avoir utilisé un préservatif lors de leur plus récent rapport sexuel.

Dénominateur: Nombre de consommateurs de drogues injectables interrogés signalant avoir eu un rapport sexuel au cours du mois écoulé.

21. Pratiques d'injection sans risque parmi les consommateurs de drogues injectables

Même dans les pays où prédominent d'autres modes de transmission du VIH, les pratiques sexuelles et d'injection à moindre risque sont essentielles au sein des consommateurs de drogues injectables. En effet: i) le risque de transmission du VIH à partir de matériel d'injection contaminé est très élevé et ii) les consommateurs de drogues injectables peuvent propager le VIH (par exemple par voie sexuelle) à la population générale.

Note: Les pays à épidémie généralisée peuvent aussi avoir une sous-épidémie concentrée parmi les consommateurs de drogues injectables. Dans ce cas, ils auront avantage à calculer cet indicateur pour cette population et à fournir le résultat.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la prévention de la transmission du VIH associée à l'injection de drogues.

Définition et composantes de l'indicateur:

Définition: Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant avoir utilisé du matériel d'injection stérile la dernière fois qu'ils se sont injecté de la drogue.

Numérateur: Nombre de consommateurs de drogues interrogés déclarant avoir utilisé du matériel d'injection stérile la dernière fois qu'ils se sont injecté de la drogue.

Dénominateur: Nombre de consommateurs de drogues interrogés déclarant s'être injecté de la drogue au cours du mois écoulé.

24. Traitement de l'infection à VIH: personnes en vie après 12 mois de thérapie antirétrovirale

Un des buts de tout programme de traitement antirétroviral est de prolonger la survie parmi les personnes infectées. Au fur et à mesure que le traitement s'intensifie de par le monde, il est important aussi de comprendre combien de gens abandonnent les programmes de traitement et pourquoi. Ces données pourront servir à prouver l'efficacité de ces programmes et à souligner les obstacles à leur expansion et à leur amélioration.

Cet indicateur vise à mesurer les progrès vers la prolongation de la survie parmi les adultes et les enfants infectés, en les maintenant sous traitement antirétroviral.

Définition et composantes de l'indicateur:

Définition: Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'infection à VIH dont on sait qu'ils sont toujours sous traitement 12 mois après le début de la thérapie antirétrovirale.

Numérateur: Nombre d'adultes et d'enfants toujours sous traitement antirétroviral 12 mois après le début du traitement.

Dénominateur: Nombre total d'adultes et d'enfants qui ont commencé un traitement antirétroviral au cours des 12 mois précédant la transmission des données, y compris ceux qui sont décédés, ceux qui ont abandonné le traitement antirétroviral et ceux qui ont été perdus de vue.

Les révisions effectuées pour cet indicateur ont tenu compte des survies *a minima*. L'indicateur peut donc fournir un taux de survie moindre que pour la définition de la survie maximale qui exclut les personnes qui ont arrêté le traitement antirétroviral, sont mortes ou ont été perdues de vue. Là où l'on

sait qu'une donnée ne correspond pas à la définition ci-dessus, l'information est reprise en bas de page dans les tableaux annexes.

Toutes les analyses de cet indicateur effectuées pour le *Rapport mondial*, notamment les chiffres cités par les pays, correspondent à des numérateurs qui ont subi un processus d'harmonisation entre deux organismes (ONUSIDA/OMS).

Le processus d'harmonisation a fait en sorte que tous les organismes ont notifié le même chiffre – accepté par le pays – qui était le plus récent et correspondait à la définition de survie *a minima* à 12 mois pour une cohorte. En cas de désaccord parmi les deux organismes, un effort particulier a été entrepris pour obtenir l'approbation du pays quant à une valeur finale pour l'indicateur. Là où cette approbation n'a pu être obtenue, la valeur retenue par le pays a été indiquée en note de bas de tableau dans l'Annexe 2.

Pays ayant soumis des rapports sur la mise en œuvre de la Déclaration d'engagement (n=147)

Revenu élevé

Allemagne
Antigua-et Barbuda
Australie
Bahamas
Barbade
Belgique
Canada
Chypre
Espagne
Estonie
Finlande
Grèce
Irlande
Israël
Japon
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Qatar
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Slovénie
Suède
Suisse
Trinité-et-Tobago

Caraïbes

Cuba
Dominique
Grenade
Haïti
Jamaïque
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines

Asie de l'Est

Chine
Mongolie

Europe orientale et Asie centrale

Arménie
Azerbaïdjan
Biélarus
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Fédération de Russie
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Moldova
Ouzbékistan
Roumanie
Tadjikistan
Ukraine

Amérique latine

Argentine
Belize
Bolivie
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
El Salvador
Equateur
Guatemala
Guyana
Honduras
Mexique

Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Suriname
Uruguay

Afrique du Nord et Moyen-Orient

Algérie
Jordanie
Liban
Maroc
Soudan
Tunisie
Turquie

Océanie

Etats fédérés de Micronésie
Fidji
Îles Marshall
Palaos
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Tuvalu

Asie du Sud et du Sud-Est

Afghanistan
Bangladesh
Cambodge
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d')
Malaisie
Népal
Pakistan
Philippines
République démocratique populaire lao
Sri Lanka
Thaïlande
Viet Nam

Afrique subsaharienne

Angola
Afrique du Sud
Bénin
Botswana
Burkina Faso

Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte d'Ivoire
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Swaziland
Tchad
Togo
Zambie
Zimbabwe

Europe centrale et occidentale

Albanie
Ex-République yougoslave de Macédoine
Hongrie
Monténégro
Pologne
Serbie

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Région/Pays (ou territoire)	Année de dépenses	Total des dépenses nationales et internationales en millions de US\$	Pourcentage par source de financement					Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)		
			Nationales publiques (%)	Internationales			Total pour la prévention	Communica- tion pour le changement social et comporte- mental	Conseil et dépistage volontaires	
				Bilatérales (%)	Multilatérales					Toutes les autres sources inter- nationales ou non spécifiées (%)
					Fonds mondial (%)	Nations Unies et toutes les autres multi- latérales (%)				
Caraïbes										
Antigua-et-Barbuda	2006	\$0.157	65.9%	25.4%	8.7%	0.0%	0.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Antigua-et-Barbuda ¹	2007	\$0.160	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Aruba ¹	2005	\$0.010	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Aruba ¹	2006	\$0.010	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Aruba ¹	2007	\$0.010	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Bahamas ¹	2006	\$2.145	71.6%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	28.4%	\$0.005	N/A / N/R	N/A / N/R
Barbade ¹	2006	\$7.073	98.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	2.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Cuba	2007	\$41.927	80.9%	0.0%	19.1%	0.0%	0.0%	\$6.385	\$5.584	\$0.801
République dominicaine ¹	2007	\$13.737	44.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	56.0%	\$4.121	N/A / N/R	N/A / N/R
Grenade ¹	2006	\$1.050	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Haïti	2006	\$70.284	0.6%	67.3%	24.0%	6.50%	1.55%	\$12.597	\$1.882	\$3.427
Jamaïque	2005	\$11.306	54.5%	5.8%	39.7%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Jamaïque	2006	\$10.362	65.9%	5.2%	28.9%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Jamaïque	2007	\$14.749	62.5%	2.0%	35.5%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Sainte-Lucie	2006	\$1.000	21.4%	0.0%	7.8%	46.7%	24.10%	\$0.604	\$0.105	\$0.014
Sainte-Lucie	2007	\$0.772	21.6%	0.0%	13.9%	64.6%	0.0%	\$0.446	\$0.202	\$0.042
Trinité-et-Tobago	2006	\$12.148	95.6%	0.0%	0.0%	4.4%	0.0%	\$5.626	\$3.218	\$0.118
Iles Turques et Caïques	2006	\$0.958	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Iles Turques et Caïques	2007	\$1.109	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Asie de l'Est										
Chine	2006	\$138.927	77.1%	4.6%	17.5%	0.8%	0.0%	\$0.927	\$0.927	N/A / N/R
Chine ²	2007	\$124.116	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$48.078	\$46.392	\$0.897
Japon	2006	\$68.135	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	\$4.130	N/A / N/R	N/A / N/R
Mongolie	2007	\$3.377	7.3%	23.6%	36.0%	19.2%	14.0%	\$1.946	\$0.179	\$0.184
Europe orientale et Asie centrale										
Arménie	2007	\$2.476	16.2%	7.3%	55.7%	20.8%	0.0%	\$1.296	\$0.101	\$0.197
Azerbaïdjan	2007	\$2.220	65.7%	0.0%	34.3%	N/A / N/R	0.0%	\$0.851	N/A / N/R	\$0.851
Bélarus	2006	\$13.133	68.19%	0.0%	28.53%	2.25%	1.03%	\$9.745	\$0.491	\$0.977
Bulgarie	2005	\$7.778	35.40%	0.0%	57.71%	6.89%	0.0%	\$3.758	\$0.336	\$0.627
Bulgarie	2006	\$6.604	48.8%	0.0%	43.0%	8.2%	0.0%	\$3.114	\$0.440	\$0.491
Bulgarie	2007	\$6.659	50.8%	0.0%	43.4%	5.9%	0.0%	\$2.877	\$0.418	\$0.552
Croatie	2006	\$8.424	73.8%	0.0%	23.0%	2.3%	0.9%	\$3.743	N/A / N/R	\$0.442
Géorgie	2006	\$5.263	10.9%	19.3%	56.5%	13.3%	0.0%	\$2.563	\$0.058	\$0.066

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)

Prévention			Prise en charge et traitement		Orphelins et enfants vulnérables	Soutien aux programmes			Autres dépenses liées au VIH
Programmes pour les professionnel(le)s du sexe et leur clientèle, pour les HSH et programmes de réduction des risques pour les CDI	Préservatif, marketing social, fourniture de préservatifs secteur public et commercial et préservatifs féminins	Prévention de la transmission de la mère à l'enfant	Total pour prise en charge et traitement	Traitement par antirétroviraux		Total pour le soutien au programme et à la gestion	Programme gestion, planification et coordination	Suivi et évaluation ⁴	
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.704	\$0.408	N/A / N/R	\$0.145	\$0.115	\$0.001	\$1.290
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$32.604	\$11.314	N/A / N/R	\$0.176	\$0.176	N/A / N/R	\$2.762
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$3.434	N/A / N/R	N/A / N/R	\$2.473	N/A / N/R	N/A / N/R	\$3.709
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
\$0.914	\$0.818	\$3.288	\$31.192	\$13.910	\$2.450	\$20.286	\$10.159	\$4.639	\$3.759
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
\$0.001	\$0.103	\$0.010	\$0.066	\$0.015	\$0.052	\$0.080	\$0.048	\$0.025	\$0.198
\$0.005	\$0.050	\$0.001	\$0.077	\$0.029	\$0.075	\$0.139	\$0.051	\$0.086	\$0.036
\$0.651	\$0.170	\$0.113	\$3.989	\$1.184	\$0.131	\$1.778	\$1.405	\$0.054	\$0.624
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$1.012	N/A / N/R	\$0.505	\$7.300	\$4.781	\$2.329	\$129.153
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$56.583	\$43.669	N/A / N/R	\$17.362	\$0.947	\$4.502	\$2.093
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$9.389	N/A / N/R	N/A / N/R	\$17.398	N/A / N/R	N/A / N/R	\$37.218
\$0.312	\$0.291	\$0.076	\$0.205	\$0.010	\$0.016	\$0.801	\$0.453	\$0.198	\$0.409
\$0.154	\$0.016	\$0.045	\$0.392	\$0.098	\$0.004	\$0.287	\$0.188	\$0.099	\$0.498
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.500	\$0.417	N/A / N/R	\$0.411	\$0.411	N/A / N/R	\$0.458
N/A / N/R	\$0.233	\$0.366	\$1.443	\$0.823	\$0.084	\$0.854	\$0.233	\$0.221	\$1.007
\$0.842	N/A / N/R	N/A / N/R	\$2.689	\$1.614	N/A / N/R	\$0.561	\$0.337	\$0.135	\$0.770
\$0.588	\$0.122	N/A / N/R	\$2.585	\$1.955	N/A / N/R	\$0.363	\$0.218	\$0.087	\$0.543
\$0.597	N/A / N/R	N/A / N/R	\$2.932	\$2.025	N/A / N/R	\$0.348	\$0.209	\$0.084	\$0.501
\$0.509	N/A / N/R	N/A / N/R	\$4.354	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.328	\$0.125	\$0.080	N/A / N/R
\$1.025	\$0.079	\$0.225	\$0.839	\$0.552	N/A / N/R	\$1.036	\$0.206	\$0.088	\$0.824

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Région/Pays (ou territoire)	Année de dépenses	Total des dépenses nationales et internationales en millions de US\$	Pourcentage par source de financement					Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)		
			Nationales publiques (%)	Internationales			Total pour la prévention	Communica- tion pour le changement social et comporte- mental	Conseil et dépistage volontaires	
				Bilatérales (%)	Multilatérales					Toutes les autres sources inter- nationales ou non spécifiées (%)
					Fonds mondial (%)	Nations Unies et toutes les autres multi- latérales (%)				
Kazakhstan	2007	\$17.959	70.0%	1.3%	27.3%	0.6%	0.7%	\$3.392	\$0.111	N/A / N/R
Kirghizistan	2006	\$7.917	8.8%	8.7%	38.7%	43.8%	0.0%	\$6.469	\$0.049	\$0.088
Lettonie ¹	2006	\$5.748	98.7%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	1.3%	\$0.996	\$0.032	\$0.186
Moldova	2007	\$8.186	26.9%	19.0%	17.1%	31.9%	5.1%	\$6.292	\$0.903	\$0.325
Roumanie	2006	\$76.088	93.1%	0.0%	5.4%	1.4%	0.0%	\$5.239	N/A / N/R	N/A / N/R
Fédération de Russie ¹	2006	\$304.835	83.4%	0.0%	11.6%	0.3%	4.7%	\$61.749	N/A / N/R	N/A / N/R
Tadjikistan	2006	\$5.211	5.7%	19.4%	36.6%	19.8%	18.5%	\$2.509	\$0.173	\$0.140
Ukraine	2005	\$39.414	42.9%	17.1%	32.9%	5.5%	1.7%	\$7.442	\$0.025	\$0.373
Ukraine	2006	\$55.417	50.8%	8.2%	36.3%	3.1%	1.6%	\$17.067	\$0.197	\$0.715
Amérique latine										
Argentine	2006	\$149.527	96.7%	0.1%	2.9%	0.2%	0.2%	\$24.855	\$2.141	\$3.011
Bolivie	2005	\$1.833	9.6%	44.7%	21.4%	N/A / N/R	24.2%	\$0.918	\$0.182	N/A / N/R
Bolivie	2006	\$4.025	9.1%	16.6%	51.6%	3.0%	19.8%	\$1.242	\$0.228	N/A / N/R
Bolivie	2007	\$3.183	16.9%	40.7%	16.5%	5.7%	20.1%	\$1.252	\$0.209	N/A / N/R
Brésil ¹	2006	\$565.186	99.5%	0.1%	0.0%	0.3%	0.0%	\$34.159	\$9.903	\$2.455
Chili	2005	\$54.070	83.6%	0.0%	16.4%	0.0%	0.0%	\$9.472	\$0.555	\$0.430
Colombie	2006	\$97.645	98.91%	0.0%	0.92%	0.14%	0.0%	\$34.662	\$2.799	\$0.031
Costa Rica	2006	\$11.271	89.6%	0.0%	9.1%	0.8%	0.6%	\$3.418	\$0.707	N/A / N/R
Equateur ¹	2005	\$2.951	88.9%	0.0%	4.2%	6.8%	0.0%	\$0.545	\$0.013	\$0.250
Equateur ¹	2006	\$10.209	31.9%	0.0%	61.8%	4.6%	1.7%	\$2.942	\$0.052	\$0.489
Equateur ¹	2007	\$7.473	42.8%	0.0%	38.6%	3.7%	14.8%	\$2.413	\$0.022	\$0.435
El Salvador	2006	\$33.128	82.0%	1.3%	8.4%	7.7%	0.6%	\$9.691	\$1.483	\$1.135
Guatemala ¹	2005	\$19.142	66.4%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	33.6%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Guatemala ¹	2006	\$18.957	65.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	35.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Honduras	2006	\$14.354	28.9%	23.5%	28.5%	4.4%	14.5%	\$6.183	\$0.430	\$0.943
Mexique ¹	2005	\$176.052	99.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.7%	\$40.663	\$0.291	\$2.950
Panama	2006	\$14.164	97.3%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	\$0.438	N/A / N/R	\$0.038
Paraguay	2006	\$1.018	75.5%	0.0%	0.0%	17.2%	7.3%	\$0.234	N/A / N/R	\$0.111
Paraguay	2007	\$2.326	47.8%	0.0%	31.2%	11.2%	9.7%	\$0.796	N/A / N/R	\$0.154
Pérou	2005	\$21.875	41.33%	6.63%	34.06%	2.86%	15.12%	\$5.115	\$0.063	N/A / N/R
Pérou	2006	\$32.387	41.07%	1.72%	32.0%	1.74%	23.47%	\$4.769	\$0.197	N/A / N/R
Pérou	2007	\$28.008	44.5%	3.6%	21.8%	4.4%	25.7%	\$9.060	\$0.978	N/A / N/R
Uruguay ¹	2005	\$6.245	94.9%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	5.1%	\$0.770	\$0.030	\$0.162
Uruguay ¹	2006	\$5.731	93.3%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	6.7%	\$0.852	\$0.081	\$0.168

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)

Prévention			Prise en charge et traitement		Orphelins et enfants vulnérables	Soutien aux programmes			Autres dépenses liées au VIH
Programmes pour les professionnel(le)s du sexe et leur clientèle, pour les HSH et programmes de réduction des risques pour les CDI	Préservatif, marketing social, fourniture de préservatifs secteur public et commercial et préservatifs féminins	Prévention de la transmission de la mère à l'enfant	Total pour prise en charge et traitement	Traitement par antirétroviraux		Total pour le soutien au programme et à la gestion	Programme gestion, planification et coordination	Suivi et évaluation ⁴	
\$0.030	\$0.899	N/A / N/R	\$2.400	\$2.066	N/A / N/R	\$11.850	\$0.158	\$0.181	\$0.317
\$0.610	\$0.016	N/A / N/R	\$0.847	\$0.169	\$0.033	\$0.470	\$0.355	\$0.030	\$0.098
\$0.338	N/A / N/R	\$0.028	\$4.400	\$4.400	N/A / N/R	\$0.352	\$0.352	N/A / N/R	N/A / N/R
\$0.332	N/A / N/R	\$0.231	\$0.680	\$0.456	N/A / N/R	\$1.137	\$0.185	\$0.337	\$0.078
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$57.796	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.322	N/A / N/R	N/A / N/R	\$12.732
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$96.798	N/A / N/R	\$32.610	\$18.636	N/A / N/R	N/A / N/R	\$95.041
\$0.285	\$0.105	\$0.030	\$0.144	\$0.114	\$0.020	\$0.335	\$0.144	\$0.095	\$2.203
\$3.174	N/A / N/R	\$0.837	\$15.751	\$2.416	\$0.952	\$7.678	\$3.342	\$0.991	\$7.591
\$7.267	N/A / N/R	\$0.529	\$23.289	\$5.352	\$0.901	\$10.434	\$2.675	\$0.356	\$3.727
\$0.544	\$1.034	\$4.842	\$107.280	\$58.897	\$1.272	\$6.915	\$1.682	\$0.659	\$9.206
\$0.006	\$0.004	\$0.001	\$0.483	\$0.247	N/A / N/R	\$0.266	\$0.102	\$0.038	\$0.166
\$0.002	\$0.002	\$0.004	\$1.881	\$1.664	N/A / N/R	\$0.653	\$0.239	\$0.100	\$0.248
\$0.028	\$0.044	\$0.001	\$0.766	\$0.450	N/A / N/R	\$0.868	\$0.526	\$0.090	\$0.297
\$0.405	\$7.440	\$5.155	\$470.055	\$438.384	\$0.148	\$25.403	\$19.971	\$4.899	\$35.420
\$0.108	\$0.983	\$1.919	\$40.429	\$36.318	N/A / N/R	\$2.204	\$1.554	\$0.276	\$1.966
N/A / N/R	\$6.967	\$2.132	\$62.074	\$36.541	\$0.035	\$0.774	\$0.774	N/A / N/R	\$0.100
N/A / N/R	\$0.080	N/A / N/R	\$7.681	\$4.141	\$0.057	\$0.072	N/A / N/R	\$0.011	\$0.042
N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.011	\$1.661	\$1.468	\$0.019	\$0.534	\$0.033	N/A / N/R	\$0.191
N/A / N/R	\$0.027	\$0.534	\$3.986	\$1.932	\$0.003	\$1.201	\$0.095	\$0.102	\$2.078
\$0.013	\$0.283	\$0.188	\$3.125	\$2.358	N/A / N/R	\$0.376	\$0.118	\$0.146	\$1.559
\$0.055	\$1.450	\$1.019	\$20.867	\$7.551	\$0.399	\$1.024	\$0.510	\$0.335	\$1.147
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
\$0.499	\$0.305	\$0.420	\$4.204	\$2.420	\$0.030	\$3.687	\$1.659	\$1.145	\$0.250
\$5.227	\$3.369	\$4.472	\$122.333	\$103.396	\$0.036	\$12.404	\$3.737	\$1.149	\$0.615
\$0.073	N/A / N/R	\$0.011	\$13.425	\$13.422	\$0.012	\$0.206	\$0.071	N/A / N/R	\$0.083
N/A / N/R	\$0.020	\$0.059	\$0.481	\$0.163	N/A / N/R	\$0.009	\$0.005	\$0.004	\$0.294
\$0.088	\$0.036	\$0.091	\$0.683	\$0.374	N/A / N/R	\$0.168	\$0.045	\$0.063	\$0.679
\$1.128	\$0.808	\$0.555	\$13.168	\$7.806	N/A / N/R	\$0.543	\$0.311	\$0.225	\$3.049
\$0.798	\$0.763	\$0.970	\$20.738	\$13.858	N/A / N/R	\$0.688	\$0.286	\$0.378	\$6.192
\$1.935	\$1.781	\$1.428	\$12.448	\$3.163	\$0.090	\$0.948	\$0.491	\$0.436	\$5.461
\$0.042	\$0.079	\$0.073	\$4.237	\$3.816	N/A / N/R	\$0.135	N/A / N/R	\$0.014	\$1.103
\$0.037	\$0.069	\$0.052	\$3.549	\$3.074	N/A / N/R	\$0.196	N/A / N/R	\$0.015	\$1.135

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Région/Pays (ou territoire)	Année de dépenses	Total des dépenses nationales et internationales en millions de US\$	Pourcentage par source de financement					Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)		
			Nationales publiques (%)	Internationales			Total pour la prévention	Communica- tion pour le changement social et comporte- mental	Conseil et dépistage volontaires	
				Bilatérales (%)	Multilatérales					Toutes les autres sources inter- nationales ou non spécifiées (%)
					Fonds mondial (%)	Nations Unies et toutes les autres multi- latérales (%)				
Moyen-Orient et Afrique du Nord										
Algérie	2006	\$3.674	30.9%	0.0%	65.2%	3.9%	0.0%	\$1.561	\$0.038	\$0.046
Jordanie	2007	\$2.697	5.1%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	94.9%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Liban	2007	\$2.735	30.5%	36.2%	0.0%	17.1%	16.2%	\$1.445	\$0.050	\$0.055
Maroc	2006	\$6.900	33.0%	9.8%	32.5%	11.9%	12.8%	\$2.996	N/A / N/R	N/A / N/R
Maroc	2007	\$8.833	30.5%	3.4%	54.5%	8.4%	3.2%	\$4.147	N/A / N/R	N/A / N/R
Soudan, Nord ¹	2007	\$15.985	8.8%	0.0%	57.9%	33.4%	0.0%	\$8.923	\$1.024	\$0.731
Soudan, Sud ¹	2006	\$0.260	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Soudan, Sud ¹	2007	\$1.313	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	100.0%	N/A / N/R	\$0.518	\$0.259	\$0.152
Turquie ¹	2006	\$54.175	92.3%	0.0%	3.2%	4.6%	0.0%	\$27.657	\$0.145	\$0.055
Turquie ¹	2007	\$56.472	89.3%	0.0%	3.5%	7.2%	0.0%	\$25.265	\$0.087	\$0.089
Océanie										
Australie	2006	\$101.415	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	\$1.898	\$0.079	N/A / N/R
Iles Marshall	2007	\$0.123	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Palaos	2007	\$0.333	16.4%	0.0%	10.7%	0.0%	72.9%	\$0.148	\$0.005	\$0.026
Asie du Sud et Asie du Sud-Est										
Cambodge	2006	\$44.179	13.7%	42.5%	21.5%	19.2%	3.2%	\$19.948	\$0.685	\$2.587
Indonésie	2006	\$56.577	26.6%	47.7%	18.5%	7.2%	0.0%	\$23.180	\$3.765	\$0.128
Iran (République islamique d')	2006	\$32.778	90.8%	0.0%	5.9%	3.3%	0.0%	\$20.483	N/A / N/R	N/A / N/R
République démocratique populaire lao ¹	2006	\$4.676	0.5%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	99.5%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
République démocratique populaire lao ¹	2007	\$5.824	0.4%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	99.6%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Népal ¹	2006	\$8.897	2.4%	46.5%	12.7%	14.4%	24.0%	\$6.120	\$0.289	\$0.281
Pakistan	2007	\$5.077	36.1%	0.0%	0.0%	59.8%	4.1%	\$3.597	N/A / N/R	N/A / N/R
Philippines	2005	\$6.842	18.9%	35.6%	28.7%	15.2%	1.7%	\$3.187	\$0.566	\$0.064
Philippines	2006	\$7.686	34.6%	40.8%	8.0%	15.5%	1.0%	\$4.936	\$2.362	\$0.085
Sri Lanka	2007	\$1.706	99.4%	0.0%	N/A / N/R	0.6%	0.0%	\$0.011	N/A / N/R	N/A / N/R
Thaïlande	2007	\$199.645	82.7%	0.5%	16.0%	0.8%	0.0%	\$28.186	\$0.188	\$5.497
Viet Nam ¹	2006	\$47.156	10.5%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	89.5%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Afrique subsaharienne										
Angola ¹	2006	\$27.724	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Angola ¹	2007	\$47.494	82.14%	0.0%	5.87%	8.21%	3.78%	\$23.687	\$5.270	N/A / N/R
Bénin ¹	2006	\$25.931	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Bénin ¹	2007	\$25.992	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Botswana ¹	2005	\$206.939	79.8%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	20.2%	\$28.346	\$5.576	\$8.062

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)

Prévention			Prise en charge et traitement		Orphelins et enfants vulnérables	Soutien aux programmes			Autres dépenses liées au VIH
Programmes pour les professionnel(le)s du sexe et leur clientèle, pour les HSH et programmes de réduction des risques pour les CDI	Préservatif, marketing social, fourniture de préservatifs secteur public et commercial et préservatifs féminins	Prévention de la transmission de la mère à l'enfant	Total pour prise en charge et traitement	Traitement par antirétroviraux		Total pour le soutien au programme et à la gestion	Programme gestion, planification et coordination	Suivi et évaluation ⁴	
\$0.088	\$0.407	\$0.027	\$1.578	\$1.044	N/A / N/R	\$0.206	N/A / N/R	\$0.172	\$0.329
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
\$0.298	\$0.029	N/A / N/R	\$0.850	\$0.820	N/A / N/R	\$0.243	\$0.163	\$0.080	\$0.197
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$2.673	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.518	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.713
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$3.644	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.708	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.334
N/A / N/R	\$0.792	\$0.243	\$1.479	\$1.351	\$0.095	\$4.306	\$3.469	\$0.508	\$1.182
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.060	\$0.100	\$0.100	N/A / N/R	\$0.100
N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.051	\$0.234	\$0.200	\$0.100	\$0.220	\$0.150	\$0.070	\$0.240
\$0.816	\$0.085	\$0.015	\$25.085	\$6.500	\$0.070	\$1.102	\$0.332	\$0.770	\$0.261
\$0.878	N/A / N/R	\$0.040	\$27.429	\$8.012	\$0.200	\$1.175	\$0.356	\$0.750	\$2.003
\$1.345	N/A / N/R	N/A / N/R	\$93.003	\$93.003	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$6.514
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	\$0.015	\$0.021	\$0.016	\$0.009	N/A / N/R	\$0.117	\$0.074	\$0.032	\$0.053
\$0.626	\$4.381	N/A / N/R	\$9.603	\$2.708	\$2.019	\$8.826	\$4.494	\$4.230	\$3.784
\$0.143	\$0.260	\$0.022	\$14.074	\$0.092	\$0.046	\$12.161	\$0.941	\$0.361	\$7.116
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$2.944	N/A / N/R	N/A / N/R	\$4.509	N/A / N/R	N/A / N/R	\$4.843
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
\$2.227	\$1.326	N/A / N/R	\$1.122	\$0.013	\$0.022	\$0.962	\$0.460	\$0.336	\$0.671
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.046	N/A / N/R	\$0.149	\$0.412	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.873
\$1.331	\$0.360	N/A / N/R	\$0.550	\$0.394	\$0.011	\$2.109	\$0.782	\$1.135	\$0.985
\$1.531	\$0.003	\$0.062	\$0.123	\$0.008	\$0.023	\$1.814	\$0.832	\$0.883	\$0.791
\$0.001	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$1.695
\$1.029	\$2.529	\$3.542	\$143.334	\$93.625	\$3.006	\$19.449	\$10.991	\$5.896	\$5.669
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	\$1.700	\$17.095	\$6.225	N/A / N/R	\$1.529	\$1.529	N/A / N/R	\$5.183
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	\$4.538	\$6.745	\$102.796	\$38.741	\$39.698	\$27.991	\$24.542	\$2.237	\$8.108

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Région/Pays (ou territoire)	Année de dépenses	Total des dépenses nationales et internationales en millions de US\$	Pourcentage par source de financement					Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)		
			Nationales publiques (%)	Internationales				Total pour la prévention	Communica- tion pour le changement social et comporte- mental	Conseil et dépistage volontaires
				Bilatérales (%)	Multilatérales		Toutes les autres sources inter- nationales ou non spécifiées (%)			
					Fonds mondial (%)	Nations Unies et toutes les autres multi- latérales (%)				
Botswana	2006	\$143.406	91.3%	8.1%	0.3%	N/A / N/R	0.4%	\$9.853	\$0.208	\$0.324
Botswana	2007	\$229.458	88.8%	10.5%	0.2%	N/A / N/R	0.4%	\$15.995	\$0.404	\$0.162
Burkina Faso	2006	\$43.275	22.3%	32.3%	6.7%	29.3%	9.4%	\$12.251	\$0.125	\$1.196
Cameroun ¹	2005	\$43.174	10.2%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	89.8%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Cameroun ¹	2006	\$33.938	17.7%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	82.3%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Cameroun ¹	2007	\$37.826	25.4%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	74.6%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Cap-Vert ¹	2006	\$0.800	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.209	N/A / N/R	N/A / N/R
Cap-Vert ¹	2007	\$1.791	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.856	\$0.242	N/A / N/R
République centrafricaine	2006	\$14.694	4.3%	0.0%	13.4%	69.2%	13.1%	\$2.032	N/A / N/R	N/A / N/R
Tchad ¹	2006	\$1.733	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Tchad ¹	2007	\$5.108	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Comores ¹	2007	\$0.150	100.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Congo	2007	\$16.151	31.1%	7.6%	29.1%	32.2%	0.0%	\$5.329	N/A / N/R	\$0.563
Côte d'Ivoire	2005	\$15.723	26.5%	37.6%	2.4%	26.8%	6.6%	\$3.998	\$0.037	\$0.354
Côte d'Ivoire	2006	\$39.130	12.0%	26.9%	0.8%	55.1%	5.2%	\$9.174	\$0.169	\$0.907
République démocratique du Congo ¹	2006	\$41.033	N/A / N/R	29.7%	25.0%	39.0%	6.3%	\$11.896	\$1.110	\$1.483
Erythrée	2005	\$15.412	4.1%	4.3%	23.4%	68.2%	0.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Erythrée	2006	\$7.183	9.7%	0.0%	66.4%	23.9%	0.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Erythrée	2007	\$7.793	9.7%	0.0%	50.6%	39.7%	0.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Gabon	2007	\$9.691	58.9%	0.3%	25.4%	11.5%	3.9%	\$3.489	N/A / N/R	N/A / N/R
Gambie	2007	\$16.931	92.7%	0.0%	7.3%	N/A / N/R	0.0%	\$16.023	\$0.007	\$0.200
Ghana	2006	\$22.982	21.4%	7.9%	39.6%	2.3%	28.8%	\$7.198	\$3.659	\$0.454
Guinée-Bissau	2006	\$2.859	0.0%	2.9%	24.2%	69.8%	3.1%	\$0.183	N/A / N/R	N/A / N/R
Guinée-Bissau	2007	\$2.800	0.0%	7.3%	25.6%	63.7%	3.4%	\$0.490	N/A / N/R	N/A / N/R
Lesotho	2006	\$24.436	18.7%	28.5%	14.5%	30.3%	7.9%	\$3.170	\$0.224	\$1.962
Madagascar	2007	\$16.823	18.2%	14.0%	32.9%	34.9%	0.0%	\$10.407	N/A / N/R	N/A / N/R
Malawi ¹	2005	\$56.491	32.3%	0.0%	8.1%	N/A / N/R	59.5%	\$5.758	\$0.675	\$0.618
Mali	2006	\$26.773	32.3%	28.7%	22.2%	3.8%	13.0%	\$11.740	\$1.156	\$0.069
Maurice	2006	\$1.501	70.7%	0.0%	0.0%	29.3%	0.0%	\$0.506	\$0.008	\$0.045
Mozambique ⁷	2005	\$58.246	19.8%	41.5%	0.0%	30.9%	7.7%	\$26.236	\$3.594	\$2.177
Mozambique ⁷	2006	\$95.505	15.0%	46.8%	0.7%	31.4%	6.2%	\$31.555	\$4.811	\$2.413
Namibie ¹	2005	\$79.122	48.73%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	51.27%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Namibie ¹	2007	\$130.500	50.80%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	49.20%	\$18.639	N/A / N/R	N/A / N/R
Niger	2006	\$21.632	52.4%	6.6%	14.9%	26.0%	0.0%	\$21.632	\$19.982	\$0.002

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)

Prévention		Prise en charge et traitement		Orphelins et enfants vulnérables	Soutien aux programmes			Autres dépenses liées au VIH	
Programmes pour les professionnel(le)s du sexe et leur clientèle, pour les HSH et programmes de réduction des risques pour les CDII	Préservatif, marketing social, fourniture de préservatifs secteur public et commercial et préservatifs féminins	Prévention de la transmission de la mère à l'enfant	Total pour prise en charge et traitement		Traitement par antirétroviraux	Total pour le soutien au programme et à la gestion	Programme gestion, planification et coordination		Suivi et évaluation ⁴
N/A / N/R	\$0.052	\$4.305	\$90.978	\$33.150	\$29.367	\$13.007	\$1.695	\$0.457	\$0.202
N/A / N/R	\$0.017	\$8.704	\$140.364	\$44.482	\$51.442	\$20.762	\$2.498	\$1.321	\$0.895
\$0.207	\$2.692	\$2.058	\$14.323	\$7.916	\$1.931	\$9.345	\$4.726	\$4.619	\$5.425
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.590	\$0.465	\$0.125	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.254	N/A / N/R	\$0.016	\$0.665	\$0.588	\$0.077	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$5.596	N/A / N/R	\$4.858	\$1.217	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.990
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
\$0.009	\$1.456	\$0.326	\$5.607	\$4.967	\$0.626	\$4.524	\$3.733	\$0.187	\$0.066
\$0.005	\$2.623	\$0.591	\$5.968	N/A / N/R	\$2.141	\$2.323	\$1.895	\$0.428	\$1.291
\$0.004	\$3.462	\$2.191	\$22.502	\$1.873	\$2.815	\$3.027	\$2.026	\$0.715	\$1.611
\$0.018	\$1.619	\$0.805	\$9.026	\$4.018	\$4.271	\$13.065	\$9.142	\$2.019	\$2.775
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
\$0.004	\$0.195	N/A / N/R	\$2.544	\$1.828	\$0.708	\$2.468	\$0.423	\$0.523	\$0.481
N/A / N/R	\$0.116	\$0.191	\$0.062	N/A / N/R	\$0.077	\$0.145	\$0.006	\$0.116	\$0.625
\$0.017	\$0.768	N/A / N/R	\$15.784	\$4.297	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.246	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$2.430
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$1.160	N/A / N/R	\$0.006	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$1.144
N/A / N/R	\$0.225	\$0.291	\$4.834	\$1.192	\$3.967	\$5.180	\$3.143	\$0.443	\$7.286
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$0.323	N/A / N/R	\$0.199	\$4.023	N/A / N/R	N/A / N/R	\$1.872
N/A / N/R	\$0.125	\$0.021	\$27.490	N/A / N/R	\$1.009	\$5.523	\$2.614	\$0.821	\$16.712
\$0.340	\$0.170	\$0.222	\$3.022	\$1.331	\$0.820	\$6.327	\$2.627	\$0.515	\$4.864
\$0.166	N/A / N/R	\$0.023	\$0.304	\$0.304	\$0.456	\$0.198	\$0.184	\$0.014	\$0.037
\$0.305	\$2.488	\$2.558	\$12.939	\$6.718	\$4.101	\$10.509	\$8.799	\$1.491	\$4.460
\$0.140	\$2.627	\$4.935	\$35.489	\$19.422	\$7.273	\$14.573	\$10.561	\$2.145	\$6.616
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$74.574	N/A / N/R	N/A / N/R	\$14.871	N/A / N/R	N/A / N/R	\$22.416
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Région/Pays (ou territoire)	Année de dépenses	Total des dépenses nationales et internationales en millions de US\$	Pourcentage par source de financement					Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)		
			Nationales publiques (%)	Internationales			Total pour la prévention	Communica- tion pour le changement social et comporte- mental	Conseil et dépistage volontaires	
				Bilatérales (%)	Multilatérales					
					Fonds mondial (%)	Nations Unies et toutes les autres multi- latérales (%)				Toutes les autres sources inter- nationales ou non spécifiées (%)
Nigéria ³	2006	\$19.141	56.2%	0.3%	28.9%	14.6%	0.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Nigéria ³	2007	\$19.141	56.2%	0.3%	28.9%	14.6%	0.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Rwanda ⁵	2006	\$84.742	5.1%	0.0%	15.3%	17.3%	62.3%	\$20.651	\$4.002	\$4.656
Sénégal ¹	2006	\$11.935	48.5%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	51.5%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Sénégal ¹	2007	\$17.815	47.8%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	52.2%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Seychelles	2007	\$0.146	87.1%	0.0%	0.0%	12.9%	0.0%	\$0.146	N/A / N/R	N/A / N/R
Sierra Leone ¹	2006	\$7.760	4.2%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	95.8%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Sierra Leone ¹	2007	\$5.619	4.2%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	95.8%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Somalie ¹	2006	\$12.203	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Somalie ¹	2007	\$9.812	N/A / N/R	0.0%	59.9%	36.2%	3.9%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Afrique du Sud ⁶	2006	\$575.680	74.0%	7.1%	14.0%	3.4%	1.5%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Afrique du Sud ⁶	2007	\$621.623	77.3%	4.0%	13.0%	3.2%	2.6%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Swaziland	2006	\$49.113	39.8%	5.8%	31.0%	9.7%	13.6%	\$8.301	\$2.900	\$2.243
RU de Tanzanie	2005	\$266.371	40.6%	7.1%	14.2%	3.1%	35.0%	\$82.399	\$1.295	\$4.961
RU de Tanzanie ¹	2006	\$323.501	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Togo	2006	\$8.435	11.9%	3.9%	65.2%	10.5%	8.5%	\$6.320	\$1.245	\$1.584
Togo	2007	\$11.793	13.3%	4.4%	53.2%	11.8%	17.4%	\$8.632	\$1.790	\$1.688
Ouganda	2005	\$202.419	6.1%	77.3%	4.4%	4.8%	7.4%	\$37.841	\$12.707	\$12.006
Zambie	2006	\$189.930	15.3%	60.9%	12.9%	7.0%	3.9%	\$47.062	\$5.118	\$8.254
Zimbabwe ¹	2005	\$89.432	16.4%	71.9%	0.0%	11.7%	0.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Zimbabwe ¹	2006	\$129.517	49.0%	32.4%	0.0%	18.6%	0.0%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Europe occidentale et centrale										
Albanie	2005	\$2.377	46.7%	0.0%	0.0%	0.0%	53.3%	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
Pologne	2007	\$42.786	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	\$4.400	\$0.271	\$0.154
Suisse	2006	\$18.506	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	\$5.747	\$3.448	N/A / N/R
Ex-République yougoslave de Macédoine	2005	\$3.627	46.4%	0.0%	37.1%	13.24%	3.30%	\$2.939	\$0.173	\$0.281

UNGASS Indicateur 1. Rapports des pays sur les dépenses sida par catégories et sources de financement

Total des dépenses VIH dans les services sélectionnés (en millions de US\$)

Prévention			Prise en charge et traitement		Orphelins et enfants vulnérables	Soutien aux programmes			Autres dépenses liées au VIH
Programmes pour les professionnel(le)s du sexe et leur clientèle, pour les HSH et programmes de réduction des risques pour les CDI	Préservatif, marketing social, fourniture de préservatifs secteur public et commercial et préservatifs féminins	Prévention de la transmission de la mère à l'enfant	Total pour prise en charge et traitement	Traitement par antirétroviraux		Total pour le soutien au programme et à la gestion	Programme gestion, planification et coordination	Suivi et évaluation ⁴	
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	\$0.657	\$2.089	\$25.500	\$6.337	\$7.034	\$25.311	\$18.412	\$0.358	\$6.247
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	\$0.713	\$0.344	\$9.384	\$6.244	\$15.027	\$6.866	\$3.136	\$0.963	\$9.535
\$0.044	\$1.735	\$3.499	\$63.340	\$8.031	N/A / N/R	\$48.277	\$24.976	\$0.108	\$72.355
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
\$0.083	\$0.093	\$0.153	\$0.552	\$0.247	\$0.164	\$1.033	\$0.622	\$0.144	\$0.365
\$0.113	\$0.681	\$0.239	\$0.862	\$0.386	\$0.257	\$1.471	\$0.936	\$0.225	\$0.571
\$0.079	\$0.154	\$5.705	\$85.149	\$59.231	\$13.716	\$44.878	\$12.906	\$10.855	\$20.835
\$0.117	\$1.385	\$17.864	\$89.306	\$38.992	\$8.300	\$27.052	\$5.441	\$5.898	\$18.211
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R
\$2.881	N/A / N/R	\$0.709	\$38.022	\$36.650	\$0.013	\$0.019	N/A / N/R	\$0.017	\$0.332
N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	N/A / N/R	\$1.264	\$0.805	\$0.460	\$11.494
\$2.071	\$0.016	N/A / N/R	\$0.107	\$0.039	N/A / N/R	\$0.395	\$0.256	\$0.082	\$0.186

Notes:

« N/A / N/R » signifie que les données sont soit « non applicables », soit « non enregistrées » ou que la dépense était \$0 mais que cela n'est pas clair dans le rapport national.

Cette annexe reflète les rapports de pays et clarifications reçus au 27 mai 2008.

¹ Ces chiffres sont des indications préliminaires et soumises à révision parce qu'il est nécessaire de s'assurer qu'ils sont à jour ou par manque de temps pour des clarifications, ou à cause de différences sur la période référencée, ou encore parce que des pays les ont donnés comme des estimations partielles.

² Pour 2007, le montant des dépenses internationales pour la Chine n'était pas disponible et seul figure ici le financement public national.

³ Le Nigéria a enregistré deux années (2006 et 2007). La dépense a donc été divisée par deux et répartie également entre les deux années. Données sur les dépenses du PEPFAR non comprises.

⁴ Suivi et évaluation incluent également la recherche opérationnelle, la sérosurveillance, la surveillance de la résistance médicamenteuse du VIH et les technologies de l'information.

⁵ Les sources bilatérales ne comprennent pas US\$ 28,8 millions du PEPFAR qui ont été signalées dans le cadre du « Total des sources internationales ».

⁶ Données sur les dépenses du PEPFAR non comprises.

⁷ Inclut les dépenses bilatérales émanant de l'USAID mais non le financement en provenance des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Indicateur UNGASS 3. Pourcentage d'unités de sang provenant de dons et soumises à un dépistage du VIH selon les principes de l'assurance de la qualité

Pays (ou territoire)	Valeur de l'indicateur ¹
Afghanistan	39
Algérie	100
Antigua-et-Barbuda	33
Argentine	100
Arménie	100
Australie	100
Autriche	100 ²
Bahamas	100
Bahreïn	100 ²
Barbade	100
Bélarus	100
Belgique	100
Belize	100
Bénin	99
Bhoutan	50 ²
Bolivie	88
Bosnie-Herzégovine	0
Botswana	100
Bulgarie	100
Burkina Faso	66
Burundi	100
Cambodge	97
Canada	100
Cap-Vert	61
République centrafricaine	76
Tchad	100
Chine	100
Colombie	100
Comores	100
Congo	100
Costa Rica	100
Côte d'Ivoire	100
Croatie	86
Cuba	100
Chypre	100
République tchèque	100 ²
République démocratique du Congo	47
Dominique	100

Indicateur UNGASS 3. Pourcentage d'unités de sang provenant de dons et soumises à un dépistage du VIH selon les principes de l'assurance de la qualité

Pays (ou territoire)	Valeur de l'indicateur ¹
République dominicaine	100
Equateur	100
El Salvador	100
Erythrée	100
Estonie	100
Ethiopie	100
Fidji	100
Finlande	100
Gabon	100
Géorgie	0
Allemagne	100
Ghana	100
Grenade	91
Guatemala	100
Guinée	53
Guinée-Bissau	100
Guyana	100
Haïti	100
Honduras	46
Hongrie	100
Inde	100
Iran (République islamique d')	100
Irlande	100
Israël	100
Jamaïque	100
Japon	100
Jordanie	100
Kazakhstan	95
Kenya	100
Koweït	100 ²
Kirghizistan	88
République démocratique populaire lao	100
Lettonie	100
Liban	100
Lesotho	100
Lituanie	100
Luxembourg	100 ²
Madagascar	99

Indicateur UNGASS 3. Pourcentage d'unités de sang provenant de dons et soumises à un dépistage du VIH selon les principes de l'assurance de la qualité

Pays (ou territoire)	Valeur de l'indicateur ¹
Malawi	99
Malaisie	100
Maldives	0 ²
Mali	94
Malte	100 ²
Îles Marshall	100
Mauritanie	100
Maurice	100
Mexique	100
Moldova	74
Mongolie	72
Monténégro	100
Maroc	100
Mozambique	36
Namibie	100 ²
Népal	100
Pays-Bas	100 ²
Nouvelle-Zélande	100
Nicaragua	90
Niger	100
Nigéria	100
Norvège	100 ²
Pakistan	87
Palaos	100
Panama	100
Papouasie-Nouvelle-Guinée	100
Paraguay	95
Pérou	99
Pologne	100 ²
Republique de Corée	100 ²
Roumanie	100
Rwanda	100
Saint-Kitts-et-Nevis	100
Sainte-Lucie	100
Saint-Vincent-et-les Grenadines	100
Samoa	100 ²
Sao Tomé-et-Principe	0
Sénégal	78

Indicateur UNGASS 3. Pourcentage d'unités de sang provenant de dons et soumises à un dépistage du VIH selon les principes de l'assurance de la qualité

Pays (ou territoire)	Valeur de l'indicateur ¹
Serbie	100
Seychelles	100
Sierra Leone	100
Singapour	100
Slovénie	100
Afrique du Sud	100
Espagne	100
Sri Lanka	42
Suriname	100
Swaziland	100
Suède	100
Suisse	100
Tadjikistan	97
Thaïlande	99
Timor-Leste	58 ²
Togo	85
Trinidad-et-Tobago	100
Tunisie	100
Turquie	100
Ouganda	100
Ukraine	0
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	100
République-Unie de Tanzanie	100
Uruguay	100
Zambie	100
Zimbabwe	100

¹ La collecte de données peut varier de 2005 à 2007.

² Données fournies par le Département Sécurité transfusionnelle de l'OMS.

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux

Pays (ou territoire)	2004		2005		2006	
	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)
Albanie	50	45 ⁶	...
Algérie	424	13 [6-24]	588 ⁶	14 [7-26]
Andorre	24 ⁶	...
Angola	3000	9 [2-16]	3000	8 [3-13]	6514 ⁵	16 [6-23]
Antigua-et-Barbuda	0	...	40	60 ¹³	114	...
Argentine	29500	70 [52->95]	30127	65 [49-90]	35211	71 [55->95]
Arménie	...	0 ¹²	29	6 [4-8]	47	8 [5-12]
Azerbaïdjan	...	0 ¹²	7	1 ¹³
Bahamas	1252	48 [34-67]
Bangladesh	5	<1 [<1-1]	5	<1 [<1-<1]	59 ³	3 [2-5]
Barbade	333	39 [29-52]	582	65 [48-86]	623	67 [50-90]
Bélarus	33	<1 [<1-1]	120	3 [2-4]	638	15 [11-22]
Belgique	...	94 ¹²	6450 ⁶	67 [39->95]
Belize	178	20 [12-35]	180	19 [12-33]	435 ³	42 [27-68]
Bénin	2000	13 [11-17]	4673	28 [23-36]	7634 ³	42 [35-53]
Bhoutan	5	... ²	5	... ²	19 ⁶	... ²
Bolivie	130	7 [5-10]	300	16 [11-22]	382	18 [13-25]
Bosnie-Herzégovine	13	10 ¹²	29	...	19 ⁵	...
Botswana	37000	44 [37-54]	59946	64 [55-76]	79490	76 [66-88]
Bésil	154000	74 [64-88]	174000	80 [69-95]	174270 ⁵	78 [68-94]
Bulgarie	90	45	187	...	196	...
Burkina Faso	3000	7 [6-10]	8214	19 [15-25]	14079	31 [25-39]
Burundi	3000	6 [5-8]	6416	13 [10-18]	8048	17 [13-23]
Cambodge	5000	14 [11-18]	12396	34 [28-44]	20131	54 [45-66]
Cameroun	14000	9 [7-11]	23820	14 [11-18]	28403	16 [13-21]
Canada	21000 ⁶	...
Cap-Vert	215	...	223	...
République centrafricaine	1000	3 [2-3]	1647	4 [3-5]	2782	6 [5-8]
Tchad	300	1 [<1-1]	5275	11 [6-18]	5500	11 [7-16]
Chili	9000	>95 [74->95]	6964	67 [51-89]	7782	68 [52-90]
Chine	9000	7 [5-11]	19282	13 [9-20]	31140 ⁶	19 [12-29]
Colombie	12000	28 [19-40]	13000	27 [19-39]	17540	34 [24-48]
Comores	200	... ²	5	>95 ¹³
Congo	464	2 [1-2]	2967	11 [9-14]	3186	12 [10-15]
Costa Rica	2000	>95 [83->95]	2717	>95 [88->95]	2866	>95 [75->95]
Côte d'Ivoire	5000	3 [2-4]	18533	10 [8-13]	36348	19 [16-25]
Croatie	204	>95 ¹²	247	...	291 ⁵	...
Cuba	2000	>95 [>95->95]	2079	>95 [>95->95]	1711	>95 [76->95]

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux									
2007									
Toute personne sous traitement				Total des personnes traitées par antirétroviraux déclaré par les pays	Mois et année de la valeur déclarée par le pays	Nombre de personnes traitées par antirétroviraux à fin 2007 ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Total des besoins estimé par la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ¹⁸	Total des besoins indiqués par le pays à l'UNGASS
Masculin	Féminin	Ensemble < 15 ans	Ensemble > 15 ans						
...	...	12	62	74	Déc 07	74
...	...	45	884	929	Oct 07	993 ³	20 [10-36]	4900 [2700-10000]	...
...
...	...	363 ⁸	10877 ⁸	11540	Déc 07	11540	25 [11-35]	47000 [33000-110000]	45287
14	16	30	Sep 07	148 ³	161
22557	15685	3654	34588	38242	Déc 07	38242	73 [57->95]	53000 [38000-67000]	38242
52	26	4	74	78	Déc 07	78	12 [8-17]	660 [<500-1000]	860
...	...	0	81	81	Déc 07	81	14 [6-24]	580 [<500-1300]	...
577	667	98	1146	1244	Sep 07	1244	43 [31-64]	2900 [1900-4100]	2083
...	178	Déc 07	178	7 [4-12]	2400 [1500-4000]	1125
358 ⁷	302 ⁷	17 ¹⁵	...	660	Juin 07	660 ⁷	73 [56->95]	980 [730-1300]	772
655	229	69	815	884	Déc 07	884	20 [14-29]	4300 [3000-6200]	1210
...	10000 [6100-18000]	...
263	295	65	493	558	Déc 07	558	49 [32-76]	1100 [740-1700]	4131
...	...	542	9223	9765	Déc 07	9765	49 [41-60]	20000 [16000-24000]	21706
10	8	0	18	18	Déc 07	18	... ²	<100 [<100-<100]	...
345	151	22	474	496	Déc 07	496	22 [16-30]	2300 [1700-3100]	1055
22	8	1	29	30	Déc 07	30	30
32623 ⁸	50795 ⁸	9496 ⁸	73922 ⁸	92932	Déc 07	92932	79 [69->95]	120000 [100000-130000]	110000
109057	71943	6815	174185	181000	Déc 07	181000	80 [69->95]	230000 [190000-260000]	...
150	71	3	218	221	Déc 07	221
5084	10804	629 ¹⁴	15259	15888	Sep 07	16938 ³	35 [29-43]	48000 [39000-58000]	47942
3486	7408	1198	9696	10894	Déc 07	10894	23 [18-31]	47000 [35000-59000]	23532
13118	13546	2541	24123	26664	Déc 07	26664	67 [57-80]	40000 [34000-47000]	29200
16036	29781	1694	44123	45817	Déc 07	45817	25 [21-32]	180000 [140000-220000]	86453
...
125	166	23	268	291	Déc 07	291	1028
3215	4822	380 ¹⁴	5876 ¹⁰	8037	Sep 07	9591 ³	21 [18-27]	45000 [36000-54000]	36920
2738	4662	148	7252	7400	Déc 07	7400	13 [9-18]	55000 [41000-79000]	21000
8495	1728	10223	Déc 07	10223	82 [64->95]	12000 [9100-16000]	9023
19245 ^{8,10}	15148 ^{8,10}	766 ⁸	33846 ⁸	35112	Déc 07	35112
...	...	3 ¹⁵	54000 [39000-78000]	...
4	3	1	6	7	Déc 07	7	... ²	<100 [<100-<100]	8
1886	2830	462	4254	4716	Sep 07	4956 ³	17 [14-21]	29000 [23000-35000]	11895
...	2952	Déc 07	2952 ⁶	>95 [64->95]	2800 [1600-4600]	3060
12349 ⁸	22525 ⁸	1785 ⁸	33089 ⁸	46007	Sep 07	51812 ³	28 [23-35]	190000 [150000-230000]	165448
...	310	Juin 07	322 ³
...	...	17	3089	3106	Déc 07	3106	>95 [>95->95]	1400 [760-2500]	1887

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux

Pays (ou territoire)	2004		2005		2006	
	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)
Chypre
République tchèque	270	34 [18-57]	322	37 [19-62]	570 ⁶	60 [32->95]
République démocratique du Congo	4000	4 [3-5]	7721	7 [6-9]	17561	15 [13-19]
Djibouti	200	6 [4-9]	350	9 [6-13]	598 ³	14 [11-20]
Dominique	5	...	21	37 ¹³	37	...
République dominicaine	1000	5 [4-7]	2582	12 [10-17]	5001	24 [19-31]
Equateur	1000	16 [9-28]	1567	23 [14-41]	1745 ³	24 [14-43]
Egypte	58	4 [3-5]	200	11 [8-16]	205 ⁶	10 [7-14]
El Salvador	2000	23 [2-76]	2873	31 [3-65]	4712	46 [6-75]
Guinée équatoriale	5	<1 [<1-<1]	5	<1 [<1-<1]	414 ³	14 [10-19]
Erythrée	50	<1 [<1-<1]	563	6 [4-10]	1175	12 [8-19]
Estonie	76	12 [4-33]	201	19 [7-48]	495	33 [15-76]
Ethiopie	11000	4 [3-5]	20477	7 [6-9]	53720	18 [15-23]
Fidji
Finlande	...	95 ¹²	450 ⁶	54 ¹³
France	64 ¹³
Gabon	2000	20 [13-31]	2000	17 [12-26]	5278	39 [28-56]
Gambie	150	9 [5-19]	150	8 [5-16]	400 ³	19 [11-38]
Géorgie	83	8 ¹²	140	>95 ¹³	267	69 ¹³
Allemagne	...	95 ¹²	27000 ⁶	...
Ghana	2000	3 [2-3]	4328	5 [4-7]	9882 ³	12 [9-15]
Grèce	3426	...
Grenade	33	...
Guatemala	4000	24 [17-37]	5632	32 [22-46]	6030	31 [22-44]
Guinée	1000	7 [5-11]	2101	13 [9-19]	4699	26 [19-36]
Guinée-Bissau	62	2 [1-2]	349	9 [6-13]
Guyana	500	12 [8-17]	1200	29 [19-41]	1569	37 [26-51]
Haïti	3000	10 [8-13]	6896	22 [17-28]	8796	26 [21-33]
Honduras	3000	27 [11-53]	4305	39 [19-70]	4674	41 [22-66]
Hongrie	300	20 [11-33]	402	24 [14-39]	412	22 [13-37]
Inde	28000	3 [2-7]	51888	6 [4-11]	90597	10 [7-16]
Indonésie	3000	19 [8->95]	3520	14 [7-69]	5100	15 [7-41]
Iran (République islamique d')	420	3 [2-4]	525 ³	3 [2-5]
Iraq	75	...	0 ⁶	...
Israël	2431	61 ¹³
Jamaïque	500	7 [5-11]	1456	20 [14-29]	2633	33 [25-48]
Japon	48	...
Jordanie	40	21 ¹²	45	...	45 ⁶	...

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux									
2007									
Toute personne sous traitement				Total des personnes traitées par antirétroviraux déclaré par les pays	Mois et année de la valeur déclarée par le pays	Nombre de personnes traitées par antirétroviraux à fin 2007 ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Total des besoins estimé par la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ¹⁸	Total des besoins indiqué par le pays à l'UNGASS
Masculin	Féminin	Ensemble < 15 ans	Ensemble > 15 ans						
117	34	1	150	151	Déc 07	151	154
...	570	Juin 07	570 ⁶	56 [30->95]	1000 [590-1900]	...
...	...	1632 ¹⁵	...	14678	Juin 07	28925 ³	24 [20-29]	[99000-150000]	347490
343	362	25	680	705	Déc 07	705 ⁶	16 [12-21]	4500 [3300-5900]	...
9 ⁷	28 ⁷	2	37	39	Déc 07	39	53
3661	3803	589	7610	8199	Déc 07	8199	38 [31-48]	22000 [17000-27000]	21780
...	...	252	2962	3214	Déc 07	3214	42 [25-71]	7600 [4500-13000]	7632
...	...	18 ¹⁵	...	209	Déc 07	209 ⁶	9 [7-13]	2200 [1600-3100]	...
2136 ¹⁰	2315 ¹⁰	693 ¹⁰	3758 ¹⁰	5773	Déc 07	5773	51 [9-74]	11000 [7800-63000]	4840
...	859	Sep 07	985 ^{3,6}	31 [23-43]	3100 [2300-4300]	...
...	...	65	1236	1301	Déc 07	1301	13 [9-20]	10000 [6700-15000]	12940
...	772	Déc 07	772	38 [19-81]	2000 [960-4100]	...
40138	50074	4534	85678	90212	Déc 07	90212	29 [25-36]	310000 [250000-370000]	258284
...	...	1	27	28	Déc 07	28 ⁶	... ²	<200 [<100-<200]	...
...	1000 [600-1800]	...
...	88000 [51000-140000]	...
2886	3487	73	6300	6373	Déc 07	6373	42 [30-60]	15000 [11000-21000]	14598
...	423	Sep 07	431 ³	18 [12-37]	2300 [1200-3700]	4787
239	95	15	319	334	Nov 07	343 ³	... ²	<500 [<200-<500]	476
...	35000 [20000-64000]	...
...	...	576	12781	13357	Déc 07	13357	15 (13-19)	87000 (69000-110000)	74060
...	6400 [3500-11000]	...
24 ⁷	21 ⁷	2	45	47	Déc 07	47	129
...	...	597	7215	7812	Déc 07	7812	37 [28-51]	21000 [15000-28000]	11113
2296	2932	307	4921	5228	Sep 07	5660 ⁵	27 [21-37]	21000 [15000-27000]	23250
321	569	41	849	890	Déc 07	890	20 [13-30]	4400 [2900-6600]	3171
894	1071	162	1803	1965	Déc 07	1965	45 [33-61]	4300 [3200-6000]	3240
6240	8274	439	...	14514	Déc 07	14514	41 [33-51]	36000 [29000-43000]	27738
...	...	751	4829	5580	Déc 07	5580	47 [29-71]	12000 [7900-19000]	9916
381	71	7	445	452	Déc 07	452	22 [13-38]	2000 [1200-3600]	...
73061 ⁸	40888 ⁸	8887 ⁸	114133 ⁸	158020	Déc 07	158020	... ⁹
...	...	19 ¹⁵	6600 ⁶	15 [8-28]	43000 [23000-84000]	...
697	132	21	808	829	Sep 07	945 ³	5 [4-7]	19000 [13000-26000]	8730
0	0	0	0	0	Déc 07	0
...	2400 [1200-6100]	...
...	...	336 ¹⁵	...	3637	Déc 07	3637	43 [32-60]	8500 [6000-11000]	6000
...	6300 [4600-7200]	...
42	11	4	49	53	Déc 07	53

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux

Pays (ou territoire)	2004		2005		2006	
	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)
Kazakhstan	7	<1 [$<1-5$]	240	23 [12-62]	326	23 [13-39]
Kenya	29000	6 [5-8]	65773	14 [12-19]	125026	27 [22-36]
Kiribati
Kirghizistan	46	... ²	47	23 ¹³
Republique démocratique populaire lao	104	... ²	104	... ²	479	94 [48->95]
Lettonie	202	25 [9-38]	235	19 [9-29]	301 ⁶	18 [10-27]
Liban	200	28 [11-54]	213	25 [10-46]
Lesotho	3000	4 [3-5]	8400	11 [9-14]	17667 ³	22 [18-29]
Libéria	397	5 [2-8]	796 ³	10 [4-14]
Jamahiriya arabe libyenne	100	...	450
Lituanie	37	55 ¹²	55	... ²	75 ⁵	79 ¹³
Luxembourg ²	312 ⁶	... ²
Madagascar	6	<1 [$<1-1$]	6	<1 [$<1-1$]	92 ³	3 [2-5]
Malawi	13183	5 [4-7]	29087	11 [9-14]	59980	21 [18-27]
Malaisie	2700	23 [16-33]	2700	19 [13-26]
Maldives ²	1 ⁶	... ²
Mali	808	4 [3-5]	7038	28 [22-38]	11508	42 [33-54]
Malte
Îles Marshall
Mauritanie	39	2 [1-4]	256	8 [5-15]
Maurice	120	...	120	18 [8-40]	243	24 [13-42]
Mexique	29000	45 [31-67]	30624	45 [31-64]	39295	54 [38-77]
Micronésie (Etats fédérés de)	0 ¹³
Moldova	120	8 ¹²	222	... ²	262	48 ¹³
Mongolie	2	13 ¹³
Monténégro	26	...
Maroc	465	13 [9-19]	880	22 [14-31]	1370	29 [20-42]
Mozambique	7000	3 [2-3]	19854	7 [5-9]	40891 ³	12 [10-16]
Myanmar	2000	3 [2-4]	3500	5 [3-7]	5295 ³	7 [5-10]
Namibie	9000	22 [17-28]	29200	62 [50-80]	33593	64 [52-81]
Nauru ²
Népal	75	<1 [$<1-1$]	75	<1 [$<1-1$]	541 ³	3 [2-4]
Pays-Bas	...	>95 ¹²
Nicaragua	33	3 [1-4]	163	13 [4-19]	387	26 [9-38]
Niger	609	5 [3-6]	1168	8 [6-11]
Nigéria	13000	2 [$<1-3$]	41224	6 [3-9]	95008	13 [8-19]
Oman	100	...	225
Pakistan	100	<1 [$<1-1$]	132	<1 [$<1-1$]	167 ³	<1 [$<1-1$]

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux									
2007									
Toute personne sous traitement				Total des personnes traitées par antirétroviraux déclaré par les pays	Mois et année de la valeur déclarée par le pays	Nombre de personnes traitées par antirétroviraux à fin 2007 ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Total des besoins estimé par la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ¹⁸	Total des besoins indiqué par le pays à l'UNGASS
Masculin	Féminin	Ensemble < 15 ans	Ensemble > 15 ans						
283	159	71	371	442	Déc 07	442	23 [14-36]	1900 [1200-3200]	1078
60200 ⁸	111800 ⁸	15090 ⁸	156910 ⁸	177000	Déc 07	177000	38 [31-48]	[370000-570000]	407000
...	5	Déc 07	5
67	20	26	61	87	Déc 07	87	14 [8-26]	610 [<500-1100]	345
427	273	36	664	700	Déc 07	700	>95 [59->95]	690 [<200-1200]	1182
...	323	May 07	323	15 [9-22]	2200 [1500-3400]	...
192	54	9	237	246	Déc 07	246	26 [11-45]	940 [550-2300]	432
7582	14128	1553	20157	21710	Déc 07	21710	26 [21-33]	85000 [66000-100000]	84791
...	...	92 ¹⁵	...	1414	Déc 07	1414 ⁶	17 [9-23]	8500 [6100-17000]	...
...	1000	Déc 07	1000 ⁶
81	17	1	97	98	Déc 07	98	18 [8-31]	550 [<500-1200]	131
... ²	<500 [<500-770]	...
...	138	Déc 07	138	4 [3-7]	3200 [2000-5400]	1206
51204 ^{8,11}	79284 ^{8,11}	10238 ^{8,11,14}	120250 ^{8,11}	100649	Déc 07	100649	35 [29-42]	290000 [240000-340000]	252720
...	...	500 ¹⁵	...	6590	Oct 07	6762 ³	35 [24-49]	20000 [14000-28000]	13080
...	1 ⁶	... ²	<100 [<100-<100]	...
4369	7803	579	11593	12172	Nov 07	12398 ³	41 [32-51]	30000 [24000-38000]	31198
...	65	Juin 07	65 ⁶	... ²	<500 [<500-640]	...
...	1	Déc 07	1
469	370	23	816	839	Déc 07	839	23 [13-40]	3600 [2100-6300]	1627
...	321	Déc 07	321	22 [14-32]	1500 [1000-2400]	1200
...	76000 [54000-110000]	...
...	1	Déc 07	1
261	203	19	445	464	Déc 07	464	58 [43-86]	800 [540-1100]	856
3	0	0	3	3	Déc 07	3	... ²	<100 [<100-<100]	26
...	...	1 ¹⁵
867	781	58	1590	1648	Déc 07	1648	31 [21-44]	5300 [3700-7900]	2230
32990	52832	6320	79502	85822	Nov 07	89592 ³	24 [20-31]	370000 [290000-460000]	294986
6634	4466	11100	Déc 07	11100	15 [11-20]	76000 [55000-100000]	...
13783	25939	5283	34439	52316	Déc 07	52316	88 [73->95]	59000 [48000-72000]	56239
...	0 ⁶
762	478	51	1189	1240	Sep 07	1432 ³	7 [5-11]	20000 [13000-30000]	19200
...	7919	Avr 07	7919 ⁶	61 [36->95]	13000 [7100-22000]	...
336	186	45	477	522	Déc 07	522	30 [11-43]	1700 [1200-4700]	1233
723	751	62 ¹⁴	1412	1474	Oct 07	1536 ³	10 [7-13]	16000 [12000-22000]	8929
40643 ^{8,10}	65429 ^{8,10}	15345 ^{8,10}	61381 ^{8,10}	145392	Sep 07	197000 ³	26 [17-36]	750000 [550000-1100000]	...
200	60	260	Déc 07	260 ⁶
415	135	21	529	550	Déc 07	550	3 [2-4]	20000 [13000-34000]	7400

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux

Pays (ou territoire)	2004		2005		2006	
	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)
Palaos	33 ¹³	2	...
Panama	2000	33 [25-44]	2765	43 [33-57]	2835	42 [32-54]
Papouasie-Nouvelle-Guinée	171	7 [6-9]	320	10 [9-12]	1098	26 [22-31]
Paraguay	300	10 [5-18]	640	18 [10-32]	1026 ³	25 [13-43]
Pérou	2000	12 [9-16]	6410	35 [26-47]	8424	42 [31-54]
Philippines	71	4 ¹²	170	24 [17-35]
Pologne	2000	35 [20-59]	2707	39 [22-66]	3072	38 [21-64]
Roumanie	6000	82 [70->95]	6116	77 [66->95]	6790	81 [69->95]
Fédération de Russie	3000	4 [2-7]	5000	5 [2-7]	14681	10 [6-15]
Rwanda	7000	10 [9-13]	19289	29 [24-36]	34636	52 [45-63]
Saint-Kitts-et-Nevis	24	...	32	...	39	...
Sainte Lucie	20	...	50	81 ¹³	50	...
Saint-Vincent-et-les Grenadines	32	...	64	>95 ¹³	80 ³	...
Samoa
Sao Tomé-et-Principe	17	...	51	...
Sénégal	1600	26 [18-38]	4200	54 [40-75]	5500	57 [44-75]
Serbie	317	11 [6-19]	580	19 [9-32]	608	18 [9-31]
Seychelles	43	...	43	...	82	...
Sierra Leone	210	2 [1-4]	1416	12 [7-19]
Slovaquie	65	95 ¹²	65	...	96 ⁶	...
Slovénie	147	...
Îles Salomon
Somalie	35	<1 [<1-1]	111	2 [1-4]
Afrique du Sud	55000	4 [3-6]	206718	15 [12-20]	324754 ³	21 [17-28]
Espagne	...	92 ¹²	77500 ⁶	...
Sri Lanka	25	4 [3-6]	25	4 [3-5]	69	10 [7-14]
Soudan	400	<1 [<1-<1]	400	<1 [<1-<1]	... ¹⁷	...
Suriname	220	25 [12-63]	391	36 [20-70]	460	35 [22-60]
Swaziland	6000	14 [12-17]	13006	27 [23-34]	18493 ³	35 [30-42]
Suède	...	95 ¹²	2800	74 ¹³
République arabe syrienne	468	...	60
Tadjikistan	...	0 ¹²	5	<1 [<1-7]	37	4 [2-10]
Thaïlande	50000	21 [15-30]	81158	34 [26-47]	112196 ³	46 [35-62]
Ex-République yougoslave de Macédoine	2	20 ¹²	7	...	11	...
Togo	2000	6 [4-8]	6545	18 [14-23]	6993	18 [14-23]
Trinité-et-Tobago	1000	28 [19-43]	1700	46 [30-70]	2113	53 [36-78]
Tunisie	229	31 [21-45]	298	33 [23-46]
Turquie	250	...	344	...	685	...

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux									
2007									
Toute personne sous traitement				Total des personnes traitées par antirétroviraux déclaré par les pays	Mois et année de la valeur déclarée par le pays	Nombre de personnes traitées par antirétroviraux à fin 2007 ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Total des besoins estimé par la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ¹⁸	Total des besoins indiqué par le pays à l'UNGASS
Masculin	Féminin	Ensemble < 15 ans	Ensemble > 15 ans						
1	2	0	3	3	Déc 07	3	3
...	...	167	...	3994	Déc 07	3994	56 [43-71]	7200 [5600-9300]	6500
1037	1213	185	2065	2250	Déc 07	2250	38 [33-45]	5900 [5000-6800]	6348
678 ⁷	271 ⁷	104	949	1053	Nov 07	1056 ³	22 [12-37]	4800 [2900-8800]	3066
...	...	322 ¹⁰	7721 ¹⁰	10860	Déc 07	10860 ⁶	48 [36-62]	23000 [17000-30000]	...
134	202	4	332	336	Déc 07	336	31 [22-45]	1100 [740-1500]	600
2 392	990	118	3264	3382	Déc 07	3382 ⁶	36 [20-62]	9300 [5500-17000]	4390
3231 ¹⁰	3187 ¹⁰	196	6304	6500	Déc 07	6500	73 [62->95]	8900 [5400-10000]	6418
...	31094	Déc 07	31094	16 [10-25]	190000 [120000-300000]	33365
17980 ⁸	30089 ⁸	4350 ⁸	43719 ⁸	48069	Déc 07	48569	71 [62-84]	68000 [58000-78000]	...
...	53 ⁶
40	32	2	70	72	Sep 07	78 ³	384
...	104 ⁶
...	6	Déc 07	6 ⁶
27	47	2	72	74	Déc 07	74	300
2220	4479	384	6315	6699	Déc 07	6699	56 [44-70]	12000 [9600-15000]	10465
...	628	May 07	628	17 [8-30]	3700 [2100-7700]	...
...	94	20 [13-30]
...	2649	Déc 07	2649	...	13000 [9000-20000]	596
79 ¹⁰	17 ¹⁰	0	98	98	Juin 07	98
...	157	Juil 07	157
...	3	Déc 07	3 ⁶
86	125	5	206	211	Déc 07	211	3 [2-6]	6300 [3500-11000]	5284
73882 ^{8,16}	130401 ^{8,16}	32060 ^{8,10}	339671 ^{8,10}	428951	Sep 07	458951 ³	28 [22-36]	1700000 [1300000-2100000]	889000
...	100000 [54000-170000]	...
...	107	Déc 07	107	14 [10-20]	780 [540-1100]	776
...	Déc 07	... ¹⁷	1 [1-2]	87000 [58000-120000]	...
...	...	58 ¹⁰	650 ¹⁰	729	Déc 07	729	46 [30-74]	1600 [980-2400]	...
7702	12908	2123	22412	24535	Déc 07	24535	42 [36-50]	59000 [49000-68000]	58249
...	4500 [2500-8100]	784
57	18	4	71	75	Déc 07	75 ⁶
57	29	4	82	86	Déc 07	86	6 [4-11]	1300 [750-2400]	79
...	...	6687 ⁸	126852 ⁸	143539	Sep 07	152974 ³	61 [47-81]	250000 [190000-320000]	252387
4	11	1	14	15	Déc 07	15
2793	5187	559	7421	7980	Déc 07	7980	19 [15-24]	41000 [33000-52000]	26232
...	2592	Déc 07	2592	58 [41-82]	4500 [3100-6300]	...
...	1000 [760-1500]	...
...	...	9 ¹⁵

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux						
Pays (ou territoire)	2004		2005		2006	
	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ¹	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Toute personne sous traitement ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)
Ouganda	44000	12 [9-15]	74869	21 [16-26]	96294 ³	27 [22-33]
Ukraine	1000	2 [2-3]	3450	5 [4-7]	4777	6 [5-8]
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	...	92 ¹²	36000 ⁵	>95 ¹³
République-Unie de Tanzanie	3000	<1 [<1-<1]	21543	5 [4-6]	60342	14 [12-18]
Etats-Unis d'Amérique	70 ¹³
Uruguay	900	48 [8->95]	1427	64 [14->95]	1495 ⁶	55 [17->95]
Ouzbékistan	259 ⁶	30 [12-66]
Vanuatu	2 ⁶	...
Venezuela (République bolivarienne du)	9000	45 [8-79]	15417	64 [14->95]	...	53 [16-88]
Viet Nam	300	<1 [<1-1]	3000	6 [4-10]	8310	14 [9-23]
Yémen	0 ⁶	...
Zambie	20000	7 [6-9]	48585	16 [13-20]	82030	26 [22-32]
Zimbabwe	8000	1 [1-2]	24500	4 [3-5]	66920	11 [9-15]

¹ Les valeurs pour 2004 et 2005 sont celles qui ont été déclarées à l'OMS, sauf indication contraire. Dans certains cas, lorsque des données pour 2005 n'étaient pas disponibles, les valeurs pour 2004 ont été utilisées.

² Les chiffres de couverture ne sont pas calculés pour les pays dont le besoin est estimé à moins de 500.

³ Valeur projetée à décembre (voir notes de l'annexe concernant les méthodes).

⁴ Valeurs harmonisées par l'ONUSIDA, l'OMS et l'UNICEF au cours de consultations avec les pays, sauf indication contraire.

⁵ Le pays a déclaré une valeur différente à l'ONUSIDA : Angola = 7941 ; Bosnie-Herzégovine = 33 ; Brésil = 184252 ; Croatie = 73 ; Lituanie = 84 ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord = 324000.

⁶ Aucune donnée reçue par l'ONUSIDA ; les valeurs ont été fournies par l'OMS. Les valeurs sont données à la fin décembre, à l'exception des pays suivants pour 2006 : Albanie = Oct. ; Algérie = Nov. ; Belgique = Avr. ; Canada = Sept. ; Finlande = Août ; Iraq = Juin ; Jordanie = Sept. ; Uruguay = Sept. ; Vanuatu = Oct. ; Yémen = Sept.

⁷ Les données concernent les adultes uniquement.

⁸ Les valeurs 2007 ventilées selon l'âge et le sexe ne comprennent pas les données du secteur privé.

⁹ Au moment de mettre sous presse, les estimations épidémiologiques étaient en train d'être examinées.

¹⁰ Les données non ventilées peuvent ne pas correspondre au total déclaré car les informations relatives au sexe et à l'âge peuvent manquer pour certains patients. Il est à noter que cela peut ne pas représenter exactement la distribution nationale selon l'âge et le sexe pour le traitement antirétroviral, car les données manquantes peuvent ne pas être réparties de façon homogène entre le sexe et l'âge.

¹¹ Valeur cumulative déclarée par pays, ne tenant pas compte des personnes perdues de vue, n'ayant pas fait l'objet d'un suivi ou décédées.

¹² Source différente : valeur pour 2003 déclarée à l'ONUSIDA pour le rapport UNGASS 2004.

¹³ Source différente : valeur déclarée à l'ONUSIDA seulement.

¹⁴ La valeur déclarée à l'UNICEF diffère de celle déclarée par le pays.

¹⁵ Valeur déclarée à l'UNICEF pour décembre, à l'exception de la Jamaïque et du Libéria, dont les valeurs ont été déclarées pour septembre.

¹⁶ Pour l'Afrique du Sud, la valeur du pays pour les hommes est de 167278 et pour les femmes de 204452.

¹⁷ Les données ont été déclarées séparément pour le Nord Soudan et le Sud Soudan : Nord Soudan Déc. 2006 = 807, Déc. 2007 = 775 ; Sud Soudan Déc. 2006 = 161, Sept. 2007 = 303.

¹⁸ Les estimations sont données en chiffres arrondis. Toutefois, des chiffres non arrondis ont été utilisés pour le calcul des taux de couverture, des totaux mondiaux et régionaux ; c'est la raison pour laquelle il peut y avoir de faibles écarts entre les chiffres présentés ici et ceux qui ont été calculés à l'aide de chiffres non arrondis.

Indicateur UNGASS 4. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par antirétroviraux									
2007									
Toute personne sous traitement				Total des personnes traitées par antirétroviraux déclaré par les pays	Mois et année de la valeur déclarée par le pays	Nombre de personnes traitées par antirétroviraux à fin 2007 ⁴	Pourcentage de personnes atteintes d'une infection à VIH avancée et traitées par antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut)	Total des besoins estimé par la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ¹⁸	Total des besoins indiqué par le pays à l'UNGASS
Masculin	Féminin	Ensemble < 15 ans	Ensemble > 15 ans						
30 943 ¹⁰	52606 ¹⁰	8532	102700	111232	Sep 07	115348 ³	33 [27-40]	350000 [290000-430000]	312000
4111	3546	908	6749	7657	Déc 07	7657	8 [7-11]	91000 [69000-120000]	21770
...	35000 [20000-58000]	...
30100 ¹⁰	53346 ¹⁰	11176	124520	135696	Déc 07	135696	31 [26-38]	440000 [360000-530000]	1867918
...	780000 [440000-1300000]	...
...	1776	Déc 07	1776	56 [23->95]	3100 [1700-7800]	1970
...	...	225 ¹⁵	319 ⁶	24 [9-51]	1400 [630-3500]	...
...	2	Déc 07	2 ⁶
...	15417 ⁶	44 [17-75]	35000 [21000-89000]	...
6872 ¹⁰	2118 ¹⁰	789	14180	14969	Sep 07	17354 ³	26 [17-42]	67000 [41000-110000]	49960
69	38	1	106	107	Déc 07	107 ⁶
65648 ⁸	83551 ⁸	11602 ⁸	137597 ⁸	149199	Déc 07	151199	46 [40-56]	330000 [270000-380000]	370000
32377 ^{8,10}	52837 ^{8,10}	8237 ^{8,10}	77479 ^{8,10}	97692	Déc 07	97692	18 [15-23]	570000 [440000-690000]	260000

Indicateur UNGASS 5. Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant

Pays (ou territoire)	2004		2005		2006
	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹
Afghanistan	0
Algérie	18 ⁵
Angola	2 [2-3]	1923
Antigua-et-Barbuda	50 ⁵	4 ^{3,5}
Argentine	...	55 ⁴	...	[94->95]	2120
Arménie	...	3 ⁴	5
Australie
Azerbaïdjan	1
Bahamas	95 ⁵
Bangladesh	5
Barbade	90 ⁵	37
Bélarus	119	[83->95]	158
Belize	...	70 ⁴	38	[18-47]	57
Bénin	1214	27 [23-31]	2378
Bhoutan	3
Bolivie	27 ⁵
Bosnie-Herzégovine	0 ⁵
Botswana	10508	89 [82->95]	7543	64 [59-70]	12994
Brésil	7233	[60->95]	6771	[56->95]	6510
Bulgarie	1 ⁵
Burkina Faso	398	5 [4-6]	937	11 [9-13]	1615
Burundi	374	4 [3-6]	524	6 [5-9]	1112 ³
Cambodge	159	[6-9]	228	[10-15]	312
Cameroun	4200	11 [10-13]	3592	10 [9-12]	7588 ³
Cap-Vert	12	...	43 ³
République centrafricaine	243	2 [2-3]	803	7 [7-8]	1943
Tchad	193	1 [<1-2]	254 ³
Chili	139 ⁵
Chine	118	[1-3]	135	[1-3]	650
Colombie	112 ³
Comores	0
Congo	312	7 [6-8]	1093	23 [20-28]	325
Costa Rica	21 ³
Côte d'Ivoire	2543	8 [7-9]	2773
Croatie	3 ⁵
Cuba	34 ⁵
République tchèque	15
République démocratique du Congo	846	2 [2-3]	1725	5 [4-6]	3422 ³
Djibouti	49	6 [5-8]	16	2 [2-3]	52 ⁵
Dominique	>95 ⁵	1 ⁵

Indicateur UNGASS 5. Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant						
2006		2007				
Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Bas	Haut	Nombre total de femmes enceintes séropositives au VIH, estimé au moyen de la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ¹³	Nombre total de femmes enceintes séropositives au VIH tel que déclaré à l'ONUSIDA ¹²
...	0
[3-12]	19	[3-12]	<200	660	... [<200-660]	0
11 [9-14]	1645	9 [7-13]	13000	22000	18000 [13000-22000]	22332
83 ⁵	4 ⁷	5
[94->95]	2193	[93->95]	1200	2400	... [1200-2400]	2530
[16-38]	6	[19-45]	<100	<100	... [<100-<100]	6
...	28	...	<100	<100	... [<100-<100]	33
<1-4]	6	[4-17]	<100	<200	... [<100-<200]	...
>95 [86->95]	77 ⁷	>95 [68->95]	<100	<200	<100 [<100-<200]	76
[1-5]	<200	<500	... [<200-<500]	...
[>95->95]	20	[73->95]	<100	<100	... [<100-<100]	21
[>95->95]	127	[90->95]	<100	<200	... [<100-<200]	144
[26-69]	55	[24-64]	<100	<500	... [<100-<500]	57
53 [45-61]	1830	40 [35-47]	3900	5300	4500 [3900-5300]	1158
[44->95]	...	-	<100	<100	... [<100-<100]	...
[11-20]	34 ⁵	[12-13]	<200	<500	... [<200-<500]	763
0 ⁵	0 ⁵	1
>95 [>95->95]	12419	>95 [>95->95]	10000	12000	11000 [10000-12000]	...
[55->95]	6188	[49->95]	5600	13000	... [5600-13000]	12535
...	1 ⁵
19 [16-23]	1480	18 [15-22]	6800	10000	8300 [6800-10000]	18495
14 [10-20]	1102	14 [11-22]	5100	10000	7800 [5100-10000]	18010
[14-22]	505	[25-41]	1200	2000	... [1200-2000]	4509
22 [18-30]	7516 ⁷	22 [18-34]	22000	42000	34000 [22000-42000]	67875
31 ⁵	51	99
18 [16-20]	3714 ⁷	34 [30-38]	9800	12000	11000 [9800-12000]	36093
1 [1-2]	...	1 [1-2]	10000	22000	18000 [10000-22000]	...
[28-57]	117	[12-23]	<500	500	... [<500-500]	117
[6-15]	593	[6-14]	4300	11000	... [4300-11000]	787
[3-7]	144	[4-9]	1600	3700	... [1600-3700]	184
0	0	0	<100	<100	... [<100-<100]	4
7 [6-9]	240 ⁸	5 [4-7]	3400	5400	4400 [3400-5400]	1617
[9-27]	...	[9-25]	<100	<500	... [<100-<500]	37
9 [8-11]	3240 ⁷	12 [9-16]	21000	34000	28000 [21000-34000]	21977
>95 ⁵	2	3
[33->95]	41	[37->95]	<100	<200	... [<100-<200]	35
[84->95]	<100	<100	... [<100-<100]	...
9 [8-11]	3435	9 [8-10]	33000	46000	38000 [33000-46000]	68865
...	610	1000	820 [610-1000]	...
>95 ⁵	1	1

Indicateur UNGASS 5. Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant

Pays (ou territoire)	2004		2005		2006
	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹
République dominicaine	968	[38-61]	676	[27-43]	738
Equateur	223	[30-94]	213 ³
Egypte
El Salvador	144	[11-36]	193 ³
Guinée équatoriale	103 ⁵
Erythrée	61	3 [2-4]	88	4 [3-5]	75
Estonie
Ethiopie	1390	2 [2-2]	2341	4 [3-4]	2330
Fidji	25 ⁵	5
Gabon	90	4 [3-5]	89
Gambie	87	[11-37]	103
Géorgie	7	[47->95]	15	[7-21]	15 ³
Allemagne	80 ⁵	225 ⁵
Ghana	196	1 [1-1]	1078	7 [7-8]	1239
Grèce	18 ⁵
Grenade	5 ⁵
Guatemala	11	[<1-<1]	111	[1-3]	167 ³
Guinée	146	3 [2-3]	77	1 [1-2]	486
Guinée-Bissau	20 ⁵	195 ³
Guyana	73	[14-42]	112	[22-74]	144
Haïti	620	13 [11-16]	800	17 [14-20]	991
Honduras	198	[18-54]	200
Hongrie	0 ⁵
Inde	4289	[4-7]	2279	[2-4]	7007 ³
Indonésie	15	[<1-2]	4	[<1-<1]	40 ⁵
Iran (République islamique d')	19 ⁵
Jamaïque	323	[52->95]	300	[48->95]	371 ³
Japon	29 ⁵
Jordanie	0
Kazakhstan	37	[19-66]	47	[16-69]	80 ³
Kenya	21069	25 [22-29]	19403	24 [21-28]	37130
Kirghizistan	9
Republique démocratique populaire lao	2	[2-17]	11	[9-30]	24 ⁵
Lettonie	37 ⁵
Lesotho	821	6 [6-7]	1811	14 [13-16]	2005 ³
Libéria	3	<1 [<1-<1]	130	5 [4-6]	76
Lituanie	1	[3-13]	2 ⁵
Madagascar	8	[1-3]	7 ³
Malawi	2719	4 [3-4]	5076	7 [6-8]	9231
Malaisie	141	[9-21]	170

Indicateur UNGASS 5. Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant						
2006	2007					
Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Bas	Haut	Nombre total de femmes enceintes séropositives au VIH, estimé au moyen de la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ³	Nombre total de femmes enceintes séropositives au VIH tel que déclaré à l'ONUSIDA ¹²
[32-54]	795	[36-65]	1200	2200	... [1200-2200]	1649
[28-87]	268	[34->95]	<500	800	... [<500-800]	347
...	5	[2-2]	<200	<500	... [<200-<500]	...
[17-48]	130	[12-32]	<500	1100	... [<500-1100]	130
14 [11-20]	-	...	530	940	710 [530-940]	...
3 [2-5]	168 ⁷	7 [4-11]	1600	4000	2500 [1600-4000]	3578
...	<100	<200	<100 [<100-<200]	...
4 [3-4]	4888	7 [7-8]	58000	74000	66000 [58000-74000]	75420
[60-76]	7	[82->95]	<100	<100	... [<100-<100]	7
4 [3-5]	494	21 [14-32]	1600	3500	2300 [1600-3500]	2570
[13-44]	133 ⁷	[17-58]	<500	800	... [<500-800]	709
[40->95]	22	[41->95]	<100	<100	... [<100-<100]	25
[40->95]	<200	590	... [<200-590]	...
9 [8-10]	2896	21 [18-24]	12000	16000	14000 [12000-16000]	19918
[14-45]	21	[16-69]	<100	<200	... [<100-<200]	21
50 ⁵	7	10
[2-5]	373	[5-12]	3200	8100	... [3200-8100]	2270
8 [6-10]	679 ⁷	11 [8-14]	5000	8600	6200 [5000-8600]	1722
13 [9-19]	349	24 [17-34]	1000	2100	1500 [1000-2100]	3716
[29->95]	<200	<500	... [<200-<500]	...
20 [17-24]	1107 ⁹	22 [18-26]	4200	6100	5100 [4200-6100]	5224
[18-64]	220	[19-79]	<500	1200	... [<500-1200]	...
0 ⁵	1	[2-8]	<100	<100	... [<100-<100]	1
[8-16]	8816	[10-24]	37000	92000	... [37000-92000]	86121
<1-2]	89	[2-4]	2100	5300	... [2100-5300]	...
[1-2]	22	[1-2]	940	1800	... [940-1800]	220
[58->95]	292 ⁷	[45->95]	<500	640	... [<500-640]	171
[49-62]	<100	<100	... [<100-<100]	...
...	2 ¹⁰	0
[23->95]	126	[30->95]	<100	<500	... [<100-<500]	210
48 [42-56]	52858 ⁷	69 [61-80]	66000	86000	76000 [66000-86000]	105000
[8-27]	3	[2-8]	<100	<200	... [<100-<200]	197
[14-42]	24	[9-36]	<100	<500	... [<100-<500]	235
[34-78]	37	[33-75]	<100	<200	... [<100-<200]	38
16 [15-18]	3966	32 [29-36]	11000	14000	12000 [11000-14000]	12750
3 [2-3]	224	7 [6-9]	2400	3900	3100 [2400-3900]	...
[6-25]	9	[27->95]	<100	<100	... [<100-<100]	10
[1-3]	25	[3-9]	<500	760	... [<500-760]	1521
13 [11-15]	23158	32 [28-36]	64000	82000	73000 [64000-82000]	71847
[9-23]	183	[9-24]	770	2000	... [770-2000]	158

Indicateur UNGASS 5. Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant

Pays (ou territoire)	2004		2005		2006
	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹
Mali	87	[1-1]	415	[4-6]	656
Mauritanie	10	[1-4]	12 ³
Maurice	...	>95 ⁴	23 ⁵
Mexique	146 ³
Moldova	31	[56->95]	32	...	62
Mongolie	1
Monténégro	0
Maroc
Mozambique	3117	3 [3-4]	8490	9 [8-11]	12150
Myanmar	274	[4-8]	629	[9-18]	993
Namibie	1126	12 [10-14]	4055	43 [36-52]	6022 ³
Népal	35
Nouvelle-Zélande	8 ⁵
Nicaragua	29	[11-31]	26
Niger	0	0	57	[1-3]	214 ³
Nigéria	1050	<1 [<1-<1]	532	<1 [<1-<1]	6168 ³
Pakistan	8
Panama	153 ⁵
Papouasie-Nouvelle-Guinée	46	5 [5-6]	46	4 [4-4]	31
Paraguay	47	[6-20]	73 ³
Pérou	161	[10-20]	188	[11-22]	560 ³
Philippines	2 ⁵
Pologne	62 ³
Roumanie	21	[6-11]	...	<1 ⁵	75
Fédération de Russie	5601	[55->95]	5709	[54->95]	6224 ³
Rwanda	4141	35 [31-40]	5782	51 [45-58]	7768
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie	20 ⁵	3 ⁵
Saint-Vincent-et-les Grenadines	62 ⁵	17 ⁵
Sao Tomé-et-Principe	2	...	8	...	11 ⁵
Sénégal	57	[1-2]	212 ⁵
Serbie	5	[4-15]	6	[5-17]	2
Seychelles	>95 ⁵	5 ⁵
Sierra Leone	17	<1 [<1-<1]	57	1 [1-2]	354
Singapour
Somalie	3 ⁵	5
Afrique du Sud	32541	15 [13-17]	75077	34 [29-40]	111357 ³
Sri Lanka	1 ³
Suriname	33	[22-67]	35
Swaziland	592	5 [4-5]	4780	36 [33-40]	8221

Indicateur UNGASS 5. Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant						
2006	2007					
Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Bas	Haut	Nombre total de femmes enceintes séropositives au VIH, estimé au moyen de la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ³	Nombre total de femmes enceintes séropositives au VIH tel que déclaré à l'ONUSIDA ¹²
[6-10]	1018	[10-15]	6800	11000	... [6800-11000]	8570
[2-5]	45	[6-20]	<500	770	... [<500-770]	800
[8-28]	19	[6-23]	<100	<500	... [<100-<500]	60
[3-7]	2000	4900	... [2000-4900]	...
[50->95]	73	[51->95]	<100	<200	... [<100-<200]	86
[10-56]	0	0	<100	<100	... [<100-<100]	13
...	1
...	42	[8-18]	<500	550	... [<500-550]	544
13 [11-15]	44975	46 [39-56]	81000	120000	97000 [81000-120000]	150995
[14-31]	1280	[18-43]	2900	7100	... [2900-7100]	...
65 [54-79]	...	64 [53-80]	7600	11000	9400 [7600-11000]	...
[2-4]	36	[2-4]	990	2300	... [990-2300]	1800
[57->95]	9 ⁵	[61->95]	<100	<100	... [<100-<100]	...
[9-27]	43	[15-44]	<100	<500	... [<100-<500]	174
[5-10]	1006 ⁷	[20-47]	2100	5000	... [2100-5000]	6710
3 [3-5]	12278	7 [5-10]	130000	240000	190000 [130000-240000]	...
<1-<1]	5	<1-<1]	1500	3700	... [1500-3700]	...
[32-65]	71 ⁷	[14-29]	<500	510	... [<500-510]	377
2 [2-2]	84	4 [4-5]	1800	2100	1900 [1800-2100]	3621
[9-30]	141 ⁷	[17-57]	<500	830	... [<500-830]	374
[33-64]	502	[28-56]	890	1800	... [890-1800]	...
[1-2]	1	<1-<1]	<200	<500	... [<200-<500]	2
[26-87]	63	[26-85]	<100	<500	... [<100-<500]	63
[23-45]	68	[22-42]	<200	<500	... [<200-<500]	70
[57->95]	6419	[59->95]	4500	11000	... [4500-11000]	...
71 [62-81]	6485 ⁷	60 [51-71]	9100	13000	11000 [9100-13000]	...
>95 ⁵
64 ⁵	11	14
85 ⁵
9 ⁵	22	90
[4-8] ⁵	264	[4-9]	3000	6300	... [3000-6300]	385
[2-6]	...	[2-5]	<100	<200	... [<100-<200]	...
>95 ⁵
8 [6-11]	919	21 [15-29]	3100	6200	4400 [3100-6200]	520
...	12 ⁷	[24-72]	<100	<100	... [<100-<100]	...
[0-1]	11	[1-2]	510	1700	... [510-1700]	2865
50 [43-60]	127164 ⁷	57 [49-69]	180000	260000	220000 [180000-260000]	290000
[1-3]	1	[1-3]	<100	<100	... [<100-<100]	55
[20-61]	...	[18-57]	<100	<200	... [<100-<200]	...
62 [57-69]	8772	67 [60-74]	12000	15000	13000 [12000-15000]	13178

Indicateur UNGASS 5. Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant

Pays (ou territoire)	2004		2005		2006
	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹
Suède	31 ⁵
Tadjikistan	4	[1-7]	4
Thaïlande	5020	[34-68]	5081	[34-71]	4305 ³
Timor-Leste
Togo	180	2 [2-3]	720	9 [7-11]	910
Trinité-et-Tobago	71 ⁵	173 ⁵
Tunisie	0
Turquie	4
Ouganda	7907	9 [8-10]	12073	15 [13-17]	19991
Ukraine	2817	[53-91]	2168	[36-63]	2517
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	1065 ⁵
République-Unie de Tanzanie	1800	2 [2-2]	6202	6 [6-7]	14758
Uruguay	...	>95 ⁴	...	19 ⁵	53
Ouzbékistan
Venezuela (République bolivarienne du)	310
Viet Nam	368	[6-16]	1385
Yémen
Zambie	12983	18 [16-20]	14071	19 [17-22]	25578
Zimbabwe	5534	8 [7-8]	8461	13 [12-14]	10127

¹ Valeurs fournies par l'UNICEF, sauf indication contraire. Les données concernent une période de 12 mois, sauf indication contraire.

² Toutes les valeurs sont arrondies à l'entier le plus proche. Des fourchettes sont indiquées pour les pays à épidémies de faible ampleur et concentrées.

³ Cette valeur diffère de celle qui a été signalée à l'ONUSIDA en 2008.

⁴ La valeur 2003 a été utilisée pour représenter 2004, telle que signalée par le pays à l'ONUSIDA pour l'UNGASS 2004.

⁵ Valeur signalée à l'ONUSIDA.

⁶ Toutes les données reflètent des valeurs représentant une période de 12 mois s'achevant en décembre 2007 qui ont été, sauf indication contraire, harmonisées entre le pays faisant rapport et l'ONUSIDA/OMS/UNICEF.

⁷ Les données ne représentant pas une période de 12 mois ont été projetées pour créer une valeur de 12 mois (voir notes pour la méthode utilisée). Les valeurs signalées sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Pays pour lesquels on a projeté les nombres de femmes enceintes infectées par le VIH ayant reçu des antirétroviraux pour la PTME		
Pays	Date et mois de la valeur déclarée	Valeur déclarée
Cameroun	Jan 07–Oct 07	6 263
République centrafricaine	Jan 07–Juin 07	1 857
Côte d'Ivoire	Jan 07–Juil 07	1 890
Erythrée	Jan 07–Oct 07	140
Gambie	Jan 07–Sep 07	100
Guinée	Jan 07–Sep 07	509
Jamaïque	Jan 07–Juin 07	146
Kenya	Jan 07–Juin 07	26 429
Myanmar	Jan 07–Oct 07	1 067
Niger	Jan 07–Juin 07	503
Panama	Jan 07–Sep 07	53
Paraguay	Jan 07–Nov 07	129
Rwanda	Jan 07–Nov 07	5 945
Afrique du Sud	Jan 07–Sep 07	95 373
Suède	Jan 07–Sep 07	23

Indicateur UNGASS 5. Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l'on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant						
2006	2007					
Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Nombre de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux ¹	Pourcentage de femmes enceintes séropositives au VIH recevant des antirétroviraux, en utilisant la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ²	Bas	Haut	Nombre total de femmes enceintes séropositives au VIH, estimé au moyen de la méthode OMS/ONUSIDA (Bas-Haut) ¹³	Nombre total de femmes enceintes séropositives au VIH tel que déclaré à l'ONUSIDA ¹²
[21-66]	317 ¹¹	[21-63]	<100	<200	... [<100-<200]	31
[1-6]	9	[2-11]	<100	<500	... [<100-<500]	438
[29-63]	9352	[62->95]	6400	15000	... [6400-15000]	6196
...	2
11 [9-14]	705	9 [7-11]	6300	10000	8000 [6300-10000]	10329
[47->95]	137	[37-78]	<200	<500	... [<200-<500]	...
0	1	[1-3]	<100	<100	... [<100-<100]	...
>95
25 [22-28]	26484	34 [29-39]	68000	92000	78000 [68000-92000]	91000
[40-69]	3046	[45-79]	3800	6700	... [3800-6700]	3293
[76->95]	48 ⁹	[3-14]	<500	1600	... [<500-1600]	487
15 [14-16]	31863	32 [29-35]	91000	110000	100000 [91000-110000]	114800
[22-79]	...	[20-76]	<100	<500	... [<100-<500]	...
[3-19]	95	[11-68]	<200	830	... [<200-830]	...
[8-25]	...	[7-24]	1300	4600	... [1300-4600]	...
[22-60]	744	[12-31]	2400	6400	... [2400-6400]	5352
...	2
35 [31-39]	35314	47 [41-52]	68000	86000	76000 [68000-86000]	90252
17 [16-19]	15381	29 [27-32]	48000	57000	52000 [48000-57000]	16769

⁸ Le pays indique 274 pour jan-déc 2007.

⁹ Le pays indiquait 1066 pour jan-déc 2007.

¹⁰ Le pays indiquait 0 pour jan-déc 2007.

¹¹ Ne représente que Stockholm.

¹² Le besoin déclaré par les pays peut ne pas toujours représenter le nombre estimé de femmes enceintes séropositives au VIH. Dans certains cas, il peut se référer au nombre identifié de femmes enceintes séropositives au VIH ou à une autre définition non nécessairement représentative du chiffre correspondant au besoin national. Veuillez vous référer au rapport d'activité spécifique au pays pour de plus amples informations: <http://data.unaids.org/pub/Report/2008>

¹³ Les estimations sont données en chiffres arrondis. Toutefois, des chiffres non arrondis ont été utilisés pour le calcul des taux de couverture, des totaux mondiaux et régionaux; c'est la raison pour laquelle il peut y avoir de faibles écarts entre les chiffres présentés ici et ceux qui ont été calculés à l'aide de chiffres non arrondis.

Indicateur UNGASS 6. Pourcentage de cas estimés de tuberculose liés à une séropositivité concomitante auxquels ont été administrés un traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH

Pays (ou territoire)	2007	
	Adultes traités	Pourcentage de patients traités
Afghanistan	2	<1
Algérie ¹	82	87
Argentine	415	55
Arménie ¹	15	59
Azerbaïdjan	3	4
Bahamas	26	81
Barbade	2	100
Bélarus	136	72
Belize	9	69
Bénin	157	31
Bolivie	60	41
Bulgarie ²	32	
Burkina Faso	199	1
Cap-Vert	3	3
République centrafricaine	3671	15
Chine	901	13
Costa Rica	13	100
Côte d'Ivoire	994	10
Croatie	3	100
Cuba	46	90
Dominique	1	100
République dominicaine ¹	322	115
République démocratique du Congo	162	<1
Equateur	150	40
El Salvador	63	100
Ethiopie	2658	13
Fidji	2	40
Finlande	0	
Gabon	521	13
Géorgie	34	71
Grenade ²	0	
Guatemala	109	33
Guinée	245	61
Haïti	61	5
Honduras	383	71
Hongrie ³	7	<1
Inde	19400	23
Iran (République islamique d')	52	20
Jamaïque	18	72
Japon	10	83
Jordanie	0	
Kazakhstan	76	33
Lettonie	27	57

Indicateur UNGASS 6. Pourcentage de cas estimés de tuberculose liés à une séropositivité concomitante auxquels ont été administrés un traitement antituberculeux et un traitement contre le VIH

Pays (ou territoire)	2007	
	Adultes traités	Pourcentage de patients traités
Liban ¹	3	148
Lituanie	5	38
Malawi	18910	70
Malaisie	72	33
Mauritanie ^{1,4}	95	86
Maurice	3	16
Mexique	806	78
Maroc	88	73
Mozambique ¹	1008	4
Népal ¹	321	46
Nicaragua	13	14
Niger	197	1
Nigéria	28625	56
Panama	270	5
Papouasie-Nouvelle Guinée	320	35
Paraguay	20	14
Pérou	93	11
Philippines	99	49
Pologne ¹	70	176
Moldova	23	10
Fédération de Russie ^{1,4}	463	39
Saint-Kitts-et-Nevis	2	100
Sainte-Lucie	2	50
Sao Tomé-et-Principe ²	0	
Sénégal	319	15
Seychelles	11	100
Slovénie ²	0	
Somalie	14	2
Afrique du Sud ³	159382	50
Saint-Vincent-et-les Grenadines	4	100
Tadjikistan	6	8
Ex-République yougoslave de Macédoine ²	2	
Thaïlande ¹	2260	23
Togo ¹	44	2
Turquie ²	47	
Ukraine	411	15
République-Unie de Tanzanie	188	12
Uruguay	20	25
Viet Nam	390	15
Zambie	21103	35

¹ Estimation du dénominateur fournie par l'OMS (Rapport 2008 sur la lutte contre la tuberculose).

² Aucun dénominateur n'est disponible.

³ Le dénominateur correspond au nombre total de cas de tuberculose déclaré en 2007.

⁴ Pour la Mauritanie, données disponibles pour une période de deux ans seulement; ainsi l'indicateur pour 2007 suppose que les cas se sont propagés de manière homogène chaque année. Pour la Fédération de Russie, données déclarées pour quatre régions seulement – oblast d'Ulyanovskaya, oblast de Saratovskaya, oblast de Tverskaya, et Altayskiy Kray.

Indicateur UNGASS 7. Pourcentage d'hommes et de femmes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat

Pays (ou territoire)	Valeur déclarée par le pays							Enquête démographique et de santé la plus récente		
	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Sexes confondus				Année de l'enquête	Hommes	Femmes
		15-49	15-49	15-19	20-24	25-49	15-49		15-49	15-49
Afghanistan	2007									27
Algérie	2006	0	1	0	1 ¹	1	1			
Angola	2006	7	4							5
Antigua-et-Barbuda	2006									25
Argentine	2005		8	4	12					
Barbade	2006	97 ¹	99 ¹							99 ¹
Bélarus	2007	26	33	26	35	31	31			
Belgique		8	9		5	10	9			
Belize	2006	10	20							15
Bénin	2006	12	15	7	17	15	14	2006	5	7
Bolivie	2007	87 ¹	87 ¹	86 ¹	88 ¹	87 ¹	87 ¹			
Bosnie-Herzégovine	2006		0	0	0	0				
Burkina Faso	2007	18	23	15	28	27	21			
Burundi	2007	91 ¹	93 ¹	91 ¹	92 ¹	93 ¹	92 ¹			
Cambodge	2006	5	3	2	6	4	4	2005	5	3
Cameroun	2004	7	5	3	6	6	5	2004	7	5
Canada	2006									32
Cap-Vert	2005	10	10	3	13	13	10	2005	10	10
République centrafricaine	2006	15	17	10	19	17	16			
Tchad	2004	2	1	0	1	1	1	2004	2	1
Chili	2007	22	35	8	33	48	28			
Chine	2006	2	2				2			
Colombie	2007	11 ²	27 ²				19 ²			
Congo	2005	3	3	1	4	4	3	2005	3	3
Costa Rica	2007	8 ¹	7 ¹			80 ¹	12 ¹			
Côte d'Ivoire	2005	3	4	2	3	4	3	2005	3	4
Cuba	2006	28	32	17	32	32	30			
République démocratique du Congo	2007	4	4	2	5	5	4	2007	4	4
République dominicaine	2007	19	21	8	22	23	20	2007	19	21
Equateur	2007		11	7	13	12				
Erythrée	2007						6			
Ethiopie	2005	2	2				2	2005	2	2
Gabon	2007	50 ¹	64 ¹	33 ¹	54 ¹	62 ¹	59 ¹			
Gambie	2005	8	12				10			
Allemagne	2007	14	11				13			
Ghana	2006							2006	3	4
Grèce	2007	13	11	5	9	16	12			
Grenade	2006	6	13	3	19	10	10			
Guinée	2005	3	1	1	2	2	2	2005	3	1
Guinée-Bissau	2006		5							
Guyana	2005	10	11	7	17	11	11	2005	10	11
Haïti	2006	5	8	3	8	8	7	2005	5	8

Indicateur UNGASS 7. Pourcentage d'hommes et de femmes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat										
Pays (ou territoire)	Valeur déclarée par le pays							Enquête démographique et de santé la plus récente		
	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Sexes confondus				Année de l'enquête	Hommes	Femmes
		15-49	15-49	15-19	20-24	25-49	15-49		15-49	15-49
Honduras	2006	21 ¹	23 ¹					23 ¹		
Hongrie	2007	0	0					0		
Inde	2006	1	1	0	2	2	1	2006	1	1
Israël				16	14	14	15			
Jamaïque	2004	12	19			17	16			
Japon	2006							98 ¹		
Kazakhstan	2007	4	5	2	4	5	7			
Kenya	2003	8	7	4	9	7	14	2003	8	7
Lesotho	2005	5	6	2	7	8	6	2004	5	6
Lituanie	2007	24 ¹	20 ¹			24 ¹	24 ¹			
Madagascar	2004	1 ³	0 ³					2004	1	<1
Malawi	2007							11 ¹	2004	8
Malaisie	2007							75 ¹		
Mali	2006	3	7	2	4	3	5	2006	10	7
Îles Marshall	2006	56 ¹	67 ¹	67 ¹	50 ¹		60 ¹			
Mauritanie	2007	10	3					5		
Maurice	2004				3 ¹	2 ¹	2 ¹			
Mexique	2006							1 ¹		
Moldova	2007	6	11	3	10	10	8			
Monténégro	2006		3	1	4	3				
Maroc	2007	6 ¹	4 ¹	3 ¹	6 ¹		5 ¹			
Mozambique	2004	2	2	3	3	2	2	2003	3	2
Namibie	2007	18	29	9	26	27	23	2006	18	29
Nicaragua	2007		5	2	4	7	5			
Niger	2006	4	2	2	2	3	2			
Nigéria	2005	9	8	3	8	11	9			
Palaos	2006		16 ¹	27 ¹	20 ¹	14 ¹				
Philippines	2003	2						2003		1
Pologne	2007							1 ¹		
Fédération de Russie	2007	30 ¹	38 ¹	20 ¹	35 ¹	37 ¹	34 ¹			
Rwanda	2005	11	12	4	16	13	11	2005	11	12
Saint-Kitts-et-Nevis	2006					10 ¹	10 ¹			
Sainte-Lucie	2007	34 ¹	39 ¹				36 ¹			
Saint-Vincent-et-les Grenadines	2006	8	12	6	12	12	10			
Sénégal	2005	2	1	1	1	1	1	2005	1	2
Seychelles	2006	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹			
Sierra Leone	2007	8 ¹	9					9 ¹		
Singapour	2007	9	7	0	13	8	8			
Somalie	2004	5 ¹	3 ¹				4 ¹			
Afrique du Sud	2006	90 ¹	90 ¹	90 ¹	90 ¹	90 ¹	90 ¹			
Espagne	2003							25		

Indicateur UNGASS 7. Pourcentage d'hommes et de femmes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat

Pays (ou territoire)	Valeur déclarée par le pays							Enquête démographique et de santé la plus récente		
	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Sexes confondus				Année de l'enquête	Hommes	Femmes
		15-49	15-49	15-19	20-24	25-49	15-49		15-49	15-49
Sri Lanka	2007	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹			
Suriname	2006		30							
Swaziland	2007	9	22	6	18	21	16	2007	9	22
Suisse	2007	7	7	5	7	7	7			
Tadjikistan	2007	4 ¹	2 ¹	2 ¹	5 ¹		3 ¹			
Thaïlande	2006	16	22	16	22	19	19			
Ex-République yougoslave de Macédoine	2006		3	2	3	3				
Togo	2007	16	15	10	17	17	16			
Trinité-et-Tobago	2006						8 ¹			
Turquie	2006	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹			
Ouganda	2006	10	12				12	2006	10	12
Ukraine	2007	11 ¹	20 ¹	12 ¹	19 ¹	16 ¹	16 ¹			
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	2006	1 ¹	3 ¹				2 ¹			
République-Unie de Tanzanie	2007						36	2004	7	6
Uruguay	2007	20	19	15	20	20	20			
Viet Nam	2005	3	2	1	3	3	2	2005	3	2
Zambie	2007	12	19	10	19	17	15	2007	12	19
Zimbabwe	2006	7	7	4	9	7	7	2006	7	7

¹ Méthodologie non harmonisée avec les directives UNGASS.

² 14-26 ans.

³ 15-24 ans.

Indicateur UNGASS 8. Pourcentage des populations les plus à risque ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et en connaissant le résultat¹

UNGASS	Professionnel(le)s du sexe				Consommateurs de drogues injectables				Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	
	2005	2007			2005	2007			2005	2007
	Total	Total	Hommes	Femmes	Total	Total	Hommes	Femmes	Total	Total
Afghanistan		11 ⁵		11		6				
Algérie					15					
Angola		42 ⁵		42						
Argentine	36		38	65		47	43	62	96	98
Arménie	33	18 ⁵		18	21	23	23	13	42	5
Australie		63 ⁵		63		57 ⁴				50
Bahamas										61
Bangladesh	2 ⁵	6	8	5	3	3 ⁶	3			6
Barbade		73 ^{4,5}		73 ⁴						
Bélarus	49	63 ⁵		63	39	49	49	49	55	53
Belgique										62 ³
Bénin		30 ⁵		30						
Bolivie		78 ⁴	85 ⁴	78 ⁴						100 ⁴
Bosnie-Herzégovine		96 ^{2,4}				53 ⁶	53			10 ^{2,4}
Bulgarie		53 ⁵		53		38	36	52		29
Burkina Faso		94 ^{4,5}		94 ⁴						
Burundi	38	38 ^{2,5}		38 ²						
Cambodge		68 ⁵		68						58
Cameroun		32 ^{2,5}		32 ²						
Canada						59				43 ⁴
Chili										37
Chine		29 ⁵		29		41	40	45		33
Colombie		82	71	85						61
Congo	3								8	
Costa Rica										43
Cuba		36	38	32						33
Côte d'Ivoire		51 ⁵		51						57 ⁴
République démocratique du Congo		37 ^{2,5}		37 ²						
République dominicaine		64 ^{2,5}		64 ²						
Equateur				87 ⁴						50 ⁴
El Salvador		96 ⁵		96						55
Erythrée		78								
Estonie		52 ⁵		56		62	63	60		27 ⁴
Ethiopie		97 ⁵		97						
Gabon		54	33	55						
Géorgie	24	33 ⁵		33	6	9 ⁶	9		27	30 ²
Allemagne										18
Ghana		39								25
Grèce										39
Guatemala		93 ⁵		93						64

Indicateur UNGASS 8. Pourcentage des populations les plus à risque ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et en connaissant le résultat¹

UNGASS	Professionnel(le)s du sexe				Consommateurs de drogues injectables				Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	
	2005	2007			2005	2007			2005	2007
	Total	Total	Hommes	Femmes	Total	Total	Hommes	Femmes	Total	Total
Guinée		58 ⁵		58						
Guyana		64		64						44
Haïti		71								48
Honduras		71 ⁵		71						40
Hongrie						8				
Inde				34						
Indonésie	15	31	52	25	18	36	36	42	15	32
Iran (République islamique d')		20 ⁵		20	9	23	23	16		
Jamaïque	43	43 ⁵		43						
Japon										38
Kazakhstan		70 ⁵		70		42	41	49		38
Kenya		12 ²								40
Kirghizistan		53 ⁵		53		34	32	43		70
Republique démocratique populaire lao	9									5
Lettonie						61	62	60		
Liban		24 ⁴	11 ⁴	25 ⁴		4 ⁴	2 ⁴	50 ⁴		14 ⁴
Lituanie		50 ⁵		50		64	60	81		28
Madagascar		49 ⁵		49						
Malawi		69 ⁵		69						
Malaisie		100 ^{3,4}				100 ⁴				100
Mali		7								
Mauritanie		100 ^{4,5}		100 ⁴						15 ⁴
Maurice		30 ²				20 ²	24 ²	0 ²		16 ²
Mexique		72	63	76		31 ²	28 ²	48 ²		54
Moldova		31 ⁵		31		34	33	38		38
Mongolie	67	53 ⁵		53					23	60
Monténégro		73 ^{4,5}		73 ⁴						81 ⁴
Maroc		51 ⁵		51	13	13	13	11		
Népal		40	52	37		21 ⁶	21			30
Niger		38 ⁵		38						
Nigéria		38 ⁵		38		23	23	33		30
Pakistan		4	4	5			4 ⁴			
Panama	77	55	59	52					45	76
Papouasie-Nouvelle-Guinée		47 ⁵		47						42
Paraguay		100 ⁵	100	100		100	100	100		100
Pérou				54 ⁴						21
Philippines		12 ⁵		12		4	4	15		16
Pologne						<1				<1
Roumanie	36	35 ⁵		35	36	16 ⁴	17 ⁴	10 ⁴		47
Fédération de Russie		61 ⁵		61		46	44	50		32

Indicateur UNGASS 8. Pourcentage des populations les plus à risque ayant subi un test VIH dans les 12 derniers mois et en connaissant le résultat ¹										
UNGASS	Professionnel(le)s du sexe				Consommateurs de drogues injectables				Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	
	2005	2007			2005	2007			2005	2007
Pays (ou territoire)	Total	Total	Hommes	Femmes	Total	Total	Hommes	Femmes	Total	Total
Rwanda		65 ⁵		65						
Sainte-Lucie						100 ⁴	100 ⁴	100 ⁴		
Sao Tomé-et-Principe		72 ^{4,5}		72 ⁴						
Sénégal		70 ⁵		70					11	
Serbie									53	
Sierra Leone		79	75							
Singapore				100						47
Espagne		67 ^{2,4,5}				68 ^{2,4}	67 ^{2,4}	72 ^{2,4}		49 ³
Sri Lanka		43 ⁵		43						14
Suriname		62	75	59						
Swaziland		94 ^{4,5}		94 ⁴						
Suède		34 ⁴	100 ⁴	33 ⁴		84 ⁴	83 ⁴	86 ⁴		41
Suisse			38			60	59	61		31
Tadjikistan		29 ⁵		29		24	23	30		
Thaïlande		53	54	52						35
Ex-République yougoslave de Macédoine	67	47	87	39	32	44	42	53	7	56
Togo		40	22	89						
Tunisie				100 ⁴						35 ³
Turquie	26	97	100	97		8	11	0		31
Ukraine	32	46 ⁵		46	27	29	29	30	25	27
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord										17 ²
Ouzbékistan		19 ⁵		19		18	18	18		25
Viet Nam		15 ⁵		15		11 ⁶	11			16
Zambie		17	14	23						

¹ Le rapport date de 2007 mais la collecte des données peut varier de 2005 à 2007.

² La collecte des données a débuté avant 2005.

³ La période de collecte des données n'est pas définie.

⁴ Méthodologie non harmonisée avec les directives UNGASS 2008.

⁵ Femmes uniquement.

⁶ Hommes uniquement.

Indicateur UNGASS 9. Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes que les programmes de prévention du VIH parviennent à atteindre ¹							
UNGASS	2007						
Pays (ou territoire)	Professionnel(le)s du sexe			Consommateurs de drogues injectables			Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	
Afghanistan	11 ³	9 ³	11 ³				
Angola	17						
Argentine			82				98
Arménie	41 ⁴		41	54	55	44	10
Bahamas							48
Bangladesh	54	47	57	82	82	90	13
Bélarus	86 ⁴		86	56	54	61	90
Bénin	60 ⁴		60				
Bulgarie	77 ⁴		77	47	45	60	30
Burkina Faso	37	15	59				
Burundi	72 ^{2,4}		72 ²				
Cameroun	70 ^{2,4}		70 ²				
Chine	46 ⁴		46	25	25	25	38
Comores	59 ⁴		59				
Costa Rica							26
Cuba	60	59	65				56
Côte d'Ivoire							100 ³
Equateur			76				49
El Salvador	73						62
Erythrée	88 ^{3,4}		88 ³				
Estonie							56
Gabon	29	27	29				
Géorgie				17 ⁵	17		
Grèce							19
Guatemala	93 ⁴		93				75
Guinée	92 ⁴		92				
Guyana	28 ⁴		28				17
Honduras	23 ⁴		23				24
Indonésie	40	60	34	45	44	55	40
Jamaïque	60						
Kazakhstan	71 ³			44 ³			48 ³
Kirghizistan	89 ^{3,4}		89 ³	78 ³	78 ³	78 ³	77 ³
Lettonie				47	45	53	
Liban	<1 ³	11 ³	22 ³				15 ³
Lituanie	43 ⁴		43				40
Malawi	69		69				
Malaisie	86 ⁴						100 ³
Mexique	36	55	28	5	5	4	18
Moldova	96		96	89	89	89	86
Mongolie	64						67
Maroc	49 ⁴		49				
Népal	42	56	39	78 ⁵	78		47

Indicateur UNGASS 9. Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes que les programmes de prévention du VIH parviennent à atteindre¹

Pays (ou territoire)	2007						Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
	Professionnel(le)s du sexe			Consommateurs de drogues injectables			
	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	
Pakistan	3 ³	3 ³	2 ³		16 ³		
Panama	76	73	78				89
Papouasie-Nouvelle-Guinée	31 ⁴		31				10
Paraguay	18						
Pérou			80				44
Philippines	14 ⁴		14	14	13	28	19
Roumanie							59
Fédération de Russie	39			24	33	21	17
Sao Tomé-et-Principe	80 ^{3,4}		80 ³				
Sierra Leone	73 ⁴		73				
Singapour			100 ³				
Swaziland	77 ^{3,4}		77 ³				
Suède	50 ³	100 ³	55 ³	27	26	30	
Tadjikistan	60 ⁴		60	25	21	41	
Togo	76	75	81				
Turquie	42 ⁴		42		22	30	19
Ukraine	69 ⁴		69	46	45	50	50
Viet Nam	65 ^{3,4}		65 ³	43 ³	43 ³		26
Zambie	63 ^{2,4}		63 ²				

¹ Le rapport date de 2007 mais la collecte des données peut varier entre 2005 et 2007.

² La collecte des données a débuté avant 2005.

³ Méthodologie non harmonisée avec les directives UNGASS 2008.

⁴ Femmes uniquement.

⁵ Hommes uniquement.

Indicateur UNGASS 10. Pourcentage d'orphelins et d'enfants vulnérables âgés de 0 à 17 ans dont le foyer reçoit un soutien extérieur de base pour la prise en charge de l'enfant						
Pays (ou territoire)	2005		Valeur déclarée par le pays pour 2007		Enquête démographique et de santé la plus récente	
	Année de l'enquête	%	Année de l'enquête	%	Année de l'enquête	%
Bénin			2006	69 ¹		
Botswana	2004	34				
Burkina Faso			2007	5 ¹		
Burundi			2006	50 ¹		
Cameroun			2006	9	2006 ³	9
République centrafricaine			2006	20 ²	2007	8
Costa Rica			2006	100 ¹		
Côte d'Ivoire			2006	9 ¹	2005	9
Croatie			2007	100 ¹		
République démocratique du Congo					2007	9
République dominicaine			2007	4 ¹		
Ethiopie	2004	4	2004	4		
Finlande				99		
Gabon			2007	10		
Ghana			2006	2 ¹		
Guinée			2007	17 ¹		
Guinée-Bissau			2006	8	2006 ³	8
Haïti			2006	5	2005	5
Kenya		10				
Lesotho	2004	25				
Madagascar	2003	7				
Malawi			2006	53 ²	2006 ³	19
Mali	2005	39	2007	45 ¹		
Namibie			2007	17	2006	17
Nigéria			2007	10 ¹		
Rwanda			2005	13	2005	13
Sainte-Lucie			2007	69 ¹		
Sénégal			2007	44 ¹		
Seychelles			2006	100 ¹		
Sierra Leone			2005	1	2005	1
Afrique du Sud			2007	67 ¹		
Swaziland			2007	41	2007	41
Togo		10	2006	60 ²	2006 ³	6
Turquie			2006	100 ¹		
Ouganda			2006	11	2006	11
République-Unie de Tanzanie			2006	51 ¹		
Zambie	2005	13	2007	16	2007	16
Zimbabwe			2006	31	2006	31

¹ Méthodologie non harmonisée avec les directives UNGASS 2008.

² Diffère des valeurs fournies par l'UNICEF.

³ Source: Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (UNICEF MICS).

Indicateur UNGASS 11. Pourcentage d'écoles ayant inclus un enseignement relatif au VIH dans le cadre des programmes de préparation à la vie active au cours de la dernière année scolaire

Pays (ou territoire)	2007
Angola	1
Antigua-et-Barbuda	13
Azerbaïdjan	19
Bahamas	72
Barbade	41
Bélarus	79
Bosnie-Herzégovine	24
Botswana	100
Bulgarie	6
Burkina Faso	1
Burundi	64
Cambodge	26
Cap-Vert	100
République centrafricaine	15
Tchad	4
Comores	15
Congo	82
Costa Rica	100
Croatie	5
Cuba	71
Côte d'Ivoire	1
République démocratique du Congo	0
Dominique	100
République dominicaine	1
El Salvador	4
Erythrée	26
Ethiopie	70
Finlande	95
Gabon	35
Gambie	33
Allemagne	50
Ghana	58
Grenade	0
Honduras	39
Indonésie	10
Iran (République islamique d')	0
Jamaïque	24
Kazakhstan	72
Republique démocratique populaire lao	32
Mexique	27
Moldova	93

Indicateur UNGASS 11. Pourcentage d'écoles ayant inclus un enseignement relatif au VIH dans le cadre des programmes de préparation à la vie active au cours de la dernière année scolaire

Pays (ou territoire)	2007
Namibie	79
Népal	6
Nicaragua	8
Niger	8
Nigéria	34
Pakistan	6
Papouasie-Nouvelle-Guinée	25
Roumanie	64
Fédération de Russie	82
Sainte-Lucie	91
Saint-Vincent-et-les Grenadines	87
Sao Tomé-et-Principe	100
Serbie	1
Seychelles	100
Afrique du Sud	96
Swaziland	51
Togo	0
Turquie	100
Ukraine	57
Zambie	60
Zimbabwe	100

Indicateur UNGASS 12. Fréquentation actuelle de l'école par les orphelins et les non-orphelins âgés de 10 à 14 ans						
Pays (ou territoire)	2003		2005		2007	
	Ratio	Année de l'enquête	Ratio	Année de l'enquête	Ratio	Année de l'enquête
Angola	0.90			2001	0.90	
Argentine				2005	1.03	
Bénin				2006	0.85	
Bolivie				2003	0.74 ¹	
Botswana	0.99					
Burkina Faso				2007	0.87	
Burundi	0.70			2005	0.85	
Cambodge				2006	0.83	
Cameroun	0.94			2006	0.89	
République centrafricaine	0.91			2006	0.96	
Tchad	0.96			2004	1.03	
Colombie				2005	0.85 ¹	
Comores	0.59					
Congo				2005	1.12	
Croatie				2007	1.00 ²	
Cuba				2005	1.00 ²	
Côte d'Ivoire	0.83			2005	1.21 ³	
République démocratique du Congo	0.72			2007	0.77 ¹	
Guinée équatoriale	0.95					
Erythrée				2002	0.83 ¹	
Ethiopie	0.60			2004		
Finlande					>0.99	
Gabon	0.98			2007	1.14	
Gambie	0.85			2006	0.87	
Ghana	0.93			2006	1.04 ⁴	
Guinée	1.13			2005	0.73 ¹	
Guinée-Bissau	1.03			2006	0.97	
Guyana				2005	0.95 ¹	
Haïti				2000	0.87 ¹	
Inde				2006	0.72 ¹	
Indonésie				2002	0.84 ¹	
Jamaïque				2005		
Kenya	0.74	2005	0.97	2003	0.95 ¹	
Lesotho	0.87			2007	0.95	
Madagascar	0.65	2003	0.80	2004	0.83	
Malawi	0.93	2004	0.97			
Mali	0.72					
Mozambique	0.47			2004	0.80	
Namibie	0.92	2005	0.97	2007	1.00	
Nicaragua				2007	0.88	
Niger	1.07			2006	0.67	
Nigéria	0.87			2007	0.86 ²	

Indicateur UNGASS 12. Fréquentation actuelle de l'école par les orphelins et les non-orphelins âgés de 10 à 14 ans						
Pays (ou territoire)	2003		2005		2007	
	Ratio	Année de l'enquête	Ratio	Année de l'enquête	Ratio	Année de l'enquête
Papouasie-Nouvelle-Guinée					0.86	2007
Pérou						2006
Rwanda	0.80				0.82	2005
Sainte-Lucie					1.76 ²	2007
Sénégal	0.74				1.25 ²	2007
Sierra Leone	0.71				0.83	2005
Somalie	0.65				0.78	2006
Afrique du Sud	0.95				0.81 ²	2007
Soudan	0.96					
Swaziland	0.91				0.97	2007
Thaïlande					0.93	2006
Togo	0.96				0.94	2007
Turquie					0.70 ²	2007
Ouganda	0.95				0.95	2000
République-Unie de Tanzanie	0.74				0.64	2007
Zambie	0.87	2005	0.17		1.02 ²	2005
Zimbabwe	0.85				0.95	2006

¹ La valeur Enquête démographique et de santé est fournie par MEASURE DHS (www.measuredhs.com).

² La méthode de collecte de données diffère de la méthodologie UNGASS recommandée.

³ Diffère des valeurs fournies par l'UNICEF.

⁴ Enquête en grappes à indicateurs multiples basée sur de petits dénominateurs, généralement de 25 à 49 cas, non pondérés.

Indicateur UNGASS 13. Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15 à 24 ans possédant tout à la fois des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus

Pays (ou territoire)	2003	2005		Valeur déclarée par le pays pour 2007				DHS (ou MICS) la plus récente			
	Femmes 15-24	Année enquête	Hommes 15-24	Femmes 15-24	Année enquête	Hommes 15-24	Femmes 15-24	Ensemble 15-24	Année enquête	Hommes	Femmes
Albanie	<1								2005 ¹		6
Algérie					2006		16	16	2006 ¹		13
Angola			43	35	2006	25	21	23			
Antigua-et-Barbuda					2005			48			
Argentine					2005	83	89	86			
Arménie					2007	42	34	36	2005	15	23
Azerbaïdjan	2								2006 ¹	5	6
Bangladesh					2005	24	21	22	2006 ¹		16
Bélarus					2007	70	65	68	2005 ¹		34
Belize					2006	26	26	26			
Bénin			11	8	2006	35	16	20	2006	35	16
Bolivie	22								2003	18	15
Bosnie-Herzégovine					2006		44		2005 ¹		48
Botswana	28										
Bulgarie					2006	18	21	19			
Burkina Faso					2007	45	46	45	2003	23	15
Burundi	24	2004	4	4	2005		31		2005 ¹		30
Cambodge	37				2006	45	49	47	2005	45	50
Cameroun	16	2004	34	27	2006		32	32	2004	34	27
Cap-Vert					2005	37	38	38	2005	36	36
République centrafricaine	5				2006	31	22	24	2006 ¹	27	17
Tchad	5				2004	20	8	11	2004	19	7
Chili					2007						
Chine					2007	50	55	42			
Comores	10								2000 ¹		18
Congo					2005	22	10	13	2005	35	26
Costa Rica					2006	43	42	42			
Côte d'Ivoire	16				2005	28	18	22	2005	28	18
Croatie					2006	16	25	20			
Cuba	52				2006	55	61	58	2000 ¹		30
Chypre					2007	10	11	10			
République démocratique du Congo					2006	29	22	26	2007	21	15
Djibouti									2006 ¹		18
République dominicaine	33				2007	34	41	37	2007 ¹	34	41
Equateur					2006	31	27	29			
Guinée équatoriale	4								2000 ¹		4
Erythrée									2002		37
Estonie					2007	28	37	32			
Ethiopie					2005	33	21	24	2005	33	20
Finlande								85			
Gabon					2007	58	60	59			
Gambie	15				2005	34	25	29	2006 ¹		39

Indicateur UNGASS 13. Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15 à 24 ans possédant tout à la fois des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus											
Pays (ou territoire)	2003	2005			Valeur déclarée par le pays pour 2007				DHS (ou MICS) la plus récente		
	Femmes 15-24	Année enquête	Hommes 15-24	Femmes 15-24	Année enquête	Hommes 15-24	Femmes 15-24	Ensemble 15-24	Année enquête	Hommes	Femmes
Géorgie					2005		4				
Allemagne					2007						
Ghana		2003	40	36					2006	33	25
Grèce					2007	27	23	25			
Grenade					2006	43	40	41			
Guatemala					2002	10	9	9			
Guinée					2007	20	12	16	2005	23	17
Guinée-Bissau	8				2006		18		2006		18
Guyana	36				2005	34	44	39	2005	47	53
Haïti	14				2006	40	32	35	2005	40	34
Honduras					2005	39	89	77	2006		30
Inde					2006	33	24	28	2006	36	20
Indonésie	7										
Iraq									2006 ¹		3
Jamaïque					2004	23	47	35	2005 ¹		60
Japon					2004						
Kazakhstan					2007	18	20	19	2006 ¹		22
Kenya	26	2005	80	58					2003	47	34
Kirghizistan					2006	30	33	32	2006 ¹		20
Lettonie					2007	3	3	3			
Lesotho	18								2004	19	27
Madagascar		2003	16	19	2006	46	45	45	2004	16	19
Malawi	34	2005	36	24					2004	36	24
Mali					2006	22	18	20	2006	22	18
Îles Marshall					2006	8	4	6	2007	39	27
Maurice					2004			22			
Mexique					2002	18	18				
Moldova	19				2006	26	27	26	2005		
Mongolie	32	2005	3	5	2005	17	15	16	2005 ¹		35
Monténégro					2006				2006 ¹		30
Maroc					2007				2003		12
Mozambique					2004	39	25	28	2003	33	20
Namibie					2007	62	65	63	2006	62	65
Népal					2006	44	28	32	2006	44	28
Nicaragua					2007		81	81	2001		22
Niger	5				2006	16	13	14	2006	16	13
Nigéria					2005	25	20	23	2003	21	18
Palaos					2006		27				
Pérou					2006			55	2007		19
Philippines									2003	18	12
Fédération de Russie					2007	33	35	34			
Rwanda	23				2005	54	51	52	2005	54	51

Indicateur UNGASS 13. Pourcentage de jeunes femmes et hommes de 15 à 24 ans possédant tout à la fois des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus											
Pays (ou territoire)	2003	2005			Valeur déclarée par le pays pour 2007				DHS (ou MICS) la plus récente		
	Femmes 15-24	Année enquête	Hommes 15-24	Femmes 15-24	Année enquête	Hommes 15-24	Femmes 15-24	Ensemble 15-24	Année enquête	Hommes	Femmes
Saint-Kitts-et-Nevis					2006			52			
Sainte-Lucie					2006	61	57	59			
Saint-Vincent-et-les Grenadines					2006	59	40	49			
Sao Tomé-et-Principe	11				2006				2006 ¹		44
Sénégal					2005	24	19	22	2005	26	21
Serbie					2006	20	21	20	2006 ¹		42
Seychelles					2003	59	67	63			
Sierra Leone	16				2007				2005 ¹		17
Singapour					2007	15	20	17			
Somalie		2004	13	8	2006		4	4	2006 ¹		4
Afrique du Sud	20										
Sri Lanka					2007	10	7	8			
Suriname	27				2006		41	41	2006 ¹		41
Swaziland	27				2007	52	52	52	2007	52	52
République arabe syrienne									2006 ¹		7
Tadjikistan					2007	11	11	11	2005 ¹		3
Thaïlande					2006	47	33	40	2005 ¹		46
Ex-République yougoslave de Macédoine					2007	19	26	22	2005 ¹		27
Togo	20				2007	59	44	51	2006 ¹		28
Trinité-et-Tobago	33				2007			56	2006 ¹		28
Tunisie						26	29	27			
Turquie					2007	35	39	37			
Tuvalu					2005						
Ouganda	28				2006	38	32	33	2006	38	32
Ukraine					2007	39	42	40	2007	43	42
République-Unie de Tanzanie	26								2004	40	45
Uruguay					2007	52	48	50			
Ouzbékistan	3								2006 ¹		31
Viet Nam	25				2005	50	42	46	2005	50	42
Zambie	26	2005	46	41	2007	37	34	35	2007	37	34
Zimbabwe		2003	56	54	2006	46	44	45	2006	46	44

¹ Source: Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (UNICEF MICS).

Indicateur UNGASS 14. Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes possédant tout à la fois des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus¹

Pays (ou territoire)	Professionnel(le)s du sexe				Consommateurs de drogues injectables				Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes		
	2005		2007		2005		2007		2005	2007	
	Ensemble	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble	
Argentine	69	67 ⁶							56		
Arménie	49	54 ⁴		54	60	68	69	56	54	74	
Bahamas										45	
Bangladesh	23	31	30	31	14	20 ⁵	20			14	27
Barbade	37 ^{3,4}		37 ³								
Bélarus	24	50 ⁴		50	61	58	51	68	63	56	
Bénin										42	
Bosnie-Herzégovine					22 ⁵	22					
Bulgarie	35 ⁴		35		29	28	34	32			
Burundi	4	44 ^{2,4}		44 ²							
Cameroun	40 ^{2,4}		40 ²								
Chine	24 ⁴	41			36	49	48	52	37	55	
Congo	67								3		
Costa Rica										49	85
Côte d'Ivoire	32 ⁴		32								
Cuba	52		49	61						54	
République démocratique du Congo	30 ^{2,4}		30 ²								
Equateur				47 ³						59 ³	
El Salvador	6								25		
Estonie	83 ^{3,4}		83 ³		75 ³	75 ³	74 ³	60 ³			
Ethiopie	36 ⁴		36								
Gabon	24		13	25							
Géorgie	1	4 ⁴		4	36	41 ⁵	41			0 ²	
Grèce										74	
Guatemala	3 ⁴		3							33	
Guinée	4 ⁴		4								
Guyana	63								67		
Haïti	6 ⁴		6							36	
Honduras	21 ⁴		21							21	
Inde				38							
Indonésie	24	28	37	26	7	58	58	68	43	42	
Iran (République islamique d')	8 ⁴		8		24	24	15				
Jamaïque	26	26 ⁴		26							
Kazakhstan	63 ⁴		63		63	63	63	66			
Kirghizistan	1	36 ⁴	36		64	62	69	7	89		
Republique démocratique populaire lao	21								31 ³		
Lettonie					45	44	50				
Lituanie	24 ⁴		24							39	
Madagascar	30										

Indicateur UNGASS 14. Pourcentage, parmi les populations les plus à risque, de personnes possédant tout à la fois des connaissances exactes sur les moyens d'éviter la transmission sexuelle du VIH et qui rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus¹

UNGASS	Professionnel(le)s du sexe				Consommateurs de drogues injectables				Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes	
	2005	2007			2005	2007		2005	2007	
Pays (ou territoire)	Ensemble	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble
Malaisie		78 ²				98 ²				
Mali	90									
Maurice		2 ^{2,4}				62 ²				48 ²
Mexique		49	54	47						66
Moldova	35	58 ⁴		58	37	64	64	66	38	47
Mongolie		29 ⁴		29						23
Maroc	72				7					
Népal	17	32	41	30	50	66 ⁵	66		27	45
Nigéria		33 ⁴		33		34	34	36		44
Pakistan		10 ³	21 ³	<1 ³		20				
Panama		91	91	92						78
Papouasie-Nouvelle-Guinée		35 ⁴		35						71
Pérou									73	40
Philippines		2		2		26	27	23		10
Roumanie	14	14 ⁴		14	18	30	24	63		45
Fédération de Russie		36 ⁴		36		46	47	43		26
Rwanda		36 ⁴		36						
Sainte-Lucie						13 ³	10 ³	33 ³		
Sao Tomé-et-Principe				72						
Sénégal		41 ⁴		41						
Sri Lanka		10 ⁴		10						20
Suriname		78	75	79						
Swaziland		46 ⁴		46 ⁴						
Suède		46	100	45						
Tadjikistan		41 ⁴		41		46	45	51		
Thaïlande		28	23	29		49				25
Ex-République yougoslave de Macédoine	10	47	67	43	27	34	32	47	34	41
Togo		45	46	42						
Turquie	22									
Ukraine	8	48 ⁴		48	21	47	47	45	49	47
Viet Nam	24	35 ⁴		35	34	38 ^{3,5}	38 ³			55 ³
Zambie		41	41	42						

¹ Le rapport date de 2007 mais la collecte des données peut varier de 2005 à 2007.

² La collecte des données a débuté avant 2005.

³ Méthodologie non harmonisée avec les directives UNGASS 2008.

⁴ Femmes uniquement.

⁵ Hommes uniquement.

⁶ Transsexuel(le)s.

Indicateur UNGASS 15. Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans

Pays (ou territoire)	2005		Valeur déclarée par le pays pour 2007				DHS (ou MICS) la plus récente			
	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Ensemble 15-24	Année de l'enquête	Hommes	Femmes
Angola		47	24	2006	36	28	32			
Antigua-et-Barbuda				2006			25			
Argentine				2005	27	19	23			
Arménie				2007	11	<1	3	2005	3	<1
Azerbaïdjan								2006	1	1
Bangladesh				2005	4	1	2			
Barbade		36	26							
Bélarus				2007	8	4	5			
Belize				2006	11	6	9			
Bénin		16	9	2006	13	12	12	2006	13	12
Bosnie-Herzégovine				2006		1		2006 ¹		<1
Bulgarie				2006	13	7	10			
Burkina Faso				2007	3	7	6	2003	4	7
Burundi		14	6	2005		3		2005 ¹		3
Cambodge		<1	<1	2006	<1	1	1	2005	<1	1
Cameroun	2004	23	35	2006		14		2006 ¹		14
Cap-Vert				2005	41	24	30	2005	41	24
République centrafricaine	2004	10	10	2006	20	33	30	2006	13	25
Tchad				2004	19	39	35	2004	10	26
Chili				2006	12	6	9			
Colombie				2007			37	2005		13
Congo	2003	10	10	2005	27	24	24	2005	27	24
Costa Rica				2006	15	7	11			
Cuba				2006	33	15	24			
Chypre				2007	15	1	8			
Côte d'Ivoire	2004	13	15	2005	15	19	18	2005	15	19
République démocratique du Congo				2006	31	23	28	2007	18	18
République dominicaine				2007	24	33	29	2007	24	15
Equateur				2004		10				
El Salvador				2003	54	21	27			
Erythrée								2002		13
Estonie				2007	10	11	10			
Ethiopie		40	42	2005	2	16	12	2005	2	16
Fidji				2007			50			
Gabon				2007	38	14	25	2000	42	24
Gambie				2006		5		2006 ¹		5
Géorgie				2005		2	2			
Allemagne				2006	10	12	11			
Ghana								2006	4	6
Grèce				2007	35	7	24			
Grenade				2006	32	20	25			
Guatemala				2002	20	9	11	1999		10

Indicateur UNGASS 15. Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans										
Pays (ou territoire)	2005			Valeur déclarée par le pays pour 2007				DHS (ou MICS) la plus récente		
	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Ensemble 15-24	Année de l'enquête	Hommes	Femmes
Guinée	2005	16	18	2007	20	31	25	2005	17	22
Guinée-Bissau				2006		22				
Guyana				2005	30	12	21	2005	13	9
Haïti				2006	43	15	23	2005	43	15
Honduras				2005	19	11	13	2006		11
Inde				2006	2	4	3	2006	2	10
Iran (République islamique d')				2005						
Jamaïque				2004						
Japon				2004	8	9	9			
Kazakhstan				2007	20	3	9			
Kenya	2005	20	17	2003	29	14	21	2003	29	14
Kirghizistan				2007	9	<1	5	2006 ¹		0
Lettonie				2007	16	9	12			
Liban				2004			4			
Lesotho	2004	27	14	2005	12	6	8	2004	13	6
Lituanie				2006	22	10	16			
Madagascar	2003	22	31	2006	33	39	36	2004	9	15
Malawi				2006				2004	14	15
Mali				2006	5	25	6	2006	5	25
Îles Marshall				2006	17	10	14	2007	27	14
Mauritanie				2007		14	14			
Maurice				2004	3	1	2			
Mexique				2005	4	4	4			
Moldova	2005	34	24	2006	8	1	4	2005	9	1
Mongolie	2005	3	<1	2005	3	<1	1			
Monténégro				2007	4	2	3	2006 ¹		<1
Maroc				2007	8	1	5			
Mozambique				2004	26	28	28	2003	26	28
Namibie				2007	18	7	12	2006	18	7
Népal								2006	4	7
Nicaragua				2007		14	14	2001		12
Niger				2006	8	39	25	2006	5	30
Nigéria	2005	5	15	2005	5	15	10	2003	7	21
Pakistan				2006	1	<1				
Palaos				2006		5				
Papouasie-Nouvelle-Guinée				2007	4	4	4			
Pérou				2007		6		2007		6
Philippines								2003	2	1
Roumanie				2006	17	3	10			
Fédération de Russie	2004	17	8	2007	12	3	7			
Rwanda				2005	13	4	7	2005	13	4
Saint-Kitts-et-Nevis				2006	36	10	22			

Indicateur UNGASS 15. Pourcentage de jeunes femmes et hommes âgés de 15 à 24 ans ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans										
Pays (ou territoire)	2005			Valeur déclarée par le pays pour 2007				DHS (ou MICS) la plus récente		
	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Ensemble 15-24	Année de l'enquête	Hommes	Femmes
Sainte-Lucie				2006	32	20	26			
Saint-Vincent-et-les Grenadines	2005	63	37	2006	31	14	22			
Sao Tomé-et-Principe				2006						
Sénégal				2005	12	9	10	2005	12	9
Sierra Leone				2005	25		25			
Singapour				2007	3	2	2			
Afrique du Sud				2005	5	12	8			
Espagne				2003	18	11	15			
Sri Lanka				2007			3			
Suriname				2006			8			
Swaziland				2007	5	7	6	2007	5	7
Suède				2007	15	21	19			
Suisse				2007	10	7	8			
Tadjikistan				2006	1	<1	1			
Thaïlande		11	7	2006	21	5	13			
Ex-République yougoslave de Macédoine				2007	8	1	5	2006 ¹		<1
Togo				2007	13	10	11	1998	<1	19
Trinité-et-Tobago				2007			12			
Tunisie					7	<1	4			
Turquie				2007						
Turkménistan								2000		<1
Ouganda				2006	12	16	15	2006	12	16
Ukraine				2007	7	3	5	2007	2	1
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord				2001	14	12	13			
République-Unie de Tanzanie				2005	10	13	11	2004	9	12
Uruguay				2007	25	10	18			
Ouzbékistan								1996		1
Viet Nam				2005	1	<1	<1	2005	<1	1
Zambie				2007	16	14	15	2007	16	14
Zimbabwe		9	8	2006	5	5	5	2006	4	5

¹ Source: Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (UNICEF MICS).

Indicateur UNGASS 16. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois

Pays (ou territoire)	2003 ¹					2005 ¹				
	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Sexes confondus		Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Sexes confondus	
		15-49	15-49	15-24	25-49		15-49	15-49	15-24	25-49
Angola										
Antigua-et-Barbuda										
Arménie	2000	9	<1	4	4	2005	9	<1	6	3
Azerbaïdjan										
Bangladesh										
Bélarus										
Belize										
Bénin	1996		2			2001	22	1	7	8
Bolivie						2003	15	1	10	7
Bosnie-Herzégovine										
Burkina Faso	1999	13	1	9	6	2003	15	1	5	9
Burundi										
Cambodge	2000		<1			2005	6	<1	2	4
Cameroun	1998	41	10	25	25	2004	31	6	15	22
Canada										
Cap-Vert						2005	36	3	19	19
République centrafricaine										
Tchad	1997	19	1	11	8	2004	17	1	6	10
Chili										
Colombie	2000		3			2005		3		
Comores										
Congo						2005	24	7	15	16
Costa Rica										
Cuba										
Chypre										
Côte d'Ivoire	1998	33	5	19	19	2005	24	4	12	15
République démocratique du Congo										
République dominicaine	1996	16	2	4	6	2002	23	2	13	13
Estonie										
Ethiopie	2000	7	1	3	5	2005	2	<1	1	2
Gabon	2000	24	14	20	18					
Gambie										
Allemagne										
Ghana						2003	10	1	4	7
Grèce										
Grenade										
Guatemala										
Guinée	1999	26	4	15	15	2005	25	2	11	14
Guinée-Bissau										
Guyana						2005	7	1	6	3
Haïti	2000	24	1	11	13	2005	23	1	11	13

Indicateur UNGASS 16. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois									
Valeur déclarée par le pays pour 2007							DHS (ou MICS) la plus récente		
Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Sexes confondus				Année de l'enquête	Hommes	Femmes
	15-49	15-49	15-49	15-19	20-24	25-49		15-49	15-49
2006	51	25	38	54	46	26			
2006			55						
							2005	9	<1
							2006	6	<1
2005	18		18	25	25	14			
2007	33	14	21	27	32	15			
2006	13 ²	4 ²	8 ²						
2006	12	35	17	62	30	8	2006	28	
							2003	15	1
2006		8		4	11				
2007	14	1	7	2	6	9	2006 ⁴		1 ²
							2005 ⁴		1 ²
2006	6	<1	3	1	4	3	2005	6	<1
2004	40	8	18	17	20	17	2006 ⁴		5 ²
2006			13						
2005	69	43	52	86	71	36	2005	36	3
2006	24 ²	6 ²	11 ²	6	14				
2004	17	1	8	4	9	10	2004	17	1
2006	12	2	7	6	14	6			
2007		4 ³			35 ³		2005	<1	3
2003	24	4	11			9			
2005	28	8	14	19	16	13	2005	24	7
2006	37	35	39						
2006	35	10	23	22	29	22			
2007	25	6	15						
2005	31	4	16	15	18	16	2005	24	4
2007	22	4	9	10	11	9	2007	17	3
2007	30	4	17	22	25	16	2007	24	3
2007	23	19	21	17	26				
2005	3	<1	2	1	2	2	2005	2	<1
2007	51	38	43	53	36	43			
2006		1 ²					2006 ⁴		1 ²
2007	35	22	29						
2006	22 ²	40 ²	26 ²				2006	8	1
2007	33	8	20	22	48	18			
2006	30	13	21	19	30	16			
2002	13		13	34	19	8			
2005	25	2	8	6	10	8	2005	25	2
2006				5	7		2006 ⁴		6 ²
2005	9	1	5				2005	7	1
2006	23	1	12	7	16	13	2005	23	1

Indicateur UNGASS 16. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois

Pays (ou territoire)	2003 ¹					2005 ¹				
	Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Sexes confondus		Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Sexes confondus	
		15-49	15-49	15-24	25-49		15-49	15-49	15-24	25-49
Honduras						2006		1		
Inde						2006	1	<1	1	1
Jamaïque										
Kazakhstan										
Kenya	1998	24	3	16	11	2003	12	2	7	7
Kirghizistan										
Liban										
Lesotho						2004	21	8	11	16
Lituanie										
Madagascar						2004	17	3	11	9
Malawi	2000	15	1	6	9	2004	9	1	4	6
Mali	1996	13				2001	17	1	5	11
Îles Marshall										
Maurice										
Mexique										
Moldova						2005	11	1	9	4
Mongolie										
Monténégro										
Maroc										
Mozambique						2003	30	5	18	17
Namibie	2000	16	2	9	10					
Népal	2001	3								
Nicaragua	2001		1							
Niger	1998	10	1	7	5					
Nigéria						2003	15	2	5	10
Palaos										
Papouasie-Nouvelle-Guinée										
Pérou	1996	23	<1	4	9	2000		<1		
Philippines						2003	6			
Pologne										
Fédération de Russie										
Rwanda	2000	2	<1	1	2	2005	3	<1	1	2
Saint-Kitts-et-Nevis										
Sainte-Lucie										
Saint-Vincent-et-les Grenadines										
Sénégal						2005	13	1	4	10
Serbie										
Seychelles										
Sierra Leone										
Singapour										

Indicateur UNGASS 16. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois									
Année de l'enquête	Valeur déclarée par le pays pour 2007						DHS (ou MICS) la plus récente		
	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus				Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49
			15-49	15-19	20-24	25-49			
2005	16	1	4				2006	<1	1
2006	8	2	5	6	9	4	2006	1	<1
2004	48	11	29						
2007	25	5	15	9	23	15			
2003	12	2	5	3	6	5	2003	12	2
2007	28	2	15	10	21		2006 ⁴		<1 ²
2004	24	4	17						
2005	30	11	16				2004	21	8
2007	43	26	41	<1	<1	41			
2004	20	3	7				2004	17	3
2005	1	1	1	2	1	1	2004	9	1
2006	23	2	5	5	4	1	2006	15	1
2006	23	18	21	19	30		2007	7	3
2004	9	1	5	4	5	6			
2003	8				6	9			
2007	16	2	8	11	19	5	2005	11	1
2005	54		54						
							2005 ⁴		<1 ²
2007	37	2	19	14	27				
2004	52	24	29	60	34	19	2003	30	5
2007	16	3	9	10	15	7	2006	11	2
							2006	2	<1
2007		2	2	1	2	2			
2006	9	1	2	5	4	2	2006	12	1
2005	19	2	10	3	10	14	2003	15	2
2006		9		36	13	5			
2007	13	2	8	6	11	7			
2006	33	12					2007		1
							2003	6	
2005	8	5	7						
2006	20	9	15	16	26	13			
2005	3	<1	2	<1	1	2	2005	3	<1
2006	53	19	36						
2007	42	25	35						
2006	25	10	17	13	32	9			
2005	25	4	8	7	11	7	2005	13	1
2006	42	11	26	32	24	<1	2005 ⁴		3 ²
2003	23	11	17						
2005	9	36	21						
2007	7	2	4	2	10	4			

Indicateur UNGASS 16. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois

Pays (ou territoire)	2003 ¹					2005 ¹								
	Année de l'enquête	Hommes		Femmes		Sexes confondus		Année de l'enquête	Hommes		Femmes		Sexes confondus	
		15-49	15-49	15-24	25-49	15-49	15-49		15-24	25-49				
Afrique du Sud														
Espagne														
Sri Lanka														
Suriname														
Swaziland														
Suède														
Suisse														
Tadjikistan														
Thaïlande														
Togo	1998	21	3	13	13									
Trinité-et-Tobago														
Turquie														
Turkménistan	2000		<1											
Ouganda	1995	8	1	5	4	2001	18	2	6	12				
Ukraine														
Ouzbékistan														
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord														
République-Unie de Tanzanie	1999	29	9	17	20	2004	23	3	10	15				
Uruguay														
Viet Nam						2005	14	2	6	9				
Zambie	1996	27	4	18	12	2002	21	2	10	13				
Zimbabwe	1999	13	2	6	8	2006	9	1	4	6				

¹ Données fournies par MEASURE DHS.² 15-24 ans.³ 25-64 ans seulement.⁴ Source: Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (UNICEF MICS).

Indicateur UNGASS 16. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois									
Valeur déclarée par le pays pour 2007							DHS (ou MICS) la plus récente		
Année de l'enquête	Hommes	Femmes	Sexes confondus				Année de l'enquête	Hommes	Femmes
	15-49	15-49	15-49	15-19	20-24	25-49		15-49	15-49
2005	3	18	10	18	15	8			
2003	27	13	20						
2007	3	<1	2	1	1	3			
2006			3						
2007	14	2					2007	14	2
2007	23	23	23	33	34	11			
2007	18	10	14	25	26	10			
2006			6	3	9				
2006	18	1	9	24	18	7			
2007	26	6	16	10	22	17	2006 ⁴		3 ²
2007	94	79	85						
2007		15	15	19	20	11			
							2000		<1
2006	21	2	12	3	9	16	2006	21	2
2007	21	7	14	18	23	11	2007	13	2
							2006 ⁴		<1 ²
2001	25	15	20	30	35	16			
2006	20	5	13	46			2004	23	3
2007	23	11	17	28	35	11			
2005	1	<1	<1	<1	1	<1	2005	14	2
2007	14	1	7	3	7	9	2007	14	1
2006	14	1	7	7	9	6	2006	9	1

Indicateur UNGASS 17. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

Pays (ou territoire)	2003 ¹					2005 ¹				
	Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus		Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus	
				15-24	25-49				15-24	25-49
Albanie										
Angola										
Antigua-et-Barbuda										
Argentine										
Arménie	2000	32				2005	58			
Azerbaïdjan										
Bangladesh										
Bélarus										
Bénin	1996		13			2001	23	18	33	17
Bosnie-Herzégovine										
Burkina Faso	1999	55	36	56		2003	43	44	68	33
Burundi										
Cambodge						2005	41			
Cameroun	1998	23	13	27	17	2004	38	35	53	28
Canada										
Cap-Vert						2005	69	57	78	59
République centrafricaine										
Tchad	1997	20	10	22	17	2004	20	7		
Chili										
Colombie	2000		22			2005		31		
Congo						2005	30	23		
Costa Rica										
Cuba										
Chypre										
Côte d'Ivoire	1998	45	23	53	34	2005	38	41	59	26
République démocratique du Congo										
République dominicaine	1996	9	19	7	10	2002	35	33	45	27
Estonie										
Ethiopie	2000	20	11	43	10	2005	9			
Gabon	2000	40	26	41	29					
Gambie										
Allemagne										
Ghana						2003	22	33	39	
Grèce										
Grenade										
Guatemala										
Guinée	1999	24	9	31	17	2005	24	20	38	17
Guinée-Bissau										
Guyana						2005	53	56		
Haïti	2000	21	30	30	16	2005	34	21	49	23

Indicateur UNGASS 17. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel									
Année de l'enquête	Valeur déclarée par le pays pour 2007						DHS (ou MICS) la plus récente		
	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus				Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49
			15-49	15-19	20-24	25-49			
2005									
2006	46	18	32	26	40	31			
2006			87						
2005	48	44	46	48	44				
							2005	58	
2006							2006	26	
								<1	
2005	35		35	42	31	36			
2007	62	60	61	76	68	49			
2006	25	42	32	31	36	29	2006	17	
2006		72		73	71				
2007	36	51	38	69	61	30	1999	55	
2004	55	45	49					36	
2006	40	12	39	83	73	23	2005	41	
2006	55	41	48	61	62	43	2006 ⁴	68 ⁵	
	23	16	19						
2005	72	46	58	70	61	47	2005	69	
2006								57	
2004	20	7					2004	20	
2006	30	18	28	32	34	25		7	
							2005	31	
2005	43	21	30	24	29	35	2005	30	
2006	15	11	13			12		23	
2006	41	33	39	72	53	30			
2007	63	53	61						
2005	52	34	44	47	45	42	2005	38	
2007	26	16	21	16	26	21	2007	16	
								8	
2007	42	33	37	54	44	34	2007	45	
								35	
2007	64	55	61	61	64				
2005	52	24	43	38	47	34	2005	9	
2007	72 ²	70 ²	71 ²	65 ²	73 ²	71 ²			
							2006 ⁴	64 ⁵	
2007			58						
2006	33	54					2006	38	
								35	
2007	71	55	67	61	58	75			
2006	68	52		61	63				
2002				47	58	50			
2005	32	26	31	35	43	27	2005	24	
							2006 ⁴	20	
2005	53	56	53				2005	53	
								56	
2006	34	21	33	41	53	23	2005	34	
								21	

Indicateur UNGASS 17. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

Pays (ou territoire)	2003 ¹					2005 ¹				
	Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus		Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus	
				15-24	25-49				15-24	25-49
Honduras						2006		27		
Inde						2006	23	12		
Jamaïque										
Kazakhstan										
Kenya	1998	36	18	38	30	2003	33	12	47	17
Kirghizistan										
Liban										
Lesotho						2004	41	19	47	26
Lituanie										
Madagascar						2004	9	2	12	6
Malawi	2000	14	15	26	7	2004	20	16	32	13
Mali	1996	34				2001	16	14	27	13
Îles Marshall										
Mauritanie										
Maurice										
Mexique										
Moldova						2005	45	22	56	28
Mongolie										
Maroc										
Mozambique						2003	19	14	38	10
Namibie	2000	65	45	72	56					
Népal										
Nicaragua	2001		19							
Niger	1998	26	28							
Nigéria						2003	22	13	34	17
Palaos										
Papouasie-Nouvelle Guinée										
Pérou	2000		15							
Philippines						2003		22		
Rwanda	2000	28	30			2005	8	14		
Saint-Kitts-et-Nevis										
Sainte-Lucie										
Saint-Vincent-et-les Grenadines										
Sao Tomé-et-Principe										
Sénégal						2005	31	21	61	22
Serbie										
Sierra Leone										
Singapour										
Afrique du Sud										
Espagne										

Indicateur UNGASS 17. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

Valeur déclarée par le pays pour 2007							DHS (ou MICS) la plus récente		
Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus				Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49
			15-49	15-19	20-24	25-49			
2006	38	32	37				2006		27
2006	67	62	66	61	68	66	2006	23	12
2004	67	53	64						
2007	82	82	82	88	93	77			
2003	33	12	30	48	47	17	2003	33	12
2007	81	75	80	85	78				
2004	72	67	72						
2004	41	19	34	49	40	26	2004	41	19
2007	46	20	44			44			
2004	13	5	8	8	8	8	2004	9	2
2004	47	30	38	35	47	33	2006 ⁴		45 ⁵
2006	38	17	20	19	29	34	2006	12	8
2006	19	15	18	17	19		2007	20	11
2007	10		10						
2004	44	46	44	50	43	43			
2003	20				78	14			
2007	48	60	49	45	50	52	2005	45	22
2005	34		34						
2007	61	75	62	63	61				
2003	19	14	18	28	28	10	2003	19	14
2007	74	66	68	79	76	60	2006	74	66
2006	54						2006	30	
2001		19					2001		19
2006	7	8					2006	7	8
2005	62	44	56	44	56	62			
2006		23				60			
2007	45	26	43	50	49	38			
2006			48	59	43		2007		31
2003	22						2003		22
2005	8	14	8				2005	8	14
2006			67						
2007	48	39	45						
2006	62	52	59	59	59				
2006		57 ³		60	59				
2005	62	37	52	39	51	59	2005	31	21
2006				73	78				
2007	11	26	37						
2007	51	0	42	50	14	51			
2005	67	47	64	80	72	56			
2003	50	42	46						

Indicateur UNGASS 17. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

Pays (ou territoire)	2003 ¹					2005 ¹				
	Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus		Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus	
				15-24	25-49				15-24	25-49
Suriname										
Swaziland										
Suisse										
Tadjikistan										
Thaïlande										
Togo	1998	33	21	42	25					
Turquie										
Ouganda	1995	18	8	24	9	2001	24	25		
Ukraine										
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord										
République-Unie de Tanzanie	1999	22	16	25	17	2004	29	21	37	23
Uruguay										
Viet Nam						2005	58			
Zambie	1996	31	18	36	23	2001	27	21	40	20
Zimbabwe	1999	40	46	56	30	2006	36	41	57	24

¹ Données fournies par MEASURE DHS.

² Données sur 2 grandes villes seulement.

³ Femmes de 15-24 ans seulement.

⁴ Source: Enquêtes en grappes à indicateurs multiples (UNICEF MICS).

⁵ 15-24 ans.

Indicateur UNGASS 17. Pourcentage de femmes et d'hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

Valeur déclarée par le pays pour 2007							DHS (ou MICS) la plus récente		
Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49	Sexes confondus				Année de l'enquête	Hommes 15-49	Femmes 15-49
			15-49	15-19	20-24	25-49			
2006			49						
2007	56	57	56		62	51	2007	56	57
2007	62	52	58	83	61	48			
2006			65	53	69				
2006	53	14	51	63	49	50			
2007	73	69	73	72	76	71	1998	33	21
2007		58	53	52	71	45			
2006	42	41	42		30	41	2006	42	41
2007	75	61	72	77	64	72	2007	46	48
2001	10	5	7	15	15	5			
2005	50	38	44	38	41		2004	29	21
2007	69	65	68	76	81	56			
	1	0	0	0	1	0	2005	58	
2007	50	37	46	39	49	48	2007	28	33
2006	71	47	64	50	67	68	2006	36	41

Indicateur UNGASS 18. Pourcentage de professionnel(le)s du sexe déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client¹

Pays (ou territoire)	2005			2007		
	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes
Afghanistan				50 ^{3,5}		50 ³
Angola				78 ⁵		78
Arménie	89	100	89	91 ⁵		91
Bangladesh	40	44	32	63	44	67
Barbade				80 ⁵		80
Bélarus	77	100	77	76 ⁵		76
Bénin				83 ⁵		83
Bolivie				88 ⁴	57 ⁴	88 ⁴
Bulgarie				95 ⁵		95
Burkina Faso	96			99	98	99
Burundi	74		74	74 ^{2,5}		74 ²
Cambodge	96		96	99 ⁵		99
Cameroun				74 ^{2,4,5}		74 ^{2,4}
Canada					61 ⁴	80 ⁴
Cap-Vert				74 ⁵		74
Chine			69	82 ⁵		82
Colombie				89	82	97
Comores				59 ⁵		59
Costa Rica				92 ⁵		92
Côte d'Ivoire				96 ⁵		96
Croatie				86 ²		
Cuba				61	63	56
République démocratique du Congo				61 ^{2,5}		61 ²
République dominicaine				96 ²		
Equateur						95
El Salvador				96	89	97
Erythrée				76 ⁵		
Estonie				94 ⁵		94
Ethiopie				87 ⁵		84
Gabon				67	53	67
Géorgie			95	94 ⁵		94
Ghana				98		
Guatemala				96	91	97
Guinée				100 ⁵		100
Guinée-Bissau						60
Guyana				89 ⁵		89
Haiti				90 ⁵		90
Honduras				68	71	66
Inde						88
Indonésie	55	48	56	69	72	68

Indicateur UNGASS 18. Pourcentage de professionnel(le)s du sexe déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client ¹						
UNGASS	2005			2007		
Pays (ou territoire)	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes
Iran (République islamique d')				55 ⁵		55
Jamaïque	84			84		
Kazakhstan				97 ⁵		97
Kirghizistan	81			84 ⁵		84
Republique démocratique populaire lao	83	59	89			
Liban				34 ⁴	47 ⁴	34 ⁴
Lituanie				77 ⁵		77
Madagascar				79		
Malawi				69 ⁵		69
Malaisie				35 ²		
Mali				99 ⁵		99
Maurice				100 ^{2,5}		100 ²
Mexique				96	96	96
Moldova	98			93 ⁵		93
Mongolie	94	50	96	92 ⁵		92
Maroc	38		38	54 ⁵		54
Népal	67			81	93	77
Niger				96 ⁵		96
Nigéria				98 ⁵		98
Pakistan	23	7	37	34	21	45
Panama	92	91	92	76	64	84
Papouasie-Nouvelle-Guinée				94 ⁵		94
Paraguay				76	71	78
Pérou					42	96
Philippines				65	50	65
Pologne						46 ²
Roumanie			85	85 ⁵		85
Fédération de Russie	77			92 ⁵		92
Rwanda				87 ⁵		87
Sao Tomé-et-Principe						60
Sénégal	86		87	99 ⁵		99
Sierra Leone				68 ⁵		68
Singapour						99
Sri Lanka			65	89 ⁵		89
Suriname				70	79	68
Swaziland				98 ⁵		98
Suède				22	100	20
Suisse					72	
Tadjikistan				75 ⁵		75
Thaïlande				96 ^{4,5}		

Indicateur UNGASS 18. Pourcentage de professionnel(le)s du sexe déclarant avoir utilisé un préservatif avec leur dernier client¹

UNGASS	2005			2007		
	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes
Ex-République yougoslave de Macédoine	86	88	84	78	93	75
Togo				78	76	84
Turquie				33 ⁵		33
Ukraine	80		80	86 ⁵		86
Ouzbékistan				65 ⁵		65
Viet Nam	90		90	97 ^{4,5}		97 ⁴
Zambie				81	72	82
Zimbabwe				4 ^{4,6}	4 ⁴	

¹ Le rapport date de 2007 mais la collecte des données peut varier entre 2005 et 2007.

² La collecte des données a débuté avant 2005.

³ La période de collecte des données n'est pas définie.

⁴ Méthodologie non harmonisée avec les directives UNGASS 2008.

⁵ Femmes uniquement.

⁶ Hommes uniquement.

Indicateur UNGASS 19. Pourcentage d'hommes déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel anal avec un partenaire masculin¹

UNGASS	2005	2007
Pays (ou territoire)		
Argentine		91
Arménie	30	84
Australie		58 ^{3,4}
Bahamas		69
Bangladesh	49	24
Bélarus	62	67
Bulgarie		46
Cambodge		86
Chili		29
Chine	41	64
Colombie		80
Congo	23	
Costa Rica		71
Côte d'Ivoire		47
Croatie		53
Cuba		55
République dominicaine		79 ²
Equateur		63
El Salvador		83
Estonie		47
Fidji	20	
Géorgie	54	
Allemagne		58
Ghana		48
Grèce		89
Guatemala		78
Guyana		81
Haïti		73
Honduras		47
Indonésie	48	39
Japon		55
Kazakhstan		66
Kenya		75
Kirghizistan	68	81
Republique démocratique populaire lao		24 ⁴
Liban		39 ⁴
Lituanie		58
Mali		54
Maurice		52 ²

Indicateur UNGASS 19. Pourcentage d'hommes déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel anal avec un partenaire masculin¹

UNGASS	2005	2007
Pays (ou territoire)		
Mexique		79
Moldova	63	48
Mongolie	13	67
Népal		74
Nigéria		53
Pakistan	8	24
Panama	84	86
Papouasie-Nouvelle-Guinée		88 ⁴
Pérou	46	47
Philippines		32
Pologne		32 ^{2,4}
Roumanie		73
Fédération de Russie	39	60
Sainte-Lucie		74
Sénégal	45	55 ²
Slovénie		75 ⁴
Sri Lanka		61
Suriname		89
Suède		42 ⁴
Suisse		80 ⁴
Thaïlande		88
Ex-République yougoslave de Macédoine	29	56
Togo		60
Trinité-et-Tobago		47 ²
Turquie		37
Tuvalu		63
Ukraine	72	39
Ouzbékistan		61
Viet Nam		61

¹ Le rapport date de 2007 mais la collecte des données peut varier de 2005 à 2007.

² La période de collecte des données a débuté avant 2005.

³ La période de collecte des données n'est pas définie.

⁴ Méthodologie non harmonisée avec les directives UNGASS 2008.

Indicateur UNGASS 20. Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel ¹			
Pays (ou territoire)	Ensemble	Hommes	Femmes
Argentine	64	63	65
Arménie	56	56	55
Australie	20 ³	20 ³	20 ³
Azerbaïdjan	18 ²		
Bangladesh	44	44	55
Bélarus	59	57	65
Bosnie-Herzégovine	23 ⁴	23	
Bulgarie	19	18	28
Canada	43		
Chine	34 ³	32 ³	43 ³
Estonie	68	66	74
Géorgie	48 ⁴	48	
Grèce	48		
Indonésie	34	34	30
Iran (République islamique d')	33	33	30
Japon	65 ⁴	65	
Kazakhstan	37	37	36
Kirghizistan	11	11	9
Lettonie	38	40	34
Liban	15 ³	15 ³	
Malaisie	5 ²		
Maurice	13 ²	15 ²	0 ²
Mexique	29	27	38
Moldova	68	73	52
Maroc	13	12	21
Népal	38 ⁴	38	
Nigéria	66	66	68
Pakistan		21	
Paraguay	33	33	36
Fédération de Russie	37	39	31
Suède	25	28	19
Suisse	50 ³	53 ³	42 ³
Tadjikistan	36	33	47
Thaïlande	35		
Ex-République yougoslave de Macédoine	51	51	51
Turquie	10	9	13
Ukraine	55	55	56
Ouzbékistan	39	37	50
Viet Nam	36 ^{3,4}	36 ³	

¹ Le rapport date de 2007 mais la collecte de données peut varier entre 2005 et 2007.

² La collecte de données a débuté avant 2005.

³ Méthodologie non harmonisée avec les directives UNGASS 2008.

⁴ Hommes uniquement.

Indicateur UNGASS 21. Pourcentage de consommateurs de drogues injectables déclarant avoir utilisé un matériel d'injection stérile lors de leur dernière injection¹

Pays (ou territoire)	Ensemble	Hommes	Femmes
Afghanistan	46		
Argentine	65	64	67
Arménie	95	95	93
Australie	71 ⁴		
Azerbaïdjan	77		
Bangladesh	34	34	74
Bélarus	71	71	70
Bosnie-Herzégovine	25 ⁵	25	
Bulgarie	25	26	23
Canada	68 ^{3,4}		
Chine	41	42	32
Géorgie	93 ⁵	93	
Grèce	67		
Indonésie	82 ²	82 ²	89 ²
Iran (République islamique d')	75	75	62
Japon	47 ⁵	47	
Kazakhstan	59	59	58
Kirghizistan	77	76	81
Lettonie	90	87	96
Liban	60 ⁴	63 ⁴	0 ⁴
Malaisie	28 ²		
Maurice	32 ²	32 ²	33 ²
Mexique	14	15	9
Moldova	96	96	95
Maroc	7	7	12
Népal	96 ⁵	96	
Nigéria	89	89	86
Pakistan		28	
Paraguay	80	80	79
Philippines	48	47	63
Roumanie	28 ²	30 ²	17 ²
Fédération de Russie	82	83	81
Suède	38	38	35
Suisse	94 ⁴	95 ⁴	92 ⁴
Tadjikistan	32	35	21
Ex-République yougoslave de Macédoine	73	73	69
Turquie	10	9	13
Ukraine	84	85	81
Ouzbékistan	23	23	25
Viet Nam	89 ⁵	89	

¹ Le rapport date de 2007 mais la collecte des données peut varier entre 2005 et 2007.

² La collecte des données a débuté avant 2005.

³ La période de collecte des données n'est pas définie.

⁴ Méthodologie non harmonisée avec les directives UNGASS 2008.

⁵ Hommes uniquement.

Indicateur UNGASS 24. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'infection à VIH dont on sait qu'ils sont toujours sous traitement 12 mois après le début de la thérapie antirétrovirale¹

Pays (ou territoire)	2005					2007				
	Hommes	Femmes	Ensemble <15	Ensemble 15+	Total	Hommes	Femmes	Ensemble <15	Ensemble 15+	Total
Antigua-et-Barbuda						53	57			55 ²
Argentine										90
Arménie						80	100		84	84
Azerbaïdjan						57	43		86	86 ³
Bahamas						68	71	90	68	70
Barbade	93	94			93	93	96		95	95
Bélarus						74	77	97	74	75
Bénin										73
Bolivie						97	96	100	97	97
Bosnie-Herzégovine										100 ³
Botswana			92			82	86			85 ⁴
Bulgarie						89	93	33	97	91
Burkina Faso						77	71	77	73	73
Burundi						77	82	77	81	80
Cambodge								94	87	88
Cameroun						96	96	97	96	96
Cap-Vert						93	86	100	88	89
République centrafricaine						85	85	89	85	85
Chili										89
Chine						84	91	96	85	85
Colombie										76
Comores						40	60	0	100	100 ³
Costa Rica										91
Côte d'Ivoire						86	91	82	90	89
Croatie						100	88	0	97	97
Cuba						96	96	100	96	96
République démocratique du Congo						66	72	62	70	70
Djibouti										82
République dominicaine								89	90	90
El Salvador										85
Erythrée										93
Ethiopie	90	86			89					70
Fidji								100	78	79
Finlande										90
Gabon						50	62	63	58	58
Gambie										92
Géorgie	85	100			88	71	86	75	71	75 ⁵
Allemagne						77	80			78
Grèce						95	96	100	95	96
Grenade						83	100	100	83	88
Guatemala										91
Guinée-Bissau										62

Indicateur UNGASS 24. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'infection à VIH dont on sait qu'ils sont toujours sous traitement 12 mois après le début de la thérapie antirétrovirale ¹										
Pays (ou territoire)	2005					2007				
	Hommes	Femmes	Ensemble <15	Ensemble 15+	Total	Hommes	Femmes	Ensemble <15	Ensemble 15+	Total
Guyana						70	78	97	73	75
Haïti										84
Honduras										91
Hongrie						99	98	83	99	99
Inde										80
Iran (République islamique d')						78	79	75	78	78
Jamaïque									88	88
Japon										100
Jordanie										98
Kazakhstan						72	61	8	73	68
Kenya										87
Kirghizistan						70	57	100	66	68
Republique démocratique populaire lao						90	90	93	90	90
Liban										100
Lesotho					82	74	75	79	73	74
Lituanie						54	71		58	58
Madagascar					100					94
Malawi					83					69
Malaisie										87
Mali						72	72	72	72	72
Îles Marshall							100		100	100 ³
Mauritanie										92
Maurice						84	90		85	85
Moldova						82	93	88	87	87
Mongolie						67			67	67 ³
Monténégro						75	20		60	60 ³
Maroc										93
Mozambique										97
Namibie					91 ²			82	69	71
Népal										85
Nouvelle-Zélande										98
Nicaragua										100
Niger								36	47	47
Nigéria					98 ⁶			92	95	95
Pakistan										87
Palaos						100	100		100	100 ³
Panama										96
Papouasie-Nouvelle Guinée						67	56	10	67	61
Paraguay						30	14	6	44	49
Pérou						85	87	95	85	85

Indicateur UNGASS 24. Pourcentage d'adultes et d'enfants atteints d'infection à VIH dont on sait qu'ils sont toujours sous traitement 12 mois après le début de la thérapie antirétrovirale¹

Pays (ou territoire)	2005					2007				
	Hommes	Femmes	Ensemble <15	Ensemble 15+	Total	Hommes	Femmes	Ensemble <15	Ensemble 15+	Total
Philippines						96	96		96	96
Rwanda										91
Saint-Kitts-et-Nevis										100
Sainte-Lucie					80	100	97	100	98	98
Saint-Vincent-et-les Grenadines						43	80	50	63	62
Sao Tomé-et-Principe						65	82	100	74	75
Sénégal						79	94			89
Seychelles						62	43	100	53	55
Sierra Leone										81
Afrique du Sud										53
Sri Lanka										64
Suriname										80
Swaziland						63	65	65	64	64
Suède										
Suisse						92	84		89	89
Tadjikistan						55	61		57	57
Thaïlande						85	85	88	85	85
Ex-République yougoslave de Macédoine						43	50		44	44 ³
Togo						90	90	90	90	90
Tunisie						93	90			92
Turquie						26	16	3	24	23
Ouganda										88
Ukraine	69	75	70	100	72	73	83	91	76	78
Uruguay										74
Viet Nam								93	81	82
Zambie						87	90	92	88	88
Zimbabwe										93

¹ Les données correspondent à une cohorte avec une survie de 12 mois minimum ; les personnes perdues de vue et les décès sont inclus dans le dénominateur sauf indication contraire.

² Représente la survie cumulée.

³ Représente <10 personnes encore en vie et sous traitement antirétroviral au cours des 12 derniers mois.

⁴ Représente une survie de 24 mois (Jan 2005-Déc 2006).

⁵ Représente 2006.

⁶ Représente 8 mois de survie.