

Пресс-релиз

Требуются срочные меры по улучшению доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ для людей, употребляющих инъекционные наркотики

Варшава, Польша, 14 мая 2007 г. – Несмотря на возросшие политическую приверженность и финансирование деятельности в ответ на СПИД, большинство людей, употребляющих наркотики инъекционным путем, все еще не имеют доступа к основным услугам по профилактике и лечению ВИЧ, заявил представитель ЮНЭЙДС на проходящей в Польше 18-й Конференции по снижению вреда, связанного с употреблением наркотиков.

По оценкам, число людей, употребляющих инъекционные наркотики во всем мире превышало 13 миллионов по состоянию на конец 2005 года, при этом только 8% из них имеют доступ к каким-либо услугам по профилактике ВИЧ. Доступ к антиретровирусной терапии в этой группе недопустимо низок – отчасти за счет отсутствия информации, исключения и широко распространенной стигмы и дискриминации.

«Примерно 10% всех новых случаев ВИЧ-инфекции во всем мире происходят вследствие инъекционного употребления наркотиков – и если исключить Африку, то эта цифра возрастает до 30%», - сказал г-н Прасада Рао, региональный директор ЮНЭЙДС для стран Азии и Тихоокеанского региона в своем выступлении на открытии конференции. «Существуют доказательные данные, что программы профилактики ВИЧ особенно эффективны для людей, которые употребляют инъекционные наркотики, однако им регулярно отказывают в доступе к соответствующей информации и услугам».

Инъекционное употребление наркотиков является основным путем передачи ВИЧ в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и Восточной Европе, но, как указано в опубликованном в 2007 г. докладе Генерального Секретаря ООН о ходе работы, в последнее время оно также становится новым фактором ВИЧ-инфицирования в Африке к югу от Сахары, в особенности в Кении, Нигерии, Южной Африке и Объединенной Республике Танзания.

Данные и опыт показывают, что целенаправленные программы профилактики ВИЧ для потребителей инъекционных наркотиков приносят плоды. В Португалии, где программы снижения вреда были значительно расширены, число диагнозов ВИЧ-инфекции в 2005 году снизилось почти на одну треть по сравнению с 2001 годом после внедрения целенаправленных программ снижения вреда.

«Финансовые средства должны выделяться более стратегическим и инновационным путем, с тем чтобы предоставить более эффективные программы профилактики людям, подверженным наиболее высокому риску ВИЧ-инфекции», - сказал г-н Рао. «В странах, где эпидемия СПИДа развивается в основном за счет употребления инъекционных наркотиков, целенаправленные программы снижения вреда для

потребителей инъекционных наркотиков должны быть составной частью национальных планов по СПИДу».

В 2006 году во время Сопещания высокого уровня по СПИДу, проходившего в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, государства-члены утвердили программу работы в направлении достижения всеобщего доступа к профилактике и лечению ВИЧ. В нее включены конкретные рекомендации относительно эффективных услуг по профилактике ВИЧ для ключевых групп населения, включая людей, употребляющих наркотики инъекционным путем.

Контакт:

Софи Бартон-Нотт, ЮНЭЙДС Женева, тел.: +41 22 791 1697, email: bartonknotts@unaids.org

ЮНЭЙДС является инновационной совместной программой Организации Объединенных Наций, объединяющей усилия и ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС и десяти учреждений системы ООН для противодействия СПИДу. Штаб-квартира Секретариата расположена в Женеве, Швейцария, а его сотрудники работают на местах в более чем 80 странах. Согласованные действия системы ООН в ответ на СПИД координируются в странах посредством Тематических групп ООН и совместных программ по СПИДу. В число коспонсоров входят УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, МПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк. Посетите веб-сайт ЮНЭЙДС по адресу: www.unaids.org