



ЮНЭЙДС
ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА ООН ПО ВИЧ/СПИДУ

UNICEF/UNAIDS
UNAIDS/WHO
UNAIDS/UNAIDS
UNAIDS/UNAIDS



National AIDS Control Organisation

India's voice against AIDS
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
www.nacoonline.org



Всемирная
организация здравоохранения

Пресс-релиз

Согласно новым оценкам, 2,5 миллиона человек в Индии живут с ВИЧ

Улучшение данных и увеличение числа их источников обеспечивают более правильное понимание эпидемии СПИДа в Индии

Нью-Дели, 6 июля 2007 г. – Новые оценочные данные, представленные сегодня Национальной организацией по контролю над СПИДом (НОКС) при поддержке ЮНЭЙДС и ВОЗ, указывают на то, что национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых в Индии составляет примерно 0,36%, что соответствует оценочному числу людей, живущих с ВИЧ в этой стране, от 2 до 3,1 миллиона человек. Эти оценки являются более точными по сравнению с оценками за предыдущие годы, поскольку они основаны на использовании расширенной системы эпиднадзора и пересмотренной и улучшенной методологии.

В рамках постоянных усилий, направленных на изучение эпидемии в стране, правительство Индии в последние годы значительно расширило и улучшило свою систему эпиднадзора и увеличило охват групп населения. В 2006 году правительство создало 400 новых участков дозорного эпиднадзора и способствовало проведению Национального обследования здоровья семей - 3, представляющего собой обследование, проводимое среди населения.

Объявляя о начале третьей фазы Национальной программы, Союзный министр здравоохранения и благополучия семьи д-р Анбумани Рамадосс отметил: «Пересмотр оценок на основе использования новых данных и усовершенствованной методологии означает существенное улучшение систем и возможностей для мониторинга распространения ВИЧ, это признак прогресса, которого мы добились в плане улучшения понимания эпидемии. Это желанный прогресс. К сожалению, новые цифры все еще указывают на серьезную эпидемию, которая может усилиться, если не будет обеспечено необходимое и быстрое расширение и реализация усилий по профилактике, идентифицированных в рамках НПКС III. Нам необходимо помнить о том, что в Индии почти 30 лакх¹ людей, живущих с ВИЧ. Это люди, которые ежедневно сталкиваются со стигмой, дискриминацией и иррациональным предубеждением и нуждаются в нашей всесторонней поддержке и понимании». Министр призвал своих коллег-медиков и организации гражданского общества бороться со стигмой и дискриминацией.

Пересмотренные оценки, полученные благодаря более надежной и усиленной методологии, будут использоваться для улучшения процесса планирования мер по профилактике, уходу и лечению. «Новость о том, что общее число ВИЧ-инфекций ниже, чем считалось ранее, является хорошей, однако мы не можем быть благодушными. Медленное и устойчивое распространение ВИЧ-инфекции вызывает беспокойство. Повышение уровня понимания эпидемии в Индии, определенно, позволило нам использовать более нацеленные стратегии профилактики ВИЧ и

¹Лакх - на хинди и вообще в Индии обозначает число 100.000 (сто тысяч).

лечения и более эффективно развернуть ресурсы», – сказал Секретарь по вопросам здравоохранения и Председатель Национального совета по контролю над СПИДом г-н Нареш Даял.

Новая методика, разработанная для получения пересмотренных оценок, также использовалась для перерасчета показателя распространенности за предыдущие периоды начиная с 2002 года на основе новых допущений и критериев. Эти цифры позволяют провести беспристрастное сравнение трендов в изменении показателя распространенности ВИЧ по годам. Они указывают, что эпидемия развивалась устойчиво во времени с незначительным снижением в 2006 году.

Комментируя новые оценочные данные и предупреждая против их неправильной интерпретации, помощник Секретаря и Генеральный директор Национальной организации по контролю над СПИДом Суджата Рао сказала: «Расчет данных за несколько лет с использованием новой модели помогает нам понять, что новые более низкие оценочные данные не означают резкого снижения эпидемии». Предупреждая против ослабления действий в ответ на ВИЧ, она добавила, что «использование аналогичной методологии привело к пересмотру оценок в сторону их уменьшения в некоторых странах, таких как Замбия и Руанда. Мы будем убеждать всех заинтересованных участников в том, что им надо оставаться активными, чтобы сохранить с трудом достигнутые завоевания последнего десятилетия».

Демонстрируя уверенность в приверженности руководства Индии, страновой координатор ЮНЭЙДС д-р Денис Браун отметил, что «тенденции, вытекающие из последних оценок, подтверждают правильность национальной стратегии Индии по СПИДу. Вдохновляясь этими новыми более низкими оценками, национальные органы должны усилить свои программы в связи с ВИЧ. Нам необходимо расширить усилия, чтобы обеспечить всеобщий доступ к профилактике ВИЧ, уходу и лечению. Хотя пропорция людей, живущих с ВИЧ, ниже, чем считалось ранее, эпидемия в Индии по-прежнему остается существенной по своим количественным показателям. Невзирая на более низкую оценочную распространенность, расходы на меры профилактики, необходимые для борьбы с эпидемией, остаются такими же».

Представитель ВОЗ д-р Салим Хабаеб приветствовал точку зрения правительства Индии, которой оно придерживалось в последние 15 лет при решении проблемы эпидемии ВИЧ. Он также приветствовал усилия штатов, гражданского общества и учреждений-партнеров, а также ценную роль средств информации, которые способствовали созданию благоприятных условий. «Бремя ВИЧ остается существенным. Усилия Индии, особенно в области профилактики, заслуживают внимания, и их следует расширять наряду с обеспечением всеобщего доступа к лечению для всех нуждающихся».

Имеются признаки некоторого снижения показателя распространенности ВИЧ среди населения в целом

Если в целом в последние годы отмечалась устойчивая тенденция в развитии эпидемии ВИЧ, существуют различия между штатами и группами населения. Хорошая новость заключается в том, что в штате Тамилнаду и других южных штатах с высоким бременем ВИЧ, где в течение ряда лет осуществлялись эффективные меры вмешательства, показатель распространенности ВИЧ начал снижаться или стабилизировался.

Отмечены новые центры с высоким уровнем распространенности ВИЧ

ВИЧ продолжает появляться в новых районах. Данные эпиднадзора за 2006 год указали на некоторые центры с высоким уровнем распространенности в северных штатах. Отмечено 29 районов с высоким показателем распространенности, в частности в штатах Западная Бенгалия, Орисса, Раджастан и Бихар.

Показатель распространенности ВИЧ остается высоким среди уязвимых групп

Данные эпиднадзора за 2006 год указывают на нарастание ВИЧ-инфекции среди ряда групп, которым грозит более высокий риск заражения ВИЧ, таких как потребители инъекционных наркотиков и мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. Было установлено, что в таких крупных городах, как Ченнаи, Дели, Мумбаи и Чандигарх уровень распространения ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) является весьма высоким. Кроме того, высокий уровень распространенности среди ПИН отмечен также в штатах Орисса, Пенджаб, Западная Бенгалия, Уттар-Прадеш и Керала.

В то время как данные действительно указывают на снижение уровней распространенности ВИЧ среди работников секс-бизнеса в южных штатах, уровни распространенности в целом в этой группе по-прежнему остаются высокими, что требует расширения целевых усилий по профилактике в этих группах.

«Только контроль над эпидемией среди уязвимых групп поможет изменить динамику ее развития», – сказала помощник Секретаря и Генеральный директор НОКС Суджата Рао.

Лица для контактов

Маниша Мишра | ЮНЭЙДС, Индия | + 91 98 10 88 227

Софи Бартон-Нотт | ЮНЭЙДС, Женева | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org

Икбал Нандра | ВОЗ, Женева | +41 22 791 5589 | nandrai@who.int