

Comunicado de prensa

Según las últimas estimaciones, en la India hay 2,5 millones de personas que viven con el VIH

Los datos mejorados procedentes de un mayor número de fuentes permiten comprender mejor la epidemia de SIDA en la India

Nueva Delhi, 6 de julio de 2007 – Las nuevas estimaciones de 2006 anunciadas públicamente hoy por la Organización Nacional de Lucha contra el SIDA (NACO), apoyada por el ONUSIDA y la OMS, indican que la prevalencia nacional del VIH en adultos en la India es aproximadamente del 0,36%, lo que equivale a una cifra estimada de 2 a 3,1 millones de personas que viven con el VIH en ese país. Estas estimaciones son más precisas que las de años anteriores porque se basan en un sistema ampliado de vigilancia y una metodología revisada y mejorada.

Como parte de su esfuerzo continuo por conocer mejor la epidemia que afecta el país, en los últimos años el Gobierno indio ha ampliado y mejorado mucho su sistema de vigilancia y ha aumentado los grupos de población cubiertos. En 2006, el Gobierno estableció 400 nuevos puntos de vigilancia centinela y facilitó la tercera Encuesta Nacional de Salud de la Familia, una encuesta basada en la población.

En la presentación de la tercera fase del Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, el Dr. Anbumani Ramadoss, Ministro de Salud y Bienestar Social de la Unión, manifestó lo siguiente: “La revisión de las estimaciones basada en un mayor número de datos y una metodología mejorada marca un significativo mejoramiento de los sistemas y la capacidad para vigilar la propagación del VIH, un claro indicio del avance que hemos hecho en el conocimiento de la epidemia. Saludamos con entusiasmo este progreso. Sin embargo, los nuevos datos lamentablemente siguen poniendo de manifiesto una epidemia grave con el potencial de activar-se más si los esfuerzos de prevención identificados en la tercera fase del Programa Nacional no se ajustan rápidamente a la realidad de la epidemia y se ejecutan de la forma prevista. Debemos tener presente que la India tiene cerca de 30 lakh¹ de personas que viven con el VIH. Esas personas afrontan estigma, discriminación y prejuicios sin fundamento todos los días de sus vidas y necesitan todo nuestro apoyo y comprensión.” El Ministro instó a sus colegas de la profesión médica y las organizaciones de la sociedad civil a luchar contra el estigma y la discriminación.

Las estimaciones revisadas, que son el resultado de una metodología más fiable y mejorada, se utilizarán para mejorar la planificación de las iniciativas de prevención, atención y tratamiento. “Si bien es alentador que el número total de nuevas infecciones por el VIH sea inferior a lo previsto, no podemos pecar por un exceso de confianza. La propagación lenta pero constante de la infección por el VIH es un factor preocupante. Ciertamente, la mejor comprensión de la epidemia de la India nos ha permitido poner en marcha estrategias de prevención y tratamiento del VIH más enfocadas y distribuir los recursos con mayor eficacia,” declaró el Sr. Naresh Dayal, Secretario de Salud y Presidente de la Junta Nacional de Lucha contra el SIDA.

¹ 1 lakh=100.000

Los nuevos métodos desarrollados para las estimaciones revisadas también se han empleado para calcular retroactivamente la prevalencia anual desde 2002 partiendo de la nueva serie de hipótesis y medidas. Estos datos permiten hacer una comparación justa de las tendencias de la prevalencia del VIH año tras año. Nos muestran una epidemia estable a lo largo del tiempo con un descenso insignificante en 2006.

En su comentario sobre las nuevas estimaciones, la Sra. Sujatha Rao, Secretaria Adjunta de Salud y Directora General de la NACO, advirtió que no debían interpretarse tendenciosamente, y apuntó: “El cálculo de estas cifras para varios años, utilizando el nuevo modelo, nos ayuda a comprender que las nuevas estimaciones más bajas no significan un descenso brusco en la epidemia.” La Sra. Rao alertó sobre la ralentización del ritmo de la respuesta al VIH, y añadió que “El uso de una metodología similar ha conducido a una revisión a la baja de las estimaciones en algunos países, como Zambia y Rwanda. Tenemos que convencer a todas las partes interesadas de que mantengan el ritmo y no dejen escapar los logros alcanzados con tanto esfuerzo en el último decenio.”

Mostrando confianza en el compromiso del liderazgo indio, el Dr. Denis Broun, Coordinador de País del ONUSIDA, manifestó que “Las tendencias que ponen de manifiesto las últimas estimaciones refuerzan la estrategia nacional de la India contra el SIDA. Incentivadas por las nuevas estimaciones más bajas, las autoridades nacionales deberían fortalecer sus programas sobre el VIH. Tenemos que ampliar gradualmente nuestros esfuerzos para alcanzar el acceso universal a la prevención, atención y tratamiento del VIH. A pesar de que la proporción de personas que viven con el VIH es inferior a las previsiones estimadas, la epidemia de la India continúa siendo importante en cifras. Aunque la estimación de la prevalencia sea más baja, el costo de los esfuerzos de prevención requeridos para controlar la epidemia sigue siendo el mismo.”

El Dr. Salim Habayeb, Representante de la OMS, encomió el enfoque adoptado por el Gobierno de la India en los últimos 15 años para abordar la epidemia de VIH. También felicitó los esfuerzos realizados por los estados, la sociedad civil y los organismos asociados, así como el papel destacado de los medios de comunicación, en facilitar la creación de un entorno favorable. “La carga del VIH sigue siendo muy importante. Los esfuerzos de la India, en particular en el área de la prevención, son notables, si bien deberían intensificarse más y orientarse también a facilitar el acceso universal al tratamiento a todos los que lo necesitan.”

La prevalencia del VIH muestra indicios de un ligero descenso entre la población general

Aunque para el conjunto del país en los últimos años la epidemia de VIH muestra una tendencia estable, se observan variaciones entre los estados y los grupos de población. La buena noticia es que en Tamil Nadu y otros estados meridionales con una elevada carga de VIH en los que se han llevado a cabo intervenciones eficaces durante varios años, la prevalencia del VIH ha empezado a descender o estabilizarse.

Identificadas nuevas bolsas de alta prevalencia del VIH

El VIH continúa irrumpiendo en nuevas zonas del país. Los datos de vigilancia de 2006 han identificado diversas bolsas de alta prevalencia en los estados del norte. Hay 29 distritos con alta prevalencia, particularmente los estados de Bengala Occidental, Orissa, Rajastán y Bihar.

La prevalencia del VIH continúa siendo elevada entre los grupos vulnerables

Los datos de vigilancia de 2006 señalan un aumento en la infección por el VIH entre diversos grupos de alto riesgo de contraer el virus, como las personas que se inyectan drogas y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Se ha encontrado una positividad del VIH significativamente elevada entre usuarios de drogas inyectables en las ciudades metropolitanas de Chennai, Deli, Mumbai y Chandigarh. Además, los estados de Orissa, Punjab, Bengala Occidental, Uttar Pradesh y Kerala también presentan una prevalencia alta entre dichos consumidores de drogas.

Si bien los datos señalan efectivamente que en los estados meridionales los niveles de prevalencia del VIH entre los profesionales del sexo se están reduciendo, los niveles de prevalencia general en este grupo de población continúan siendo elevados, de modo que se necesita ampliar notablemente los esfuerzos de prevención orientados a ese grupo.

“Solamente podremos romper la dinámica de la epidemia si la controlamos entre los grupos vulnerables,” concluyó la Sra. Sujatha Rao, Secretaria Adjunta de Salud y Directora General de la NACO.

Contacto

Manisha Mishra | ONUSIDA India | + 91 98 10 88 2273 | mishram@unaids.org

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org

Iqbal Nandra | OMS Ginebra | +41 22 791 5589 | nandrai@who.int