



Campaña mundial  
contra el SIDA

# ¡ESCUCHA, APRENDE y VIVE!

## Con los Niños y los Jvenes en Campaa contra el SIDA

### Secretariado

ONUSIDA

### Comité Directivo

• ONUSIDA  
y copatrocinadores:

UNICEF

PNUD

FNUAP

UNESCO

OMS

BANCO MUNDIAL

• Otros:

Asociación Mundial  
de las Guías Scouts

Federación Internacional  
de Sociedades de la Cruz Roja  
y de la Media Luna Roja

Internacional de la Educación

International Save the Children Alliance

MTV International

Organización Mundial  
del Movimiento Scout

---

### ONUSIDA

20, avenue Appia

CH-1211 Ginebra 27

Tel. (+41 22) 791 47 65

Fax (+41 22) 791 48 98

<http://www.unaids.org>

dirección electrónica:

[renaudt@unaids.org](mailto:renaudt@unaids.org)

---

## Datos y Cifras 1999

---

## Campaña mundial contra el SIDA, 1999

## ***Datos y cifras***

---

### ***Los niños y los jóvenes: los menores de 25 años***

- Según las estimaciones del ONUSIDA — el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA—, en 1998 se infectaron por el VIH más de tres millones de niños y jóvenes en todo el mundo. Esa cifra incluye a casi 590 000 niños menores de 15 años y a más de 2,5 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad.
  - Durante 1998, diariamente se infectaron por el VIH más de 8500 niños y jóvenes, lo que equivale a seis casos cada minuto.
- 

### ***Los niños de hasta 14 años de edad***

- El ONUSIDA estima que para finales de 1998 en el mundo entero había ya más de 33,4 millones de personas viviendo con el VIH, el 43% de las cuales eran mujeres. En algunos de los países más afectados, dos o más de cada cinco mujeres embarazadas que acuden a dispensarios prenatales en las zonas urbanas son seropositivas.
  - Entre las mujeres VIH-positivas que dan de mamar y no siguen un tratamiento preventivo con medicamentos antirretrovíricos, las posibilidades de que su hijo se infecte a través de la transmisión materno-infantil oscilan entre el 25% y el 35%.
  - De acuerdo con las estimaciones del ONUSIDA y la OMS, desde el principio de la epidemia se ha infectado un total de más de cuatro millones de niños menores de 15 años.
  - Más del 90% de esos niños eran lactantes nacidos de madres seropositivas y contrajeron el virus antes o durante el parto o a través de la lactancia materna.
  - Solamente en 1998, 590 000 niños menores de 15 años se infectaron por el VIH. Con esa cifra, el total de niños de ese grupo de edad que para fines de 1998 vivían con el VIH pasó a ser de 1,2 millones.
  - Como en los niños la infección por el VIH suele progresar rápidamente hacia el SIDA, la mayor parte de los niños menores de 15 años que han contraído la infección desde el inicio de la epidemia han desarrollado el SIDA, y la mayoría de ellos han fallecido.
  - De los 2,5 millones de personas que murieron por causa del SIDA en 1998, 510 000 eran niños menores de 15 años.
  - La Oficina del Censo de los Estados Unidos de América estima que para el año 2010, si no se detiene la propagación del VIH, el SIDA puede aumentar la mortalidad de lactantes por lo menos en un 75% y la mortalidad de niños menores de cinco años en más del 100% en las regiones más afectadas por la enfermedad.
  - El ONUSIDA calcula que, para fines de 1997, 8,2 millones de niños habían perdido a su madre por causa del SIDA antes de los 15 años de edad.
-

### *Datos y cifras*

---

- Se estima que a finales de 1997 había 6,2 millones de huérfanos menores de 15 años, luchando por sobrevivir tras la muerte de su madre o de ambos padres por causa del SIDA. Más del 95% de esos niños viven en el África subsahariana.

---

  - La mayoría de los niños huérfanos por el SIDA se concentran en los países más afectados por la epidemia. Por ejemplo, los datos facilitados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y por el Banco Mundial indican que en Uganda hay 1,7 millones de niños que han quedado huérfanos por causa del SIDA desde el comienzo de la epidemia.

---

  - De acuerdo con el UNICEF, en Zimbabwe los niños huérfanos por causa del SIDA representan el mayor grupo de niños en “circunstancias difíciles” y el que aumenta con más rapidez. El ONUSIDA y la OMS calculan que para 1997 aproximadamente el 7% de los niños menores de 15 años del país habían perdido a su madre por causa del SIDA.

---

  - Incluso los niños que no están infectados por el VIH ni son huérfanos por el SIDA se ven afectados por las consecuencias socioeconómicas de la epidemia en las comunidades y los países más afectados. En un estudio del Proyecto de Control y Prevención del SIDA (AIDSCAP) se estima que, para el año 2005, el producto interno bruto de Kenya será un 14,5% más bajo de lo que hubiese sido sin la epidemia de SIDA. Se prevé que los ingresos per cápita se reducirán en un 10%.

---

  - La vulnerabilidad de las niñas a la infección por el VIH se ve exacerbada por la negación o el descuido de sus derechos humanos reconocidos — incluida la discriminación por razón de sexo-, dando como resultado un control inadecuado del riesgo de contraer el VIH por vía sexual y un limitado acceso a las oportunidades socioeconómicas.

---

  - La explotación sexual de los niños con fines comerciales y el abuso sexual doméstico de los menores son factores de riesgo que contribuyen a la infección por el VIH en este grupo de población.

---

  - Las cifras presentadas durante el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Menores con Fines Comerciales en 1996 indican que cada año más de un millón de niños se incorporan al comercio sexual en el mundo.

---

  - Un número indeterminado de niños en todo el mundo corre el riesgo de sufrir abusos sexuales por familiares, por otros miembros de su comunidad o por desconocidos.

---

  - Se estima que en el mundo hay por lo menos 100 millones de niños y adolescentes que trabajan o viven en la calle, a menudo en situaciones violentas o peligrosas.

---

  - El abuso físico y psicológico de los niños puede aumentar la probabilidad de que éstos adopten comportamientos sexuales de riesgo y por tanto incrementar su vulnerabilidad al VIH.
- 

### *Los jóvenes de 15 a 24 años de edad*

- Alrededor de una tercera parte de los 33 millones de personas que vivían con el VIH en el mundo a finales de 1998 eran jóvenes entre 15 y 24 años de edad.
-

## *Datos y cifras*

---

- Aproximadamente la mitad de las nuevas infecciones por el VIH se produjeron en este mismo grupo de edad. Se trata precisamente de la edad en que la mayoría de las personas inician su vida sexual.
- En 1998, cerca de tres millones de jóvenes se infectaron por el virus, lo que equivale a más de cinco muchachos y muchachas cada minuto del día, todos los días del año.
- En un estudio reciente efectuado en Malawi se midió una incidencia del VIH de cerca del 6% en las mujeres adolescentes en comparación con menos del 1% en las mujeres mayores de 35 años.
- En los países en desarrollo, que sufrieron más del 95% de las nuevas infecciones por el VIH ocurridas en el mundo durante 1998, viven centenares de millones de jóvenes de 15-24 años de edad: una proporción enorme de la población.
- En los lugares donde pueden acceder a unos conocimientos teóricos y prácticos y a unos medios apropiados, los jóvenes de hoy muestran una clara inclinación por adoptar comportamientos más seguros, mucho más que las generaciones anteriores o los adultos mayores que ellos.
- En el norte de Tailandia, por lo menos la mitad de los hombres de 21 años declararon haber tenido relaciones sexuales con profesionales del sexo en 1995, igual número de hombres que cuatro años antes. Sin embargo, en 1995 hubo más probabilidades de que esos jóvenes usaran un preservativo en esas relaciones (93%) que el mismo grupo de edad en 1991 (61%).
- En Malawi, Tanzania y Zimbabwe, el uso del preservativo entre las personas menores de 25 años es significativamente más elevado que entre los grupos de mayor edad.
- En Chile, en un estudio de 1996 se puso de manifiesto que el empleo del preservativo es mayor entre las personas de 15 a 18 años de edad, y se han confirmado comportamientos similares en Brasil y México.
- En Senegal, dos de cada cinco mujeres de menos de 25 años y las dos terceras partes de los hombres declararon haber utilizado un preservativo con una pareja ocasional en 1997, en comparación con menos del 5% al comienzo del presente decenio.
- En muchos países industrializados y en desarrollo, los jóvenes de 15 a 19 años se están absteniendo de forma creciente de tener relaciones sexuales como consecuencia del VIH. En Uganda, por ejemplo, en 1995 más del 50% de los hombres y el 46% de las mujeres de ese grupo de edad manifestaron no haber tenido nunca relaciones sexuales; es decir que hubo un incremento de más del 75% con respecto a las mismas cifras para ambos sexos correspondientes a 1989.
- En Europa occidental, actualmente alrededor del 60% de los jóvenes utilizan un preservativo en su primera relación sexual, lo que significa que esa práctica se ha multiplicado por seis desde principios de los años noventa.
- La prevención del VIH da resultado, especialmente con la gente joven. Entre los varones tailandeses de 21 años de edad, se puso de manifiesto que en 1995 hubo por lo menos la mitad de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y un tercio menos de infecciones por el VIH que cuatro años antes.

### *Datos y cifras*

---

- En Uganda, las infecciones por el VIH entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad embarazadas han disminuido notablemente en diversos dispensarios urbanos, pasando a ser del 5% en algunos casos frente al 20% registrado a comienzos del decenio.

---

  - El vecino país de Tanzania presenta descensos similares en la incidencia del VIH entre las mujeres menores de 25 años. Tanto en los contextos rurales como en los urbanos de una zona del país, la infección por el VIH en las mujeres jóvenes se ha reducido en casi unos dos tercios.

---

  - En las sociedades donde la epidemia se transmite heterossexualmente, las mujeres jóvenes corren mayor riesgo de contraer la infección por el VIH que los varones jóvenes, tanto por razones fisiológicas como sociales. Eso es particularmente cierto en el caso de las mujeres que se ven obligadas a tener relaciones sexuales con hombres para su supervivencia socioeconómica.

---

  - Las muchachas también corren el riesgo de contraer el VIH antes que los muchachos. En un examen preliminar de diversos estudios multicéntricos patrocinados por el ONUSIDA y sus asociados se ha puesto de manifiesto que en la parte occidental de Kenya cerca de una de cada cuatro muchachas de 15 a 19 años de edad está viviendo ya con el VIH, frente a uno de cada 25 muchachos.

---

  - En Zambia, el 16% de las muchachas frente a tan sólo el 1% de los muchachos de ese mismo grupo de edad están infectadas por el VIH. En Rwanda, las tasas para los muchachos y las muchachas de 15 a 19 años son similares, pero en los primeros años posteriores a los 20 años las mujeres tienen significativamente más probabilidades de infectarse: el 14% frente al 9% de los hombres.

---

  - La situación es distinta en los lugares donde la vía principal de transmisión del VIH es el consumo de drogas intravenosas. En muchos países en desarrollo los consumidores de drogas intravenosas son mayoritariamente hombres.

---

  - En Europa oriental, las infecciones por el VIH están aumentando más rápidamente entre los usuarios de drogas intravenosas, la mayor parte de los cuales son varones jóvenes.

---

  - En Myanmar, más del 60% de los adolescentes consumidores de drogas intravenosas están infectados por el VIH: efectivamente, los adolescentes son el único grupo de consumidores de drogas intravenosas entre los que la prevalencia del VIH ha seguido aumentando de forma constante desde los primeros años del decenio de 1990.

---

  - El consumo de drogas intravenosas y las relaciones sexuales entre hombres contribuyen a aumentar más las tasas de infección en los varones jóvenes que en las mujeres jóvenes del Brasil. Casi las tres cuartas partes de los casos de SIDA no pediátrico en los brasileños menores de 25 años se han producido en varones.

---

  - En Etiopía, el uso del preservativo se ha fomentado como una estrategia de prevención entre los jóvenes. Como resultado, los preservativos han pasado a estar más disponibles y a ser menos costosos, y su empleo se ha transformado en una norma socialmente aceptada entre los jóvenes. Las ventas de preservativos han aumentado de tres millones de unidades en 1991 a 20 millones en 1996.
-

## *Datos y cifras*

---

- En Tailandia, la participación del sector privado en la accesibilidad y en la comercialización social de los preservativos ha contribuido a duplicar el empleo del preservativo entre los jóvenes a mediados de los años noventa. En una encuesta nacional efectuada en 1997 entre la población general se puso de manifiesto que el 87% de los hombres de 20 a 24 años de edad utilizaban un preservativo cada vez que tenían relaciones con profesionales del sexo.

---

  - En una evaluación del ONUSIDA de más de 50 estudios se ha constatado que los programas de educación sobre salud sexual no estimulan la experimentación sexual. Si se satisfacen los criterios de calidad, esos programas en realidad contribuyen a aplazar la edad de inicio de las relaciones sexuales. Asimismo, ayudan a reducir las ETS y los embarazos no deseados en los adolescentes sexualmente activos.

---

  - En algunas partes de la India, Zimbabwe y el Caribe, por ejemplo, existen unos programas de educación escolar sobre el SIDA que han demostrado ser eficaces. Esos programas incluyen educación sobre la vida familiar y sobre aptitudes para la vida, así como educación en materia de salud sexual.

---

  - Si se les da la oportunidad, los jóvenes han demostrado por medio de su compromiso directo que pueden contribuir mucho en una respuesta comunitaria a la epidemia de VIH/SIDA. Son una fuerza para el cambio.
-