

Datos fundamentales, por regiones - Situación de la epidemia de sida, 2007

Panorama mundial

- La prevalencia mundial del VIH (la proporción de personas que viven con el virus) parece haberse estabilizado. Sin embargo, el número de personas infectadas por el VIH ha aumentado de 29,0 millones [26,9-32,4 millones] en 2001 a 33,2 millones [30,6-36,1 millones] en 2007.
- Unos 2,5 millones [1,8-4,1 millones] de personas contrajeron una nueva infección por el VIH en 2007, y 2,1 millones [1,9-2,4 millones] fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida.

África subsahariana

- **África subsahariana** sigue siendo la región más afectada. En 2007, el VIH infectó *de novo* a unos 1,7 millones [1,4-2,4 millones] de personas, lo que eleva a 22,5 millones [20,9-24,3 millones] el número total de personas que viven con el virus. A diferencia de otras regiones, la mayoría (61%) de las personas infectadas por el VIH en **África subsahariana** son mujeres.
- Más de los dos tercios (68%) de todas las personas infectadas por el VIH viven en África subsahariana, donde, en 2007, se produjeron más de las tres cuartas partes (76%) de todos los fallecimientos relacionados con el sida.
- Dentro de la región, **África meridional** es la zona más afectada: en 2005, la prevalencia nacional del VIH en adultos superaba el 15% en ocho países de **África meridional**.¹
- **Sudáfrica** es el país con el mayor número de infecciones por el VIH en todo el mundo, pero, como en la mayoría de los países de **África meridional, oriental y occidental**, la prevalencia del VIH en adultos se mantiene estable o ha empezado a disminuir. Esta última tendencia es más evidente en **Kenya** y **Zimbabwe**, y también se aprecian signos de una prevalencia decreciente del VIH en **Côte d'Ivoire**, **Malí** y zonas urbanas de **Burkina Faso**. En estos países hay evidencia igualmente de un cambio hacia comportamientos más seguros.

Asia

- Se estima que, en 2007, había 4,9 millones [3,7-6,7 millones] de personas que vivían con el VIH en **Asia**, incluidas las 440.000 [210.000-1,0 millones] que se infectaron *de novo* durante el pasado año. Cerca de 300.000 [250.000-470.000] personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el sida en 2007.

¹ Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe.

- En Extremo Oriente, en 2007, hubo casi un 20% más de nuevas infecciones por el VIH que en 2001.
- La prevalencia del VIH es máxima en **Asia sudoriental**, con una amplia variación en las tendencias epidémicas entre los diferentes países: **Myanmar, Tailandia y Camboya** muestran descensos en la prevalencia, pero la epidemia está creciendo a un ritmo particularmente elevado en **Indonesia y Viet Nam**.
- Aunque la proporción de personas que viven con el VIH en la **India** es menor de lo que se había estimado anteriormente, la epidemia sigue afectando a un gran número de personas (2,5 millones [2,0-3,1 millones] en 2006).

Caribe

- Se estima que, en 2007, la prevalencia del VIH en adultos era del 1% en el **Caribe**, que continúa siendo la segunda región más afectada del mundo después de África subsahariana. En 2007 había unas 230.000 [210.000-270.000] personas que vivían con el VIH, y se calcula que 11.000 [9.800-18.000] fallecieron por enfermedades relacionadas con el sida. Además, 17.000 [15.000-23.000] personas contrajeron una nueva infección por el VIH.
- La prevalencia del VIH es máxima en la **República Dominicana y Haití**, que, en conjunto, representan casi las tres cuartas partes de todas las personas que viven con el VIH en el **Caribe**.
- En **Haití**, sin embargo, los datos indican reducciones significativas recientes en algunas formas de comportamiento sexual que incrementan el riesgo de exposición al VIH.
- En el **Caribe**, el sida sigue siendo una de las principales causas de mortalidad entre las personas de 25-44 años.

Europa oriental y Asia central

- Según las estimaciones, el número de personas que viven con el VIH en **Europa oriental y Asia central** se elevó en 2007 a 1,6 millones [1,2-2,1 millones], con una cifra estimada de 150.000 [70.000-290.000] nuevas infecciones por el VIH. En la región, unas 55.000 [42.000-88.000] personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el VIH a lo largo de 2007.
- Casi el 90% de los nuevos diagnósticos de VIH comunicados en esta región correspondieron a dos países: la **Federación de Rusia** (66%) y **Ucrania** (21%), aunque los nuevos diagnósticos de VIH notificados están aumentando en otros países, incluido **Uzbekistán**, que tiene actualmente la mayor epidemia en **Asia central**.
- El uso de drogas inyectables es un factor importante en la epidemia de la región.

América Latina

- Las epidemias de VIH en **América Latina** permanecen estables en general. El número estimado de nuevas infecciones en 2007 fue de 100.000 [47.000-220.000], lo que eleva a 1,6 millones [1,4-1,9 millones] el número total de personas que viven con el VIH en esta región. Se calcula que 58.000 [49.000-91.000] personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida durante el pasado año.
- Prosigue la transmisión del VIH entre poblaciones con un mayor riesgo de exposición, incluidos los profesionales del sexo y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

- Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres constituyen un factor de riesgo importante en varias epidemias de la región.²
- El estigma y la discriminación generalizados en la región están obstaculizando los esfuerzos para alcanzar el acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH.
- Se requiere una mayor inversión para abordar las deficiencias de la vigilancia epidemiológica en América Latina.

América del Norte y Europa occidental y central

- En conjunto, unos 2,1 millones [1,1-3,0 millones] de personas en América del Norte y Europa occidental y central estaban viviendo con el VIH en 2007, incluidas las 78.000 [19.000-86.000] que contrajeron el VIH durante el pasado año. Unas 32.000 [20.000-84.000] personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el sida en 2007.
- Se ha registrado un incremento en el número de nuevos diagnósticos de VIH en Europa occidental desde 2002, mientras que en América del Norte la cifra anual de nuevas infecciones se ha mantenido relativamente estable.
- El acceso generalizado a tratamiento antirretrovírico eficaz ha contribuido a mantener comparativamente bajo el número de fallecimientos relacionados con el sida en esta región.

Oriente Medio y África del Norte

- Se estima que, en 2007, se produjeron 35.000 [16.000-65.000] nuevas infecciones por el VIH en esta región, con lo que el número total de personas que viven con el virus asciende a unas 380.000 [270.00-500.000]. Se calcula que 25.000 [20.000-34.000] personas fallecieron como consecuencia de enfermedades relacionadas con el sida en 2007.
- Se dispone de pocos datos en la región, y es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar la vigilancia epidemiológica y la recopilación de datos.
- La mayoría de las infecciones por el VIH incide en varones y en áreas urbanas, excepto en el **Sudán**, el país con la prevalencia más alta en la región, donde el coito heterosexual sin protección es el factor de riesgo más importante de infección por el VIH.
- Aunque las relaciones sexuales remuneradas no protegidas son un factor fundamental en las epidemias de VIH en toda la región, el consumo de drogas inyectables es el principal modo de transmisión en muchos países.

Oceanía

- Se estima que en **Oceanía** 14.000 [11.000-26.000] personas contrajeron el VIH durante 2007, lo que eleva a 75.000 [53.000-120.000] el número total de personas que viven con el virus en esta región. Unas 1.200 [<500-2.700] personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el sida en **Oceanía** a lo largo de 2007.

² Bolivia, Chile, Ecuador y Perú en Sudamérica, y El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá en América Central.

- Más del 70% del número total de personas infectadas por el VIH viven en **Papua Nueva Guinea**, donde la epidemia sigue creciendo, aunque los niveles son algo menores de lo que se creía anteriormente.
- En **Australia y Nueva Zelandia**, el VIH continúa transmitiéndose principalmente por medio de relaciones sexuales no protegidas entre hombres.

Contacto

Sophie Barton-Knott | ONUSIDA Ginebra | +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org.

El ONUSIDA es una iniciativa conjunta innovadora de las Naciones Unidas que reúne los esfuerzos y recursos de la Secretaría del ONUSIDA y diez organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la respuesta al sida. Con sede en Ginebra (Suiza), la Secretaría dispone de personal sobre el terreno en más de 80 países. La acción coherente del sistema de las Naciones Unidas sobre el sida se coordina en los países por medio de los Grupos Temáticos de las Naciones Unidas y los programas conjuntos sobre el sida. Los copatrocinadores del ONUSIDA son ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, FNUAP, ONUDD, OIT, UNESCO, OMS y el Banco Mundial. Visite la página web del ONUSIDA en www.unaids.org.