

Карибский регион

Общий обзор

- Карибский регион является вторым наиболее пострадавшим регионом мира после Африки к югу от Сахары; показатель распространенности ВИЧ здесь составляет 1,6%.
- В конце 2005 года число людей, живущих с ВИЧ в Карибском регионе, составляло 330 000 человек. Из них около 22 000 составляли дети моложе 15 лет.
- Взрослые женщины составляют 51% от общего числа людей, живущих с ВИЧ в регионе.
- В 2005 году, по оценкам, 37 000 человек заразились ВИЧ.
- СПИД является ведущей причиной смерти среди взрослых в возрасте 15–44 лет; по оценкам, в 2005 году от СПИДа умерли 27 000 человек.
- В 2005 году антиретровирусное лечение получали менее четверти (23%) всех нуждающихся.
- Уровни распространенности ВИЧ снизились в городских районах **Гаити**, но остаются стабильными в соседней **Доминиканской Республике**. Расширение доступа к антиретровирусному лечению на **Багамских Островах** и **Барбадосе**, вероятно, способствует снижению показателя смертности от СПИДа.

Ситуация в странах

- На **Гаити** проживает самое большое число ВИЧ-инфицированных по сравнению с другими странами региона – 190 000 человек. В 2005 году оценочный национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 3,8%.
- За период с 1993 по 2003–2004 годы процент беременных женщин, инфицированных ВИЧ, на **Гаити** снизился в два раза, особенно в городских районах, где показатель распространенности снизился с 9,4% в 1993 году до

3,7% в 2003 году. Несмотря на наличие данных, указывающих на распространение практики пользования презервативами, воздержания и сохранения верности, а также на уменьшение числа сексуальных партнеров, это снижение также обусловлено увеличением числа смертей в связи со СПИДом и повышением уровня безопасности крови на ранней стадии развития эпидемии. В 2005 году на **Гаити** антиретровирусное лечение получали менее 20% нуждающихся.

- Показатель распространенности ВИЧ в **Доминиканской Республике** начал снижаться в середине 1990-х годов, однако в последние годы он оставался относительно стабильным. В 2005 году оценочный национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 1,1%, причем, как и на Гаити, в 2005 году антиретровирусное лечение получали менее 20% нуждающихся.
- На **Багамских Островах** национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых является одним из самых высоких в регионе – 3,3%. Улучшение ведения и лечения больных СПИДом, вероятно, привело к уменьшению числа смертей в связи со СПИДом. Показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин снизился с 4% в середине 1990-х годов до менее 3% в 2005 году.
- Аналогичная ситуация наблюдается на **Барбадосе**, где в 2005 году национальный показатель распространенности ВИЧ составлял 1,5%. За период с 1998 по 2003 годы ежегодное число смертей от СПИДа уменьшилось в два раза. С 1999 по 2003 годы число беременных женщин, живущих с ВИЧ, уменьшилось в два раза. Расширение услуг по консультированию и тестированию, а также предоставление антиретровирусного лечения, позволили уменьшить число случаев передачи ВИЧ от матери ребенку на **Багамских Островах** и **Барбадосе**.
- В конце 2005 года показатель распространенности ВИЧ среди взрослых на **Кубе** составлял 0,1%. По оценкам, число людей, живущих с ВИЧ, составляло 4800 человек, а число людей, умерших от заболеваний, обусловленных СПИДом, составило менее 500 человек. Программа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку в этой стране является одной из наиболее эффективных в мире, в результате чего общее число младенцев, родившихся с ВИЧ, на данный момент составляет менее 100. **Куба** также предоставляет бесплатный всеобщий

доступ к антиретровирусному лечению, что позволило ограничить как число случаев СПИДа, так и смертность от СПИДа.

- В **Тринидаде и Тобаго** национальный показатель распространенности ВИЧ, по оценкам, составляет 2,6%, причем особенно страдают молодые женщины. Вероятность наличия ВИЧ среди девочек в возрасте 15–19 лет в шесть раз выше, чем среди мальчиков того же возраста.
- В **Гайане** развивается серьезная эпидемия: в 2005 году показатель распространенности ВИЧ составлял 2,4%, а СПИД был ведущей причиной смерти среди взрослых в возрасте 25–44 лет.
- Национальные уровни распространенности ВИЧ на **Ямайке**, вероятно, стабилизировались; появились признаки того, что показатель распространенности ВИЧ в некоторых районах страны снижается, поскольку все большее число жителей **Ямайки** принимают меры защиты против ВИЧ-инфекции. В 2005 году национальный показатель распространенности ВИЧ составлял 1,5%, а оценочное число взрослых и детей, живущих с ВИЧ, составляло 25 000 человек.

Лица для контактов

Софи Бартон-Нотт, | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org