

Латинская Америка

Общий обзор

- В 2005 году общее число людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, составляло 1,6 миллиона человек и около 140 000 человек заразились этим вирусом.
- В 2005 году число ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до 15 лет составляло около 32 000 человек и примерно 59 000 человек умерли от СПИДа.
- В конце 2005 года около 294 000 человек в Латинской Америке получали антиретровирусное лечение, что составляло 73% от общего оценочного числа в 404 000 человек, нуждающихся в таком лечении.
- В ряде стран Латинской Америки высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции (от 2% до 28%) обнаружены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. В то же время во многих странах другим значительным фактором в распространении ВИЧ является передача ВИЧ между женщинами-работницами секс-бизнеса и их клиентами. По мере созревания эпидемий растет число инфицированных женщин.

Ситуация в странах

- В **Бразилии** проживает более одной трети от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке (620 000 взрослых и детей), а национальный показатель распространенности ВИЧ в 2005 году составлял 0,5%.
- Число ВИЧ-инфекций, обусловленных небезопасной практикой употребления инъекционных наркотиков, уменьшается в ряде городов **Бразилии**, при этом обеспечен широкий доступ к лечению. В 2005 году антиретровирусное лечение получали примерно 170 000 из 209 000 человек, нуждающихся в таком лечении, включая 30 000 потребителей инъекционных наркотиков.
- В то же время растет число молодых людей, имеющих половые контакты в молодом возрасте с различными партнерами: по крайней мере треть (36%)

обследованных **бразильцев** в возрасте 15–24 лет указали, что у них были половые контакты в возрасте до 15 лет.

- В 2005 году число людей, живущих с ВИЧ в **Аргентине**, по оценкам, составляло 130 000 человек, а показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 0,6%. Основными факторами в развитии эпидемии в **Аргентине** являются употребление инъекционных наркотиков и незащищенный секс между мужчинами: почти каждый второй потребитель инъекционных наркотиков (44%), прошедший тестирование в Буэнос-Айресе, оказался инфицированным ВИЧ, а уровни распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, составляли 7%–15%. Заключенные, содержащиеся в крупных городских тюрьмах, относятся к наиболее пострадавшим группам населения. В 2004 году от 17% до 28% заключенных, обследованных в провинции Буэнос-Айрес, оказались инфицированы ВИЧ.
- Секс между мужчинами является одним из ведущих факторов в развитии эпидемий в **Боливии, Колумбии, Коста-Рике, Перу, Чили и Эквадоре**; высокие уровни распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, были обнаружены в Санта-Круссе, **Боливия** (24%), Кито, провинция Пичинча, и Гуаякиле, провинция Гуаяс, **Эквадор** (соответственно 17% и 23%) и Лиме, **Перу** (23%).
- В 2005 году в **Колумбии** число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 160 000 человек. В Боготе уровни распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, достигали 20%, в то время как тот же показатель среди женщин-работниц секс-бизнес составлял лишь 1%. Тем не менее женщины все чаще заражаются от партнеров-мужчин, которые также имеют половые контакты с мужчинами; среди женщин, имевших положительную реакцию на ВИЧ при обследовании в рамках проектов, направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку, 72% имели постоянные партнерские отношения.
- **Гондурас** является одной из наиболее пострадавших стран региона: в конце 2005 года национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 1,5%, и число людей, живущих с ВИЧ, составляло 63 000 человек. СПИД является ведущей причиной смерти среди **гондурасских** женщин. Факторами, способствующими развитию эпидемии в **Гондурасе**, являются платный секс и секс между мужчинами. Каждая двенадцатая женщина-работница секс-бизнес имела положительную реакцию на ВИЧ в столице страны

Тегусигальпе, а показатели распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в Тегусигальпе и Сан-Педро-Сула составляли соответственно 8% и 16%.

- Аналогичная ситуация существует в **Гватемале**, где число людей, живущих с ВИЧ, составляет 61 000 человек, а национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составляет 0,9%. В городе Гватемала показатель распространенности ВИЧ среди работников секс-бизнеса, работающих на улице, составлял 15%, а среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, 12%.
- Интенсивная эпидемия развивается в **Белизе**, где в 2005 году национальный показатель распространенности ВИЧ среди взрослых составлял 2,5%. Секс между мужчинами является скрытым, но сильным фактором развития эпидемии не только в **Белизе**, но также в **Никарагуа, Панаме и Сальвадоре**.
- Несмотря на то что в **Мексике** показатель распространенности ВИЧ среди взрослых остается низким (0,3%), в 2005 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ, составляло 180 000 человек – причем две третьих из них составляли мужчины, которые, как считается, заразились в результате половых контактов с другими мужчинами. Имеются признаки роста передачи ВИЧ в результате гетеросексуальных контактов, поскольку все большее число женщин заражается от своих партнеров, которые также имеют контакты с мужчинами.

Лица для контактов

Софи Бартон-Нотт, | ЮНЭЙДС, Женева | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org