

América del Norte y Europa occidental y central

Panorama general

- En América del Norte y Europa occidental y central, en 2005 había unos dos millones de personas que vivían con el VIH, y 65 000 se infectaron por el virus.
- El acceso generalizado a la terapia antirretrovírica mantuvo relativamente bajo el número de fallecimientos relacionados con el SIDA (cerca de 30 000) en 2005.
- Las respuestas al SIDA no están en consonancia con los cambios en las epidemias de América del Norte y Europa occidental y central, y existe la necesidad urgente de mejorar los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH para inmigrantes y migrantes, minorías étnicas y varones que tienen relaciones sexuales con varones.

Tendencias en los países

- El número de personas que viven con el VIH en los **Estados Unidos** ha alcanzado su nivel máximo en la historia, con 1,2 millones de personas VIH-positivas en 2005 y una prevalencia nacional del VIH en adultos del 0,6%.
- El acceso generalizado a la terapia antirretrovírica en los **Estados Unidos** ha mantenido relativamente bajo el número de fallecimientos relacionados con el SIDA (alrededor de 16 000 en 2005). Sin embargo, los logros iniciales en el frente de la prevención no se han mantenido, y el número de nuevos casos registrados de VIH sólo ha variado ligeramente desde finales de los años 1990. La mitad de todas las infecciones por el VIH diagnosticadas en 2004 correspondió a varones que tienen relaciones sexuales con varones, y varios estudios han aportado pruebas de un resurgimiento de comportamientos de riesgo en este grupo.

- Cada vez hay más mujeres infectadas en los **Estados Unidos**. En 2003, una de cada cuatro mujeres con nuevo diagnóstico de VIH se había infectado inyectándose drogas. El SIDA es la principal causa de mortalidad entre las mujeres afroamericanas de 25-34 años (el 78% de las cuales se infectaron por transmisión heterosexual).
- Los afroamericanos constituyen poco más del 12% de la población de los **Estados Unidos**, pero representan el 50% de todos los nuevos diagnósticos de VIH; además, tienen la mitad de probabilidades de recibir terapia antirretrovírica en comparación con otros grupos de población.
- La epidemia del **Canadá** es mucho menor, y el número anual de nuevas infecciones por el VIH se ha mantenido en torno a 2500 desde 2002. Las relaciones sexuales no protegidas entre varones siguen siendo el principal modo de transmisión (43% de los nuevos diagnósticos durante los seis primeros meses de 2005), y se está infectando un mayor número de mujeres. En 2004, las mujeres representaron el 27% de los nuevos diagnósticos, frente a poco más del 10% en 1995.
- La epidemia del **Canadá** está teniendo un impacto desproporcionado entre los aborígenes. Aunque sólo representan un 3% de la población total, padecen el 5-8% de las nuevas infecciones por el VIH.
- En **Europa occidental** y **central** se estima que había unas 720 000 personas que vivían con el VIH en 2005. El coito heterosexual constituye el principal modo de transmisión en varios países.
- En el **Reino Unido**, el número anual de nuevos diagnósticos de VIH se ha duplicado desde 2000, hasta alcanzar unos 7700 en 2005. Este incremento se atribuye mayoritariamente a la transmisión heterosexual, y más de las tres cuartas partes (77%) de las nuevas infecciones se contrajeron en países de alta prevalencia.
- Las relaciones sexuales peligrosas entre varones siguen siendo un factor importante en la epidemia del **Reino Unido**, con una contribución aproximada de

un tercio de las nuevas infecciones por el VIH. Además, los estudios indican que no están disminuyendo los comportamientos sexuales de riesgo en este grupo.

- En **Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia y Suecia**, al menos un tercio de las infecciones por el VIH atribuibles a coito heterosexual se contrajeron probablemente en el extranjero, sobre todo en África subsahariana.
- En la actualidad, cerca de la mitad (49%) de todas las nuevas infecciones por el VIH en **Alemania** son atribuibles a relaciones sexuales peligrosas entre varones, en comparación con poco más de un tercio (37%) en 2001.
- En 2005 había unas 140 000 personas que vivían con el VIH en **España**. En ese país, la introducción de programas de tratamiento con metadona y de intercambio de agujas durante los años 1990 ha reducido notablemente el número de infecciones por el VIH entre consumidores de drogas intravenosas.
- En **Portugal** se calcula que en 2005 había 32 000 personas que vivían con el VIH. En 2004 se registraron 2400 nuevos diagnósticos de VIH entre consumidores de drogas intravenosas, lo que supone menos de la mitad que en 2000.
- Los casos anuales de VIH en **Polonia** han aumentado progresivamente desde 2001, y en 2005 había una cifra estimada de 25 000 personas que vivían con el VIH. Las relaciones sexuales sin protección, tanto heterosexuales como entre varones, constituyen la principal causa de este incremento.

Contacto

Sophie Barton-Knott / ONUSIDA Ginebra / tel. +41 22 791 1697 / bartonknotts@unaid.org.