

Информационный бюллетень

Источник: Развитие эпидемии СПИДа-2007 - региональное резюме

Северная Америка, Западная и Центральная Европа

Региональный обзор

- В этих регионах общее число людей, живущих с ВИЧ, продолжает расти, что в большой степени обусловлено распространением антиретровирусной терапии, которая продлевает жизнь, сохраняющимся относительно неизменным числом новых ВИЧ-инфекций в год в Северной Америке и увеличением по сравнению с 2002 годом числа новых ВИЧ-инфекций в Западной Европе.
- В 2005 году в Северной Америке на долю незащищенного секса между мужчинами приходилась самая большая доля новых ВИЧ-инфекций: 53% в **Соединенных Штатах Америки** и 45% в **Канаде**.
- Воздействие эпидемий ВИЧ на афро-американцев в **Соединенных Штатах Америки** и представителей коренного населения в **Канаде** продолжает оставаться непропорционально большим.
- В 2006 году в Западной Европе самую большую долю (42%) составляли ВИЧ-инфекции в результате гетеросексуальных половых отношений. Менее одной трети случаев (29%) приходилось на долю небезопасного секса между мужчинами, и продолжала уменьшаться доля случаев (6%), зарегистрированных среди людей, употребляющих наркотики. Большинство случаев ВИЧ-инфекции в результате гетеросексуальной передачи возникли в странах Африки к югу от Сахары с высокой распространенностью; в рамках этой группы более 50% приходилось на долю женщин.
- Благодаря широкому доступу к антиретровирусному лечению число связанных со СПИДом смертей в этих регионах продолжало оставаться относительно низким.

Страновые данные и тенденции

- В **Соединенных Штатах Америки** наиболее распространенным способом передачи ВИЧ продолжает оставаться незащищенный секс между мужчинами. Число новых диагнозов ВИЧ в год среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами (включая тех, кто также является потребителем инъекционных наркотиков), увеличилось с 17 699 в 2001 году до 19 620 в 2005 году.
- В отличие от этого, доля женщин взрослого и подросткового возраста, у которых в том же году был впервые обнаружен ВИЧ и которые приобрели его в результате незащищенных половых связей, часто с партнерами-мужчинами, заразившимися в результате использования нестерильного инъекционного инструментария, платного секса или секса с другими мужчинами, увеличилась с 75% в 2001 году до 80%.
- Почти половина (48%) новых диагнозов ВИЧ-инфекции была установлена среди афро-американцев и 18% - среди испаноговорящего населения (которые составляют 13 и 14 процентов населения **Соединенных Штатов Америки** соответственно).

Объединим мир против **СПИДа**

- В 2007 году о последствиях расширения доступа к эффективной антиретровирусной терапии в **Соединенных Штатах Америки** была получена дополнительная информация. Согласно исследованию в шести штатах, в период с 2000 по 2004 годы госпитализация среди людей, живущих с ВИЧ, упала на 44%, и средний возраст поступающих в больницу людей, живущих с ВИЧ, увеличился.
- В конце 2005 года в **Канаде** насчитывалось 58 000 людей, живущих с ВИЧ. Обеспокоенность вызывают оценки, согласно которым по крайней мере четверть людей, живущих с ВИЧ, в этой стране не знают о том, что они инфицированы.
- Хотя коренное население в **Канаде** составляет чуть более 3% всего населения, по оценкам, на его долю приходится 7,5% людей, живущих с ВИЧ, а также 9% новых ВИЧ-инфекций в 2005 году.
- В **Соединенном Королевстве** по-прежнему наблюдается широкая эпидемия ВИЧ, причем за период с 2001 по 2006 годы число впервые диагностированных ВИЧ-инфекций более чем удвоилось, и наибольшему риску ВИЧ-инфицирования внутри страны подвергаются мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами.
- За период с 2002 по 2006 годы число случаев ВИЧ-инфекции среди мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, почти удвоилось в **Германии** (где их число выросло на 87%), увеличилось на три четверти (на 77%) в **Швейцарии**, на две трети (на 67%) в **Бельгии** и на одну треть (на 31%) в **Соединенном Королевстве**.
- За период с 2002 по 2006 годы число случаев ВИЧ-инфицирования в **Германии** увеличилось почти на 50%, и мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами, составляли около 60% всего числа людей, живущих с ВИЧ, которых в конце 2006 года насчитывалось 56 000 человек. В 2006 году на долю небезопасного секса между мужчинами приходилось 70% случаев ВИЧ-инфекции.
- За период с 2002 по 2006 годы число новых случаев ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков в нескольких европейских странах снизилось, наиболее заметно в **Дании** (на 72%), **Италии** (на 42% в 2002-2005 годах), **Нидерландах** (на 91%), **Португалии** (на 38%), **Испании** (на 38% в 2003-2005 годах) и **Швейцарии** (на 26%). Исследования в **Нидерландах** и **Испании** показывают, что благодаря программам снижения вреда уменьшается потребление инъекционных наркотиков и использование нестерильных материалов.
- Незащищенный секс между мужчинами и женщинами является главным способом распространения инфекции во многих странах Центральной Европы, включая **Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Румынию и Турцию**. Небезопасный секс между мужчинами доминирует в **Хорватии, Чешской Республике, Венгрии и Словении**.
- Число ВИЧ-инфекций в **Эстонии** снизилось с пикового значения в 1 474 случая в 2001 году до 668 случаев в 2006 году. Несмотря на это резкое сокращение, эта страна по-прежнему имеет намного более высокий показатель впервые регистрируемых случаев ВИЧ-инфекции и, по оценкам, самую высокую национальную распространенность среди взрослого населения (1,3%) во всей Европе.

Контакт:

Софии Бартон-Кнотт | ЮНЭЙДС, Женева | Тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaid.org