

## Карибский бассейн

### Последние эпидемиологические тенденции

- В 2008 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ в Карибском бассейне, составило 240 000 [220 000–260 000] человек, оценочное число новых случаев ВИЧ составило 20 000 [16 000–24 000] и около 12 000 [9300–14 000] человек умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом.
- Карибский бассейн сильно затронут этой эпидемией, уступая только Африке к югу от Сахары, и имеет второй в мире показатель распространенности ВИЧ среди взрослых (1,0% [0,9–1,1%]).
- В Карибском бассейне имеют место генерализованные и концентрированные эпидемии.
- Примерно половина всех ВИЧ-инфекций, регистрируемых в Карибском бассейне, приходится на женщин. Показатель распространенности ВИЧ является особенно высоким среди молодых женщин.
- В 2006–2007 годах показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин в **Гаити** колебался от 0,8% на западе страны до 11,8% в одном из городских районов.
- В региональном масштабе число новых ВИЧ-инфекций стабилизировалось; исключение составляет **Куба**, где показатель распространенности остается низким, но, по имеющимся данным, растет.
- В **Доминиканской Республике** отмечается снижение уровня распространенности ВИЧ, что обусловлено изменениями в сексуальном поведении, включая более частое пользование презервативами и уменьшение числа партнеров.
- Несмотря на то что **Гаити** имеет самый высокий показатель распространенности ВИЧ в регионе, с начала 1990-х годов этот показатель снизился.
- Охват лечением в регионе увеличился с 10% в 2004 году до 51% к концу 2008 года – это выше среднего глобального уровня охвата для стран с низким и средним уровнем доходов (42%). По состоянию на декабрь 2008 года охват антиретровирусным лечением среди детей в Карибском бассейне (55%) также превышал глобальный показатель (38%).

### Динамика развития эпидемии в регионе

- Основным источником передачи ВИЧ в регионе являются гетеросексуальные контакты, часто ассоциируемые с секс-бизнесом.
- Обследования, проведенные в регионе, дали высокие показатели распространения ВИЧ среди работников секс-бизнеса – 27% в **Гайане** и 9% на **Ямайке** в 2005 году.
- Имеющиеся данные указывают на высокий уровень передачи ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

- По данным обследования, проведенного в 2006 году в **Тринидаде и Тобаго**, 20,4% мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, оказались инфицированными ВИЧ. Такое же обследование, проведенное на **Ямайке**, дало показатель распространенности ВИЧ на уровне 31%. Секс между мужчинами также, вероятно, способствует росту показателя распространенности ВИЧ на **Кубе**.
- Несмотря на то что употребление инъекционных наркотиков играет относительно скромную роль в развитии эпидемии в Карибском бассейне, это основной путь передачи ВИЧ в **Пуэрто-Рико**, где в 2006 году 40% новых ВИЧ-инфекций приходилось на мужчин и 27% на женщин.

Для контактов:

Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org) | [www.unaids.org](http://www.unaids.org)