

Профилактика ВИЧ

- Процент ВИЧ-позитивных беременных женщин, получающих **лечение для профилактики передачи от матери ребенку, увеличился с 35% в 2007 году до 45% в 2008 году.**
- Последние данные указывают на то, что менее **40% молодых людей имеют основную информацию о ВИЧ** и менее 40% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус.
- Число новых ВИЧ-инфекций по-прежнему опережает число людей, получающих лечение: на каждые **два человека, начинающих лечение, приходится пять новых случаев заражения ВИЧ.**

Лечение

- По состоянию на конец 2008 года в странах с низким и средним уровнем доходов **доступ к лечению имели более 4 миллионов человек**, в то время как в конце 2007 года это число составляло 3 миллиона человек.
- Это составляет **рост на 36% за один год** и рост в 10 раз за период в 5 лет.
- По оценкам, в 2008 году **в странах с высоким уровнем доходов лечение получали 700 000 человек**, таким образом, общее число людей, получающих лечение **во всем мире, составило не менее 4,7 миллиона человек.**
- Несмотря на значительный прогресс, глобальный охват остается низким: в 2008 году **лишь 42% людей, нуждающихся в лечении, имели доступ к такому лечению (33% в 2007 году).**
- В 2008 году **лишь 38% детей, нуждающихся в лечении, получали такое лечение** в странах с низким и средним уровнем доходов.

Охват антиретровирусной терапией (АРТ) в 2008 году

Географический регион	Число людей, получающих АРТ, дек. 2008 г.	Число людей, нуждающихся в АРТ, 2008 г.	Охват АРТ, дек. 2008 г.	Число людей, получающих АРТ, дек. 2007 г.	Число людей, нуждающихся в АРТ, 2007	Охват АРТ, дек. 2007 г.
Африка к югу от Сахары	2,9 миллиона	6,7 миллиона	44%	2,1 миллиона	6,4 миллиона	33%
Латинская Америка и Карибский бассейн	445 000	820 000	54%	390 000	770 000	50%
Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия	565 000	1,5 миллиона	37%	420 000	1,5 миллиона	29%
Европа, Центральная Азия	85 000	370 000	23%	54 000	340 000	16%
Ближний Восток и Северная Африка	10 000	68 000	14%	7000	63 000	11%
Всего	4 миллиона	9,5 миллиона	42%	2,97 миллиона	9 миллионов	33%

Источник: *Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: progress report 2009*, WHO/UNAIDS/UNICEF, September 2009.

Туберкулез и ВИЧ

- **Одна треть людей, живущих с ВИЧ, имеет также ТБ.** Туберкулез является одной из основных причин смерти среди людей, живущих с ВИЧ, и в то же время ТБ, как правило, можно излечить и предупредить.

Имеющиеся ресурсы и потребности

- По оценкам, в 2008 году объем средств, выделяемых в связи с ВИЧ из всех источников, **составил 15,6 миллиарда долларов США.**
- По оценкам ЮНЭЙДС, **в 2010 году** для оказания услуг в связи с ВИЧ потребуется **25 миллиардов долларов США.**

Для контактов:

Пресс-офис ЮНЭЙДС | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org | www.unaids.org