

## Латинская Америка

### Последние эпидемиологические тенденции

- В 2008 году число новых ВИЧ-инфекций в Латинской Америке составило 170 000 [150 000–200 000], в результате чего общее число людей, живущих с ВИЧ в регионе, увеличилось до 2 [1,8–2,2] миллионов человек. По оценкам, число людей, умерших в прошлом году от заболеваний, обусловленных СПИДом, составило 77 000 [66 000–89 000] человек.
- Согласно последним данным эпидемия в Латинской Америке остается стабильной. Поскольку региональный показатель распространенности ВИЧ составляет 0,6%, в Латинской Америке в основном развиваются эпидемии низкого уровня и концентрированные эпидемии.
- В этом регионе число ВИЧ-инфекций среди мужчин намного больше, чем среди женщин, что в значительной мере обусловлено высоким уровнем передачи ВИЧ половым путем между мужчинами. В **Перу** число случаев СПИДа, отмеченных среди мужчин в 2008 году, почти в три раза превышало число таких случаев среди женщин.
- Даже несмотря на то что эпидемии ВИЧ в этом регионе в основном концентрируются среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, работников секс-бизнеса и потребителей инъекционных наркотиков, лишь небольшая доля программ профилактики нацелена на эти группы населения. Тем не менее **Мексика** в последние годы увеличила объем финансирования услуг по профилактике, нацеленных на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
- Охват антиретровирусной терапией в Латинской Америке выше глобального показателя (54% в 2008 году), причем в целом уровень охвата выше в Южной Америке по сравнению с Центральной Америкой.

### Динамика развития эпидемии в регионе

- На мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, приходится самая большая доля ВИЧ-инфекций в Латинской Америке. Среди них вероятность заражения ВИЧ составляет один к трем.
- Показатель распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, колеблется от 7,9% в **Сальвадоре** до 25,6% в **Мексике**. В **Перу** на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, приходилось 55% новых случаев ВИЧ.
- По оценкам, 29% из более 2 миллионов латиноамериканцев, употребляющих инъекционные наркотики, инфицированы ВИЧ.
- Эпидемии среди потребителей инъекционных наркотиков в регионе в основном концентрируются в южной части Южной Америки, а также на севере **Мексики** вдоль границы с США.

- Шесть стран региона осуществляют различные компоненты программ снижения вреда, хотя заместительная терапия от опиоидной зависимости широко не распространена.
- Процент женского населения, занятого в секс-бизнесе в Латинской Америке, колеблется от 0,2% до 1,5%. В **Перу** 44% мужчин указали на то, что в прошлом у них были половые контакты с работницами секс-бизнеса.
- По данным обследований, проведенных в Центральной Америке, показатель распространенности ВИЧ среди женщин-работниц секс-бизнеса составил 4,3% в **Гватемале** и 3,2% в **Сальвадоре**. В **Аргентине** уровень распространенности ВИЧ значительно выше среди мужчин, занятых в секс-бизнесе (22,8%), чем среди женщин-работниц секс-бизнеса (1,8%).
- Появляются новые данные, указывающие на то, что программы по профилактике ВИЧ могут оказывать влияние на работников секс-бизнеса в Латинской Америке. При проведении последних обследований женщины, занятые в секс-бизнесе в Сантьяго, **Чили**, **Сальвадоре**, **Гондурасе** и **Гватемале**, указали на то, что они часто пользовались презервативами во время контактов с клиентами, что привело к снижению уровня заражения ВИЧ.
- Несмотря на то что передача ВИЧ гетеросексуальным путем вне сферы секс-бизнеса до сих пор играла ограниченную роль в Латинской Америке, здесь существует риск дальнейшего распространения инфекции. Более одной пятой (22%) мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, обследованных в пяти странах Центральной Америки, указали на то, что у них были контакты как с мужчинами, так и с женщинами.
- В **Перу** 6% новых случаев ВИЧ приходится на женщин, являющихся половыми партнерами мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
- По мере развития эпидемий частота передачи ВИЧ в результате гетеросексуальных контактов зачастую растет. В **Перу** на различные виды гетеросексуальной передачи приходится до 43% новых ВИЧ-инфекций.
- Бремя ВИЧ, вероятно, растет среди женщин в Центральной Америке, а также среди коренного населения.

Для контактов:

Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org) | [www.unaids.org](http://www.unaids.org)