

## Ближний Восток и Северная Африка

### Последние эпидемиологические тенденции

- По оценкам, в 2008 году на Ближнем Востоке и в Северной Африке ВИЧ заразились 35 000 [24 000–46 000] человек и 20 000 [15 000–25 000] человек умерли от заболеваний, обусловленных СПИДом. Общее число людей, живущих с ВИЧ в регионе, возросло с 200 000 [150 000–250 000] в 2001 году до 310 000 [250 000–380 000] в 2008 году.
- Острая нехватка своевременных и надежных эпидемиологических и поведенческих данных затрудняет четкое понимание динамики и тенденций в связи с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
- Хотя эпидемии в регионе несравнимы с эпидемиями в странах Африки к югу от Сахары, существует потребность в значительном усилении мер в ответ на СПИД в регионе.
- В большинстве стран этого региона уровень распространенности ВИЧ остается низким. Исключения из этого общего правила наблюдаются в **Джибути** и на юге **Судана**, где распространенность ВИЧ среди беременных женщин сегодня превышает 1%.
- Исследования показывают, что все больше людей заражаются ВИЧ за рубежом, зачастую подвергая своих половых партнеров риску инфицирования после возвращения в родную страну.
- Большое число мужчин-гастарбайтеров из Южной Азии, которые работают на Ближнем Востоке и в Северной Африке, подвергаются риску инфицирования вследствие контактов с работниками секс-бизнеса в регионе.
- Охват антиретровирусной терапией остается низким во всем регионе – в 2008 году всего 14% людей, нуждающихся в лечении, получали его.
- Определенный прогресс отмечается в пропаганде тестирования на ВИЧ, хотя число людей, прошедших тестирование, остается низким. В период с 2007 по 2008 годы число людей, прошедших консультирование и тестирование на ВИЧ в Йемене, возросло в 18 раз – со 121 до 2176 человек. С 2001 по 2007 годы в **Марокко** число людей, прошедших тестирование, возросло в 24 раза – с 1500 до 35 458 человек.

### Динамика развития эпидемии в регионе

- Эпидемии на Ближнем Востоке и в Северной Африке, как правило, сконцентрированы среди потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, работников секс-бизнеса и их клиентов. Исключением из этой общей модели являются **Джибути** и южный район **Судана**, где передача вируса также происходит среди населения в целом.
- Повышенные уровни ВИЧ-инфекции были выявлены в сетях потребителей наркотиков в нескольких странах; средние оценочные показатели распространенности среди потребителей инъекционных наркотиков составили

11,8% в **Омане**, 6,5% в **Марокко**, 2,9% в **Израиле**, 2,6% в **Египте** и 2,6% в **Турции**.

- Данные о мужчинах, имеющих половые контакты с мужчинами, крайне ограничен, учитывая то, что секс между мужчинами подвергается сильной стигматизации в этом регионе.
- По данным обследований, от 7,8% до 9,3% мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, были инфицированы ВИЧ в **Судане**, 6,3% в **Египте**, 4% в **Марокко** и 1% в **Ливане**.
- Хотя большинство исследований, проведенных в этом регионе, не выявили высоких уровней ВИЧ среди женщин секс-бизнеса, распространенность ВИЧ на уровне 26% была обнаружена среди женщин секс-бизнеса в **Джибути**. В **Йемене** показатели распространенности колеблются от 1,3% до 7%.

Контакты:

Софи Бартон-Нотт | +41 22 791 1697 | [bartonknotts@unaids.org](mailto:bartonknotts@unaids.org) | [www.unaids.org](http://www.unaids.org)