



Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

ЮНЭЙДС

УВКБ • ЮНИСЕФ • МПП • ПРООН • ЮНФПА
ЮНОДК • МОТ • ЮНЕСКО • ВОЗ • ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Информационный бюллетень

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Сегодня в Латинской Америке живет более 1,7 миллиона ВИЧ-инфицированных. В 2004 году около 95 000 человек умерли от СПИДа, а 240 000 человек были инфицированы. В настоящее время в регионе насчитывается около 610 000 женщин, живущих с ВИЧ.

- В двух странах этого региона - Гватемале и Гондурасе - уровень национальной распространенности ВИЧ среди взрослого населения превышает 1%. Однако за более низкими уровнями распространенности в других странах скрывается тот факт, что в нескольких странах развиваются серьезные локализованные эпидемии.
- В Бразилии проживает более трети всех ВИЧ-инфицированных Латинской Америки.
- Эпидемия в Бразилии сначала поражала в основном мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, а затем потребителей инъекционных наркотиков. Однако эпидемия приобрела более неоднородный характер, и сегодня на гетеросексуальный путь передачи приходится все большее число новых случаев ВИЧ-инфекции, которая все чаще поражает женщин.
- Не следует недооценивать роль потребления инъекционных наркотиков в Бразилии. В некоторых районах страны на потребителей инъекционных наркотиков приходится как минимум половина всех случаев СПИДа. Однако в последние годы благодаря программам снижения вреда в некоторых городах удалось добиться резкого снижения распространенности ВИЧ среди ПИН—особенно это заметно в Сальвадоре, где уровень распространенности снизился с 50% в 1996 до 7% в 2001 гг.
- В Аргентине ВИЧ-инфекция в основном сосредоточена в городских районах Буэнос-Айреса, провинций Кордова и Санта-Фе; по оценкам, 65% всех случаев ВИЧ-инфекции происходит в столице страны Буэнос-Айресе и прилегающих районах. Однако характер эпидемии меняется. Хотя на протяжении 80-х и почти всех 90-х годов прошлого века передача ВИЧ происходила в основном при потреблении инъекционных наркотиков, в настоящее время на передачу ВИЧ половым путем—в основном от инфицированных потребителей наркотиков их партнерам женского и/или мужского пола - приходится примерно 80% всех зарегистрированных случаев СПИДа.
- Исследование, проведенное среди населения в целом в 24 перуанских городах, показало, что 44% мужчин в возрасте 18-29 лет пользовались платными сексуальными услугами (45% из них непостоянно пользовались презервативами при контактах с работниками секс-бизнеса), а 12% занимались сексом с другими мужчинами (68% также не всегда

Latin America Fact Sheet Ru | 24-27/07/2005

использовали презервативы при таких контактах).

- В Центральной Америке, где эпидемия в большой степени сконцентрирована в крупных городах, число случаев ВИЧ-инфекции постоянно растет в нескольких странах (включая Сальвадор, Никарагуа и Панаму) с конца 90-х годов, однако самый высокий уровень распространенности отмечается в Гватемале и Гондурасе. В большинстве стран среди людей, живущих с ВИЧ, число мужчин превышает число женщин примерно в три раза.
- Гондурас является наиболее сильно пострадавшей страной. Распространенность ВИЧ среди взрослого населения здесь составляет почти 2%, что означает, что в конце 2003 года около 63 000 человек в стране жили с ВИЧ. По оценкам, среди причин смертности в Гондурасе болезни, связанные со СПИДом, занимают второе место.
- В большинстве стран Центральной Америки уличные работники секс-бизнеса подвергаются в два раза более высокому риску ВИЧ-инфицирования, чем их «коллеги», работающие в публичных домах, барах и отелях.
- Секс между мужчинами является основным движущим фактором эпидемии во всем регионе, особенно в Коста-Рике. В 1998-2002 гг. более половины случаев СПИДа в этой стране было отмечено именно среди МСМ, значительная часть которых также занимались сексом с женщинами.
- В нескольких странах до сих пор существует явное несоответствие между приоритетами в расходах на профилактику и развитием эпидемии в стране.
- Большинство стран направляет львиную долю средств на профилактику для организации программ для работников секс-бизнеса. Расходы на профилактику не отражают того факта, что секс между мужчинами является движущей силой эпидемии во всем регионе.
- В области лечения Бразилия остается «маяком» среди развивающихся стран. Она продолжает обеспечивать для всех людей, живущих с ВИЧ, доступ к антиретровирусным препаратам в рамках национальной системы здравоохранения. В результате продолжительность жизни больных СПИДом серьезно возросла. Данные недавнего проведенного исследования показали, что средняя продолжительность жизни больных, которым диагноз был поставлен в 80-е годы, составляла только пять месяцев, в то время как средняя продолжительность жизни тех, кому диагноз был поставлен в 1996 году, достигла почти 5 лет.
- В нескольких других странах, включая Аргентину, Коста-Рику и Панаму, после расширения доступа к антиретровирусному лечению уменьшилось число случаев СПИДа и снизилась смертность от СПИДа.

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Аннемари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС www.unaids.org.