



Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

**ЮНЭЙДС**

УВКБ • ЮНИСЕФ • МПП • ПРООН • ЮНФПА  
ЮНОДК • МОТ • ЮНЕСКО • ВОЗ • ВСЕМИРНЫЙ БАНК

# Информационный бюллетень

## АЗИЯ

*Азия не просто огромна, но и многообразна, и такое же разнообразие можно наблюдать в эпидемиях ВИЧ в этом регионе - характер, темпы и степень тяжести эпидемий отличаются по всему региону. Общациональные уровни распространения ВИЧ в Азии являются низкими по сравнению с некоторыми другими континентами, в частности с Африкой. Однако численность населения во многих странах Азии столь велика, что даже низкий показатель распространенности ВИЧ означает большое число людей, живущих с ВИЧ.*

- Оценки показывают, что число людей, живущих с ВИЧ, составляло около 8,2 миллиона человек, включая 1,2 миллиона человек, заразившихся за последний год. С 2002 года число женщин, живущих с ВИЧ, возросло на 56%, и сегодня в регионе около 2,3 миллиона женщин живут с вирусом. В 2004 году от СПИДа в Азии умерло около 540 000 человек
- Темпы и степень тяжести эпидемий в Азии отличаются. Некоторые страны пострадали на ранней стадии (например, Камбоджа, Мьянма и Таиланд), в то время как другие только сейчас начинают ощущать быстрый рост эпидемий, и им требуются быстрые и эффективные ответные меры. Сюда входит Индонезия, Непал и Вьетнам, а также ряд провинций Китая.
- В других странах по-прежнему регистрируются очень низкие уровни распространенности ВИЧ, даже среди лиц, которым грозит высокий риск ВИЧ, и имеются прекрасные возможности для того, чтобы предупредить серьезные вспышки. Эти страны включают Бангладеш, Восточный Тимор, Лаос, Пакистан и Филиппины.
- Эпидемия ВИЧ сегодня охватила все из 31 административной единицы Китая: провинции, автономные районы и муниципалитеты. Нынешнее распространение ВИЧ в Китае в значительной степени обусловлено употреблением инъекционных наркотиков и коммерческим сексом. Однако передача ВИЧ половым путем от потребителей инъекционных наркотиков их сексуальным партнерам играет все более заметную роль в развитии эпидемии в Китае.
- Имеются признаки того, что усилия, направленные на повышение уровня информированности населения о ВИЧ, приносят свои плоды, однако многое можно улучшить. Исследование, проведенное в 2003 году, показало, что две пятых мужчин и женщин в Китае не могли назвать ни одного способа защиты от инфекции.
- В 2003 году в Индии около 5,1 миллиона человек жили с ВИЧ. Серьезные эпидемии развиваются в ряде штатов. В штате Тамилнад показатель распространенности ВИЧ среди работников секс-бизнеса оказался 50%.
- Есть признаки того, что употребление инъекционных наркотиков играет более существенную роль в развитии эпидемий в Индии, чем считалось ранее. Например, в южном городе Ченнаи, когда в 2000 году здесь был организован участок для проведения эпиднадзора, 26% потребителей инъекционных наркотиков уже оказались ВИЧ-инфицированными; к 2003 году процент инфицированных составлял 64%.
- В Бангладеш отмечена поразительная связь между участием в программах обмена шприцев и снижением практики использования нестерильного инъекционного инструментария. Это наглядно демонстрирует, что программы, направленные на формирование более безопасного инъекционного поведения, позволяют людям установить контакт с различными службами профилактики ВИЧ, которые помогают им снизить риск инфицирования половым путем или через инъекционное поведение.
- Поскольку эпидемии СПИДа пересекают национальные границы, такие совместные усилия, как программа обмена шприцев, осуществлявшаяся в приграничных районах

Китая и Вьетнама с 2002 года, имеют смысл. В основе программы лежит успешно проведенное испытание, которое показало уменьшение практики использования нестерильного инъекционного инструментария за предшествующий месяц с 61% до 30% среди всех потребителей инъекционных наркотиков в Гуанси.

- На таком большом архипелаге как Индонезия, где исследования показали наличие широких возможностей для распространения передачи ВИЧ, эпидемия приобретет разнообразные формы. В настоящее время каждый второй потребитель инъекционных наркотиков в столице Индонезии Джакарте имеет положительную реакцию на ВИЧ, тем временем в таких отдаленных городах, как Понтианак, более 70% потребителей инъекционных наркотиков, обращающихся по поводу тестирования на ВИЧ, обнаруживают, что они инфицированы ВИЧ.
- Широкое распространение инъекционных наркотиков среди работников секс-бизнеса делает эпидемию во Вьетнаме особенно взрывоопасной.
- В Мьянме исключительно высокое число потребителей инъекционных наркотиков инфицировано ВИЧ. В 2003 году в некоторых местах положительную реакцию на ВИЧ имели 78% потребителей инъекционных наркотиков. Показатель распространенности ВИЧ среди работников секс-бизнеса значительно вырос примерно с 5% в 1992 г. до 31% в 2003 г.
- В большинстве случаев заражение ВИЧ-инфекцией в Азии происходит, когда мужчины покупают платные сексуальные услуги – и число таких мужчин велико. Обследования домохозяйств в ряде стран Азии указывают на то, что сексуальные услуги покупают от 5% до 10% мужчин, что делает коммерческий секс крупным и доходным бизнесом в Азии. Многие из этих мужчин женаты или имеют постоянных партнеров, поэтому им грозит не только риск заражения ВИЧ, но и риск передачи этой инфекции женам или подругам.
- Большинство работников секс-бизнеса, которые не пользовались презервативами во время контактов со своим последним клиентом в местах, где презервативы были легко доступными, объяснили это тем, что их клиенты не захотели ими воспользоваться. В Индии четвертая часть работников секс-бизнеса, работающих на улице, указали на то, что, если клиент отказывался пользоваться презервативом, они просто повышали оплату и обслуживали клиента. Работники секс-бизнеса в китайской провинции Юньнань отметили, что они зарабатывают примерно на 60% больше за секс без презерватива,
- Страны Азии, которые внедрились у себя масштабные программы профилактики для борьбы с передачей ВИЧ половым путем, добились значительного снижения рискованного поведения, а также снижения уровня новых ВИЧ-инфекций. Это показывает, что страны, которые решают предоставлять широкие услуги по профилактике наиболее нуждающимся группам населения, могут установить контроль над эпидемией.
- В Камбодже уменьшилось число мужчин, посещающих работников секс-бизнеса, а показатель использования презервативов при коммерческом сексе значительно вырос.
- Таиланд также продемонстрировал, что правильно финансируемые, прагматичные ответные меры, поддерживаемые на политическом уровне, способны изменить ход эпидемии. Общенациональная распространенность ВИЧ среди взрослых продолжает снижаться – последние оценки, полученные в конце 2003 года, указывают на то, что этот показатель составляет 1,5%
- В нескольких странах, таких как Бангладеш, Восточный Тимор, Пакистан и Филиппины, имеются прекрасные возможности для того, чтобы предупредить серьезные вспышки эпидемии. В этих странах регистрируются очень низкие уровни распространенности ВИЧ, даже среди групп населения, практикующих рискованное поведение.
- Учитывая, что в Азии 8,2 миллиона человек уже живут с ВИЧ, более приоритетное место в программах должны также занимать лечение, уход и поддержка. В 2004 году из 170 000 человек, нуждающихся в антиретровирусном лечении в Азии, такое лечение получали чуть более 6% нуждающихся.

---

*За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Аннемари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС [www.unaids.org](http://www.unaids.org).*