

БРАЗИЛИЯ

Согласно статистике правительства Бразилии в 2004 году число людей живущих с ВИЧ в стране составило около 600 тысяч. В 2003 году число смертных случаев вследствие связанных со СПИДом заболеваний превысило 11 тысяч.

- При численности населения в 180 миллионов и показателе распространенности ВИЧ около 0,7% на Бразилию приходится более трети живущих с ВИЧ в Латинской Америке.
- Меры по борьбе со СПИДом в Бразилии находят постоянную и активную политическую поддержку на самом высоком правительственном уровне, результатом чего являются внедрение политики контроля, а также регулярное выделение финансовых ресурсов на уровне штатов, а также на национальном и местном уровнях.
- Изначально эпидемия в Бразилии распространялась преимущественно среди мужчин имеющих половые контакты с мужчинами, и впоследствии в среде потребителей инъекционных наркотиков. Эпидемия приобрела более неоднородный характер, и в настоящее время все больший процент ВИЧ-инфекций обусловлен гетеросексуальными контактами, причем на женщин приходится 36% инфицированного ВИЧ населения Бразилии.
- Употребление инъекционных наркотиков является одним из основных факторов распространения эпидемии в Бразилии. В некоторых регионах по крайней мере половина случаев СПИДа обусловлена их употреблением. В то же время в последние годы благодаря введению программ по снижению вреда в некоторых городах наблюдается резкое сокращение показателя распространенности ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков. Например в Салвадоре, показатель распространенности ВИЧ упал с 50% в 1996 году до 7% в 2001 году.
- Бразилия является первой развивающейся страной, обеспечившей инфицированным ВИЧ всеобщий доступ к лечению через национальную систему здравоохранения. В настоящее время более 150 тысяч человек имеют доступ к бесплатному лечению, что стало возможным благодаря государственному финансированию. Решающим фактором в достижении подобных результатов в стране является налаживание государственными и частными фармацевтическими предприятиями собственного производства препаратов, применяемых при инфицировании ВИЧ.
- В результате вышеперечисленных мер, продолжительность жизни больных СПИДом ощутимо возросла. По расчетам недавно проведенного исследования, средняя продолжительность жизни после постановки диагноза в 1980-х годах не превышала пяти месяцев, в то время как в 1996 году она достигла почти пяти лет.
-

- НПО, работающие в области борьбы со СПИДом, сыграли важнейшую роль в пропаганде и разработке соответствующих программ и в проведении ключевых мероприятий. При Министерстве здравоохранения была создана компетентная техническая и административная структура управления программой по СПИДу и координации межведомственных мероприятий с участием Федерального правительства, штатов и муниципалитетов. С 1998 года активно действует Национальный совет представителей бизнеса по проблемам СПИДа.

За более подробной информацией просьба обращаться к Луциано Мильомему, ЮНЭЙДС, Бразилия, тел. +55 61 30 38 9222, моб. +55 61 997 67 828, Жаклин Далден, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 3501, или Бет Манье-Уоттс, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 5074, или же Вы можете посетить веб-сайт www.unaids.org.