

HECHOS Y DATOS MUNDIALES

El número de personas que viven con el VIH ha aumentado y ahora alcanza su nivel más alto: cerca de 40 millones de personas están viviendo con el virus, y solamente en 2004 se infectaron por el VIH alrededor de otros 5 millones de personas. En todo el mundo, la epidemia de SIDA se cobró la vida de más de 3 millones de personas sólo en el último año.

Panorama

- El número de personas que viven con el VIH ha ido aumentando en todas las regiones. Los mayores aumentos se han producido en Asia oriental y Europa oriental y Asia central, donde la epidemia se ha multiplicado casi por nueve en menos de diez años.
- África subsahariana sigue siendo la región del mundo más afectada. En ella sólo vive algo más del 10% de la población mundial, pero tiene más del 60% de todas las personas que viven con el VIH y más de las tres cuartas partes de todas las mujeres que viven con el VIH.
- Las poblaciones de muchas naciones asiáticas son tan vastas que incluso una prevalencia nacional del VIH baja significa millones de personas infectadas por el VIH. A menos que se emprenda una acción inmediata, la región podría sufrir otros 12 millones de nuevas infecciones entre 2005 y 2010.
- El Caribe presenta la segunda tasa de prevalencia más alta del mundo, solamente superada por África subsahariana. En conjunto, los niveles más altos de infección por el VIH entre mujeres en las Américas se observan en los países del Caribe, donde el SIDA ha pasado a ser la causa principal de mortalidad entre adultos de 15-44 años de edad.

Estadísticas regionales

	Personas que viven con el VIH	Nuevas infecciones en 2004	Defunciones por SIDA en 2004	Prevalencia en adultos (%)
África subsahariana	25,4 millones	3,1 millones	2,3 millones	7,4%
Asia	8,2 millones	1,2 millones	450.000	0,4%
América Latina	1,7 millones	240.000	95.000	0,6%
América del Norte y Europa occidental y central	1,6 millones	64.000	23.000	0,4%
Europa oriental y Asia central	1,4 millones	210.000	60.000	0,8%
Oriente Medio y África del Norte	540.000	92.000	28.000	0,3%
Caribe	440.000	53.000	36.000	2,3%
Oceanía	35.000	5.000	700	0,2%

Total	39,4 millones	4,9 millones	3,1 millones	1,1%
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Prevención

- En este punto de la epidemia, todos los años se produce un mayor número de nuevas infecciones por el VIH (alrededor de cinco millones) que de defunciones relacionadas con el SIDA (alrededor de tres millones).
- Actualmente, sólo una de cada cinco personas que necesitan servicios básicos de prevención del VIH en todo el mundo tiene acceso a ellos, y tan sólo una de cada diez personas que viven con el VIH se ha sometido a la prueba de detección del virus.
- En África subsahariana, solamente el 5% de las mujeres embarazadas que viven con el VIH tiene acceso a servicios que prevendrían la infección por el VIH de sus hijos.
- Para asegurar que la ampliación del tratamiento antirretrovírico siga siendo económica y socialmente sostenible, en los próximos años debe reducirse de forma drástica el número de nuevas infecciones.
- Se estima que la puesta en práctica de un conjunto integral de medidas de prevención del VIH podría evitar 29 millones (63%) de los 45 millones de nuevas infecciones que se prevé que se produzcan entre 2002 y 2010.

Tratamiento

- De acuerdo con el último informe de progresos realizados en la aplicación de la estrategia ONUSIDA/OMS "Tres millones para 2005", en la actualidad un millón de personas que viven con el VIH están recibiendo terapia ARV en los países en desarrollo: esto significa que solamente el 15% de los que necesitan tratamiento lo están recibiendo.

Región geográfica	Núm. estimado de personas que reciben terapia ARV (2005)	Núm. estimado de personas que necesitan terapia ARV (2005)	Cobertura de la terapia ARV (junio de 2005)
África subsahariana	500.000	4.700.000	11%
América Latina y el Caribe	290.000	465.000	62%
Asia oriental, meridional y sudoriental	155.000	1.100.000	14%
Europa y Asia central	20.000	160.000	13%
Oriente Medio y África del Norte	4.000	75.000	5%
Total	970.000	6,5 millones	15%
Nota: Algunos de los totales se han redondeado.			

Necesidades de recursos

- De acuerdo con las últimas estimaciones del ONUSIDA, en 2008 se necesitarán US\$ 22 mil millones para invertir el curso de la propagación del SIDA en el mundo en desarrollo.

- En lo que respecta al tratamiento y la atención, cerca del 55% de estos recursos se necesitarán en África subsahariana, el 20% en Asia y el pacífico, el 17% en América Latina y el caribe, el 7% en Europa oriental y el 1% en Oriente Medio y África del Norte.
- Según las proyecciones más recientes del ONUSIDA, se estima que en 2005 se dispondrá de un total de US\$ 8 mil millones de todas las fuentes; esta cifra aumentará a US\$ 9 mil millones y US\$ 10 mil millones en 2006 y 2007, respectivamente.

Necesidades de recursos para el SIDA (en US\$ miles de millones)

	2006	2007	2008
Prevención	84	100	114
Tratamiento y atención	30	40	53
Huérfanos y niños vulnerables	16	21	27
Costos programáticos	15	14	18
Recursos humanos	4	6	9
Total	149	181	221

Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Luciano Milhomem, ONUSIDA, Brasil, tel. +55 61 30 38 9222, móvil +55 61 997 67 828, con Jacqueline Daldin, ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 3501 o con Beth Magne-Watts, ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 5074. Para obtener más información sobre el ONUSIDA, consulten www.unaids.org.