



Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

ЮНЭЙДС

УВКБ · ЮНИСЕФ · МПП · ПРООН · ЮНФПА
ЮНОДК · МОТ · ЮНЕСКО · ВОЗ · ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Информационный бюллетень

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

Число новых инфекций, зарегистрированных в 2004 году в Северной Америке и в Западной и Центральной Европе, составило около 64 000, в результате чего число людей, живущих с ВИЧ в этих странах, увеличилось до 1,6 миллиона человек. В 2004 году количество женщин, живущих с ВИЧ, выросло до 420 000 человек. Широкий доступ к продляющему жизнь антиретровирусному лечению позволил удержать в 2004 году число смертей от СПИДа на уровне 23 000 случаев. Однако имеются достаточные указания на то, что профилактические усилия отстают от темпов развития изменяющихся эпидемий.

- Секс между мужчинами и в меньшей мере употребление инъекционных наркотиков остаются заметными факторами в развитии эпидемий в этих странах, в то же время меняется картина передачи ВИЧ. Эпидемия охватывает новые слои населения, причем растет пропорция лиц, инфицируемых в результате незащищенных гетеросексуальных контактов.
- В Соединенных Штатах Америки за последнее десятилетие эпидемия изменилась наглядным образом. В последние десять лет, по оценкам, в этой стране ВИЧ ежегодно заражались 40 000 человек, в то же время сейчас эта эпидемия развивается диспропорционально среди афроамериканцев (среди них за последние десять лет было диагностировано 50% новых случаев инфекции), причем особенно сильно среди женщин (на афроамериканок приходится до 72% новых диагнозов ВИЧ среди всего женского населения США).
- Что касается мужского населения в целом и афроамериканцев в частности, огромное большинство ВИЧ-инфекций передается в результате употребления инъекционных наркотиков и секса между мужчинами, где по-прежнему регистрируется особенно высокий уровень рискованного поведения. В то же время большинство случаев ВИЧ, диагностируемых среди женщин, обусловлено гетеросексуальными контактами; кроме того, имеются весомые данные о том, что основным фактором риска для многих женщин, заразившихся ВИЧ, является рискованное поведение их партнеров-мужчин, которое зачастую остается скрытым.
- После внедрения в 1995-1996 годах антиретровирусной терапии показатель смертности от СПИДа в Соединенных Штатах Америки резко снижался до конца 1990-х годов, после чего процесс снижения несколько выровнялся – с 19 005 случаев смерти от СПИДа, зарегистрированных в 1998 году, до 16 371 случая в 2002 году. Однако в 2002 году показатель смертности от СПИДа среди афроамериканцев оказался более чем в два раза выше, чем этот же показатель среди белых. В настоящее время показатель выживаемости среди афроамериканцев является самым низким среди лиц с диагнозом СПИД.
- В 12 западноевропейских странах, где имеются данные о новых случаях ВИЧ-инфекций, число диагнозов ВИЧ среди людей, заразившихся через гетеросексуальные контакты, увеличилось за период с 1997 по 2002 годы на 122%. Большая доля таких диагнозов зарегистрирована среди выходцев из стран с серьезными эпидемиями, в основном из стран Африки к югу от Сахары, а в Соединенном Королевстве среди англоговорящих выходцев из карибских стран.

- Число диагнозов ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, увеличилось в 2001-2002 годах в Западной Европе на 22%, хотя в предшествующие годы наблюдалось медленное снижение этого показателя. Однако новые данные могут отражать более частое обращение по поводу тестирования. ВИЧ-инфекция сейчас представляет собой самое быстро растущее серьезное состояние здоровья в Англии. В Германии, где расширение доступа к лечению способствовало расширению услуг по тестированию на ВИЧ уже в конце 1990-х годов, отмеченный в последнее время рост числа диагнозов (с 642 диагнозов ВИЧ в 2000 году до 742 в 2002 году), вероятно, отражает фактический рост числа новых инфекций.
- Учитывая постоянно высокий уровень распространенности ВИЧ среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в Западной Европе – от 10% до 20% в ряде стран и даже выше в крупных городах, – необходимо срочно активизировать и повысить качество кампаний по пропаганде безопасного секса среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
- Несмотря на то, что в большинстве стран Западной Европы на употребление инъекционных наркотиков приходится все меньшая доля новых диагностированных ВИЧ-инфекций, это остается важным фактором в развитии эпидемий в ряде стран, в частности в Италии, Португалии и Испании.
- В Португалии (где новые диагнозы ВИЧ регистрируются чаще, чем в других странах Европы) в 2002 году почти 50% диагнозов ВИЧ по-прежнему было обусловлено употреблением инъекционных наркотиков. В некоторых районах других стран (включая Италию, Нидерланды и Францию) среди потребителей инъекционных наркотиков по-прежнему регистрируется показатель распространенности ВИЧ в 20% и выше.
- Отмечается тенденция к увеличению доли ВИЧ-инфекций, обусловленных гетеросексуальными контактами, в Западной Европе – и параллельно с этим увеличение числа женщин, которым ставится диагноз ВИЧ. В 12 странах Западной Европы, где имеются данные, пропорция женщин, которым был впервые поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, увеличилась с 25% в 1997 году до 38% в 2002 году.
- В странах Центральной Европы (включая Венгрию и Чешскую Республику) число новых ВИЧ-инфекций остается стабильным с конца 1990-х годов; причем сейчас большинство новых инфекций регистрируется в Польше. Известно, что секс между мужчинами является ведущим путем передачи ВИЧ в Венгрии, Словацкой Республике, Словении и Чешской Республике.
- В отличие от других регионов мира, значительное большинство людей в большей части стран этого региона, которые нуждаются в антиретровирусном лечении, имеют к нему доступ. В результате смертность от СПИДа, которая резко снизилась в середине-конце 1990-х годов, остается низкой.
- В ряде стран большая доля ВИЧ-инфекций остается недиагностированной; например, в Соединенном Королевстве, по оценкам, треть людей, живущих с ВИЧ, не знают своего серологического статуса и, скорее всего, обнаружат его только после того, как у них появится заболевание, связанное со СПИДом. Кроме того, появляются тревожные свидетельства о том, что в Западной Европе у некоторых пациентов, которым впервые поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, развивается резистентность к антиретровирусным препаратам.

За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Аннемари Хоу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС www.unaids.org.