



Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу

**ЮНЭЙДС**

ЮНИСЕФ • МПП • ПРООН • ЮНФПА • ЮНОДК  
МОТ • ЮНЕСКО • ВОЗ • ВСЕМИРНЫЙ БАНК

# Информационный бюллетень

## Эпидемия СПИДа в Латинской Америке и Карибском регионе

*В Латинской Америке и Карибском регионе общее число людей, живущих с ВИЧ, продолжает расти. По оценкам, в этих странах 2 миллиона людей (1,6–2,6 миллиона) живут с ВИЧ – эта цифра включает 250 тысяч, которые заразились в 2003 году. За тот же год от СПИДа умерли около 120 тысяч человек.*

- В Карибском бассейне в прошлом году ВИЧ заразились 52 тысячи человек, в результате общее число людей, живущих с ВИЧ, составило около 430 тысяч человек (270-760 тысяч). В прошлом году около 35 тысяч человек умерли от СПИДа.
- Эпидемия в Карибском бассейне преимущественно носит гетеросексуальный характер и во многих местах концентрируется среди работников секс-бизнеса. Однако вирус распространяется среди широких слоев населения.
- Три страны Карибского региона имеют национальные уровни распространенности не менее 3% – Багамские Острова, Гаити и Тринидад и Тобаго. Барбадос имеет уровень распространенности 1,5%, а Куба намного ниже 1%.
- Наиболее пострадавшей страной является Гаити, где национальный показатель распространенности составляет 5,6%. ВИЧ распространяется неравномерно: согласно дозорному эпиднадзору, показатель распространенности колеблется от 13% на северо-западе страны до 2-3% на юге.
- Гаити находится на одном острове с Доминиканской Республикой – острове Гаити, – где эпидемия ВИЧ также носит серьезный характер. Однако в Доминиканской Республике отмечавшиеся ранее высокие показатели распространенности снизились благодаря эффективным профилактическим мерам, направленным на то, чтобы уменьшить число сексуальных партнеров и расширить практику пользования презервативами – более 50% мужчин в возрасте 15-29 лет пользовались презервативами при половых контактах с партнером, с которым они не находятся в сожительстве.
- В столице Доминиканской Республикой Санто-Доминго показатель распространенности среди беременных женщин снизился примерно с 3% в 1995 году до менее 1% в конце 2003 года. Однако в других местах по-прежнему отмечаются высокие показатели распространенности, которые колеблются от менее 1% до примерно 5%. В 2000 году показатель распространенности ВИЧ среди женщин-работниц секс-бизнеса варьировался от 4,5% в восточной провинции Ля-Романа до 12,4% в южной провинции Бани. Кроме этого, мало что известно о потенциально важном аспекте развития эпидемии в этой стране – о мужчинах, занимающихся сексом с мужчинами.
- В Латинской Америке ВИЧ-инфекция, как правило, сильно концентрируется среди групп населения, которым грозит особенно высокий риск, а не среди населения в целом.

- В большинстве южноамериканских стран почти все случаи инфицирования обусловлены использованием загрязненного инъекционного инструментария для употребления наркотиков или сексуальными связями между мужчинами.
- В Центральной Америке вирус распространяется в основном в результате половых контактов. Показатель распространенности ВИЧ среди работников секс-бизнеса колеблется значительно – от менее 1% в Никарагуа до более 10% в Гондурасе. Среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, уровни ВИЧ-инфекции выглядят однородно высокими, варьируясь от 9% в Никарагуа до 24% в Аргентине. В ряде стран, особенно в Колумбии и Перу, основным путем передачи ВИЧ является секс между мужчинами. По последним данным, в Боготе показатель распространенности ВИЧ в этой группе населения составил 18%. В то же время результаты другого обследования, проведенного в этом же городе, показали, что уровень использования презервативов в этой группе постоянно низкий.
- Созрели условия для более широкого распространения этого вируса, поскольку большое число мужчин, занимающихся сексом с мужчинами, также имеют половые контакты с женщинами. Примером этого является Перу: во время обследования, проведенного среди молодых мужчин и женщин (в возрасте 18-29 лет), 9% мужчин указали, что по крайней мере в одном из трех последних случаев их сексуальным партнером был мужчина и что в 70% случаев при таких контактах презервативы не применялись.
- В этом регионе за низкими национальными показателями распространенности скрываются очень серьезные эпидемии. Например, в Бразилии – самой населенной стране в регионе, где проживают более четверти всех ВИЧ-инфицированных, – национальный показатель распространенности намного ниже 1%. Однако в некоторых городах были отмечены уровни инфицирования среди потребителей инъекционных наркотиков выше 60%.
- Несмотря на то что эпидемия в Бразилии распространилась из крупных городских центров в меньшие города, медианный показатель распространенности ВИЧ среди беременных женщин, посещающих дородовые женские клиники, остается ниже 1%, причем колебания этого показателя в последние пять лет незначительны. Это частично обусловлено программами профилактики, проводимыми с 1990-х годов, а также усилиями по расширению охвата уязвимых групп программами снижения вреда и другими мерами профилактики (и, кроме того, активной и успешной программой лечения ВИЧ-инфицированных).
- Эпидемии невозможно будет победить до тех пор, пока страны не осознают широко распространенные реальности – употребление инъекционных наркотиков и секс между мужчинами. Стигматизация и отрицание такого поведения может лишь способствовать развитию замалчиваемых эпидемий, которые уже имеют место. Получение более точных эпидемиологических данных и данных эпиднадзора за поведением в сочетании с усилением социальной и политической мобилизации в связи с проблемой СПИДа будет способствовать развитию ответных мер с учетом подлинного характера эпидемии.
- Пропорция людей, которые нуждаются в антиретровирусном лечении и получают его, значительно варьируется – от менее 25% в одних странах до более 75% в других. Однако существует ряд субрегиональных инициатив, которые увеличивают перспективы расширения доступа к лечению в некоторых странах, включая Багамские Острова, Барбадос и Гондурас.

---

*За более подробной информацией просьба обращаться к Доминик де Сантис, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4509 или моб. тел. (+41 79) 254 6803, или Эбби Спрингу, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 4577 или моб. тел. (+41 79) 308 9861. Вы можете также посетить веб-сайт ЮНЭЙДС в системе Интернет, содержащий подробную информацию о Программе – [www.unaids.org](http://www.unaids.org).*