





UN MAL MOMENTO PARA SER JOVEN EN UN MUNDO CON SIDA

Los jóvenes son nuestro futuro

Proporción de jóvenes (15-24 años) que no han oído hablar nunca del SIDA o que no saben que el VIH no se puede transmitir a través de picaduras de insectos.



Prevalencia del VIH/SIDA entre los jóvenes (de 15 a 24 años de edad)
11,8 millones de jóvenes vivían con el VIH hasta finales de 2001
De ellos, 7,3 millones son muchachas y 4,5 millones, muchachos



la meta*

Para 2003, establecer metas nacionales con plazos concretos para alcanzar el objetivo mundial [...] reducir la prevalencia del VIH entre los jóvenes de ambos sexos de 15 a 24 años de edad en un 25% para 2005 en los países más afectados y en un 25% para 2010 en el mundo entero [...].


Para 2005, asegurar que por lo menos el 90% de los jóvenes de ambos sexos de 15 a 24 años de edad, y para 2010, por lo menos el 95% de ellos, tengan acceso a la información, la educación, incluidas la educación entre pares y la educación específica para jóvenes sobre el VIH, así como a los servicios necesarios para desarrollar las habilidades requeridas a fin de reducir su vulnerabilidad a la infección por el VIH, todo ello en plena colaboración con los jóvenes, las madres y los padres, las familias, los educadores y el personal de atención de la salud.

los datos


- Se estima que unas 11,8 millones de personas de 15 a 24 años de edad viven con el VIH/SIDA – la mayoría de las cuales son muchachas – y que la mitad de todas las nuevas infecciones – casi 6000 diarias – se producen entre los jóvenes.
- La ignorancia acerca de la epidemia sigue siendo generalizada entre los jóvenes, muchos de los cuales no saben cómo protegerse del VIH.
- Los jóvenes son un elemento fundamental en la lucha contra el VIH/SIDA. Tienen derecho a unos conocimientos teóricos y prácticos que reduzcan su vulnerabilidad.

Los huérfanos necesitan atención, educación y protección

Proporción de niños de 10 a 14 años de edad que siguen asistiendo a la escuela, estén o no con vida sus padres



Niños menores de 15 años que han perdido a su madre o a ambos padres por causa del SIDA, 1985-2000



la meta*


Para 2003, elaborar y para 2005, poner en práctica, normas y estrategias nacionales a fin de establecer y fortalecer la capacidad de los gobiernos, las familias y las comunidades para dar un entorno que brinde apoyo a los huérfanos [...] entre otras cosas, dándoles asesoramiento y apoyo psicosocial adecuado, y asegurándoles escolarización y acceso a vivienda, buena nutrición y servicios sociales y de salud en pie de igualdad con otros niños; y proteger a los huérfanos y a las niñas y los niños vulnerables de toda forma de maltrato, violencia, explotación, discriminación, trata y pérdida del derecho de sucesión.

los datos

- El SIDA ha dejado huérfanos a por lo menos 10,4 millones de niños menores de 15 años, es decir que esos niños han perdido a su madre o a ambos padres por la epidemia.
- Se calcula que la cifra total de niños huérfanos por la epidemia podría duplicarse para 2010.
- Los niños cuyos progenitores han fallecido tienen menos posibilidades de utilizar los servicios y atender a la escuela que los que no han perdido a ninguno de sus progenitores.

La transmisión maternoinfantil puede prevenirse

Proporción de mujeres (de 15 a 24 años de edad) que no saben que el VIH se puede transmitir de madre a hijo¹



2,5 millones de niños expuestos al riesgo de contraer la infección por el VIH a través de la transmisión maternoinfantil, 2001²

Europa oriental y Asia central	5,000
Asia oriental y el Pacífico	68,000
Países industrializados	5,000
América Latina y el Caribe	52,000
Oriente Medio y África del Norte	40,000
Asia meridional	160,000
África subsahariana	2,200,000

la meta*

Para 2005, reducir el número de lactantes infectados por el VIH en un 20% y para 2010 en un 50%, ofreciendo al 80% de las mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal información, apoyo psicológico y otros servicios de prevención del VIH.

los datos

- Se estima que, solamente en 2001, unos 800 000 niños menores de 15 años contrajeron el VIH, más del 90% de los cuales a través de la transmisión maternoinfantil (TMI).
- El VIH se puede transmitir a un lactante durante el embarazo, en el trabajo de parto y el alumbramiento, o a través de la leche materna.
- La transmisión maternoinfantil puede prevenirse por medio del asesoramiento y las pruebas voluntarias eficaces, de la terapia antirretrovírica o los tratamientos preventivos prolongados de la TMI, de las prácticas de asistencia al parto en condiciones higiénicas y de los sustitutos de la leche materna seguros.



ESTA VEZ, ACTUEMOS

*Objetivos seleccionados extraídos de la Declaración de Compromiso adoptada por los Estados Miembros en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, celebrado en junio de 2001.

Los mapas de este cartel no reflejan ninguna toma de posición por parte del UNICEF ni de ONUSIDA con relación a la situación jurídica de ningún país o territorio ni la demarcación de ninguna frontera.