


# DIFFICILE D'ÊTRE JEUNE DANS UN MONDE OÙ SÉVIT LE SIDA


## Les jeunes sont notre avenir

Proportion des jeunes (15-24 ans) qui n'ont jamais entendu parler du SIDA ou qui ne savent pas que le VIH ne peut pas être transmis par les moustiques.



Source: MICS, UNICEF, 2000

Prévalence du VIH/SIDA parmi les jeunes (15-24 ans)  
11,8 millions de jeunes vivant avec le VIH fin 2001  
7,3 millions de jeunes femmes – 4,5 millions de jeunes hommes



Source: Les taux de prévalence du VIH, par pays, ONUSIDA/UNICEF, 2000

### le but\*

D'ici à 2003, établir des objectifs nationaux assortis de délais pour [...] réduire l'incidence du VIH parmi les jeunes, hommes et femmes, âgés de 15 à 24 ans, de 25% d'ici à 2005 dans les pays les plus touchés et de 25% à l'échelle mondiale d'ici à 2010 [...].


D'ici à 2005, veiller à ce qu'au moins 90% et d'ici à 2010 au moins 95% des jeunes, hommes et femmes, âgés de 15 à 24 ans, aient accès à l'information, à l'éducation, y compris l'éducation par les pairs et l'éducation concernant le VIH axée sur les jeunes, et aux services nécessaires pour acquérir les aptitudes requises pour réduire leur vulnérabilité à l'infection à VIH, en pleine collaboration avec les jeunes, les parents, les familles, les éducateurs et les prestataires de soins de santé.

### les faits


- On estime à 11,8 millions le nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant avec le VIH/SIDA. La plupart d'entre eux sont des filles. La moitié de toutes les nouvelles infections – presque 6 000 chaque jour – se produisent parmi les jeunes.
- L'ignorance concernant l'épidémie est répandue parmi les jeunes, et nombreux sont ceux qui ne savent pas comment se protéger du VIH.
- Le rôle des jeunes est décisif pour ce qui est du contrôle du VIH/SIDA. Ils ont droit à un savoir et à des techniques qui réduisent leur vulnérabilité.

## Les orphelins ont besoin de soins, d'éducation et de protection

Proportion des enfants entre 10 et 14 ans encore scolarisés selon que leurs parents sont en vie ou non



Enfants de moins de 15 ans ayant perdu leur mère ou leurs deux parents du fait du SIDA, 1985-2000



Source: ONUSIDA/UNICEF, 2000

Source: DHS, Macro International, DHS/UNICEF, 1993-2000

### le but\*


Élaborer, d'ici à 2003, et mettre en œuvre, d'ici à 2005, des politiques et stratégies nationales visant à rendre les gouvernements, les familles et les communautés mieux à même d'assurer un environnement favorable aux orphelins [...] notamment en leur fournissant des services appropriés de consultation et d'aide psychosociale, en veillant à ce qu'ils soient scolarisés et aient accès à un logement, à une bonne nutrition et à des services sanitaires et sociaux sur un pied d'égalité avec les autres enfants; offrir aux orphelins et aux enfants vulnérables une protection contre toutes formes de mauvais traitements, de violence, d'exploitation, de discrimination, de traite et de perte d'héritage.

### les faits

- Le SIDA a d'ores et déjà fait au moins 10,4 millions d'orphelins actuellement de moins de 15 ans (c'est-à-dire des enfants ayant perdu leur mère ou leurs deux parents du fait de l'épidémie).
- Le nombre total d'enfants rendus orphelins par l'épidémie devrait plus que doubler d'ici à 2010.
- Les orphelins ont moins de chances d'avoir accès à des services de base et d'aller à l'école que ceux qui ont encore au moins un parent.

## La transmission mère-enfant peut être évitée

Proportion des femmes (15-49 ans) qui ne savent pas que le VIH peut être transmis de la mère à l'enfant<sup>1</sup>



2,5 millions d'enfants exposés au risque d'infection à VIH par la TME, 2001<sup>2</sup>

Europe orientale et Asie centrale	5.000
Asie de l'Est et Pacifique	68.000
Monde industrialisé	5.000
Amérique latine et Caraïbes	52.000
Moyen-Orient et Afrique du Nord	40.000
Asie du Sud	160.000
Afrique subsaharienne	2.200.000

Sources: <sup>1</sup>MICS, UNICEF 2000; DHS, Macro International, 1996-2000; RHS, CDC 1998; <sup>2</sup>ONUSIDA 2001

### le but\*

D'ici à 2005, réduire de 20%, et d'ici à 2010, de 50%, la proportion de nourrissons infectés à VIH en veillant à ce que 80% des femmes enceintes consultant pour des soins prénatals reçoivent des informations, des conseils et autres moyens de prévention de l'infection à VIH [...].

### les faits

- En 2001 uniquement, on estime que 800 000 enfants de moins de 15 ans ont été infectés par le VIH – dont plus de 90% par la transmission mère-enfant (TME).
- Le VIH peut être transmis au nourrisson pendant la grossesse, le travail et l'accouchement ou l'allaitement.
- La transmission mère-enfant peut être évitée grâce à des services efficaces de conseil et de test volontaires, par la thérapie antirétrovirale ou par l'utilisation de protocoles de longue durée de prévention de la TME, par des pratiques d'accouchement sûres et des options d'alimentation sans danger.



# CETTE FOIS, AGISSONS

\*Buts sélectionnés dans la Déclaration d'Engagement, adoptée par les Etats Membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa Session extraordinaire sur le VIH/SIDA en juin 2001.

Ces cartes ne reflètent pas une position de l'UNICEF ou de l'ONUSIDA sur le statut légal des pays et territoires représentés ou sur la délimitation de leurs frontières.