



НЕТ ВРЕМЕНИ БЫТЬ МОЛОДЫМ В МИРЕ СПИДА


Молодежь — наше будущее

Процентное число молодых людей (15–24 года), никогда не слышавших о СПИДе или не знающих о том, что ВИЧ не может передаваться через комариный укус



Источник: MICS, ЮНИСЕФ, 2000 г.

Распространенность ВИЧ/СПИДа среди молодежи (в возрасте 15–24 лет) 11,8 миллиона ВИЧ-инфицированных молодых людей (по сост. на конец 2001 г.), среди которых 7,3 миллиона молодых женщин и 4,5 миллиона молодых мужчин



Источник: Уровни распространенности ВИЧ для разных стран, ЮНЭЙДС/ЮНИСЕФ, 2000 г.

Цель*

К 2003 году установить обусловленные определенными сроками национальные задачи [...], к 2005 году обеспечить сокращение распространенности ВИЧ среди молодых мужчин и женщин в возрасте от 15 до 24 лет в наиболее пострадавших странах на 25 процентов, а в глобальном масштабе — на 25 процентов к 2010 году [...].

К 2005 году обеспечить, чтобы по меньшей мере 90 процентов, а к 2010 году по меньшей мере 95 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 15 до 24 лет имели доступ к информации, образованию, включая методы взаимного просвещения среди сверстников и ориентированные на молодежь просветительские программы по ВИЧ, и услугам, требуемым для развития жизненных навыков, необходимых для снижения их уязвимости инфицированию ВИЧ, в рамках полноценного партнерства с молодежью, родителями, семьями, работниками сферы просвещения и медицинскими кадрами.


Факты

- По оценкам, в мире проживает 11,8 миллиона молодых людей в возрасте 15–24 лет с ВИЧ/СПИДом. Большинство из них — молодые женщины. Половина всех новых случаев ВИЧ-инфекции, составляющих почти 6 000 ежедневно, имеет место среди молодежи.
- Неосведомленность об эпидемии широко распространена среди молодежи; многие не знают, как защитить себя от инфекции.
- Молодые люди играют ключевую роль в деле обуздания ВИЧ/СПИДа. У них есть право на знания и навыки, способные уменьшить их уязвимость.


Сиротам нужны забота, образование и защита

Число детей в возрасте 10–14 лет, которые все еще посещают школу, в зависимости от того, живы ли их родители

Дети до 15 лет, потерявшие мать или обоих родителей в результате СПИДа, 1985–2000 г.



Источник: ЮНЭЙДС/ЮНИСЕФ, 2000 г.



Источник: DHS, Macro International, DHS/ЮНИСЕФ, 1993–2000

Цель*

К 2003 году разработать и к 2005 году осуществить национальную политику и стратегии для: создания и расширения возможностей правительств, семей и общин по предоставлению помощи сиротам [...], в том числе путем оказания надлежащей консультативной и психосоциальной поддержки; обеспечения того, чтобы сироты ходили в школу и имели жилье, хорошее питание и доступ к медицинскому и социальному обслуживанию на равной основе с другими детьми; и защиты сирот и уязвимых детей от всех форм злоупотреблений, насилия, эксплуатации, дискриминации, торговли и потери наследства.

Факты


- В результате СПИДа около 10,4 млн. детей, которым в настоящее время нет 15 лет, стали сиротами (то есть они потеряли свою мать или обоих родителей вследствие эпидемии).
- По прогнозам, к 2010 году общее число детей, осиротевших в результате эпидемии с момента ее начала, увеличится более чем в два раза.
- Дети, потерявшие своих родителей, реже имеют доступ к услугам и реже посещают школу по сравнению с детьми, у которых есть родители.

Передачу ВИЧ от матери ребенку можно предотвратить

Число женщин (15–49 лет), не знающих о том, что ВИЧ может передаваться от матери ребенку¹

2,5 миллионам детей угрожает риск ВИЧ-инфекции в результате ПМР, 2001²

Африка к югу от Сахары	2 200 000
Ближний Восток и Северная Африка	40 000
Восточная Азия и Тихоокеанский регион	68 000
Восточная Европа и Центральная Азия	5 000
Латинская Америка и Карибский бассейн	52 000
Промышленно развитые страны	5 000
Южная Азия	160 000



Источник: MICS, DHS, RHS, различные страны, ЮНИСЕФ 2000, DHS 1996–2000, CDC 1998, ЮНЭЙДС 2001.

Цель*

К 2005 году сократить долю ВИЧ-инфицированных младенцев на 20 процентов, а к 2010 году — на 50 процентов путем обеспечения того, чтобы 80 процентов беременных женщин, имеющих доступ к медицинским услугам в дородовой период, получали информацию, консультирование и пользовались другими услугами по профилактике ВИЧ [...].

Факты

- По оценкам, только в 2001 году около 800 000 детей до 15 лет заразились ВИЧ-инфекцией — из них свыше 90% в результате передачи инфекции от матери ребенку (ПМР).
- ВИЧ может передаваться ребенку во время беременности, родов и родовспоможения или при грудном вскармливании.
- Передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку может быть предотвращена благодаря эффективному добровольному консультированию и тестированию, обеспечению доступа к комбинированному антиретровирусному лечению или назначению долгосрочных схем профилактики ПМР, безопасной практики родовспоможения и безопасных вариантов вскармливания младенцев.



ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

*Некоторые цели взяты из «Декларации о приверженности», принятой государствами-членами на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, состоявшейся в июне 2001 г.

Географические карты на этом плакате не отражают позицию ЮНИСЕФ или ЮНЭЙДС относительно правового статуса той или иной страны или территории, или относительно делимитации их границ.