



Anexo

Indicadores de progreso de los países



Anexo 2



Indicadores de progreso de los países

Informes nacionales y validación de los datos

Hasta marzo de 2008, 147 países habían informado sobre los progresos realizados en la ejecución de la *Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA* en sus Informes de progreso de país ante el ONUSIDA. Los indicadores informados se obtuvieron a partir de la *Declaración de compromiso sobre el VIH/SIDA* (2001) original, suscrita durante el Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los datos que aparecen en las siguientes tablas guardan relación con los datos de los Informes nacionales sobre los progresos realizados y con información procedente de otras fuentes.

Un grupo de especialistas en evaluación del ONUSIDA emprendió la revisión integral de los datos para verificar la integridad, exactitud y armonización con indicadores individuales. El ONUSIDA se contactó con 118 países con preguntas sobre los datos de seguimiento; el 80% de las preguntas sobre los datos informados se resolvieron a través de estas comunicaciones. Las cuestiones relacionadas con datos no resueltos para la fecha de la publicación no se incluyeron en los análisis de datos que se resumen en este informe. Además, se llevó a cabo un proceso de conciliación de los datos informados al ONUSIDA; al Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; al UNICEF; al Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida; a la OMS y a Measure Evaluation (datos reunidos a través del programa de Encuestas Demográficas y de Salud). Como resultado de las discrepancias identificadas en esta conciliación, se enviaron cartas a las oficinas del ONUSIDA en 122 países con el objeto de aclarar y resolver las dudas pendientes. El 88% de estos 122 países respondió con información esclarecedora sobre la cobertura para antirretrovíricos y prevención de la transmisión materno-infantil, y 50 respondieron a preguntas

sobre otros indicadores. En los análisis que se presentan en este informe, sólo se utilizaron los valores de datos conciliados.

El Índice compuesto de política nacional (ICPN) —cuestionario que evalúa el progreso en el desarrollo de las políticas y estrategias para el control del VIH a nivel nacional— se validó mediante un proceso aparte. Dos especialistas en evaluación verificaron los informes del ICPN para asegurarse de que la respuesta fuera coherente y completa. Los valores ilógicos o confusos se corrigieron; se estableció contacto con los países en los casos de datos faltantes considerables y de presentaciones múltiples no unificadas sobre el ICPN. En total, el ONUSIDA contactó a 34 países para resolver temas sobre los datos que estuvieran relacionados con el ICPN y obtuvo respuesta de 31 países. Puesto que existen más de 200 puntos para los datos del ICPN de cada país, los datos no se incluyen en el Apéndice B pero pueden encontrarse junto con los informes de cada país en el sitio web del ONUSIDA. En los análisis que se resumen en este informe, se incluyeron los datos validados provenientes de 130 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Tablas de datos

Las siguientes tablas muestran los datos presentados al ONUSIDA en los Informes de progreso de país, como parte del seguimiento del progreso realizado en la aplicación de la *Declaración de Compromiso*. Para que el lector pueda analizar los cambios a través del tiempo, allí donde los indicadores y los métodos fueron sistemáticos para todos los años informados, se proveen todos los datos disponibles sobre los años anteriores. Siempre que fue posible, el año de recopilación de los datos se diferenció del año del informe. Los porcentajes y los números que aparecen en las tablas se redondearon al número entero más próximo. En el momento en que se elaboró este Anexo, aún se estaban revisando algunos de los datos de los Informes de progreso de los países. En estos casos,

así se indica explícitamente en una nota al pie en las tablas de datos de los indicadores.

En los casos en que no se disponía de datos sobre un determinado indicador para un país en particular, ese país fue excluido de la tabla correspondiente. Es posible que los países no hayan presentado datos para un indicador determinado o bien porque no disponían de datos para elaborar el indicador según la definición del UNGASS o bien porque el país eligió no informar sobre el indicador, puesto que no lo consideró pertinente a su epidemia.

Los valores impresos en la tabla son los aprobados por los países. En algunos casos, estos valores difieren de los presentados originalmente debido al proceso de conciliación. Por lo tanto, es posible que algunos de los valores que se presentan en estas tablas de datos difieran de los publicados en el Informe de progreso de país.

En los casos en que un determinado país no presentó datos para un indicador en particular pero sí se disponía de esos datos provenientes de otra fuente —como la Encuesta Demográfica y de Salud—, dichos datos se incluyeron en las tablas y no son necesariamente los datos oficiales suministrados por los gobiernos nacionales. En cada uno de estos casos, se especificaron claramente la fuente y el año de esos datos en la tabla de datos de los indicadores y, en la sección Notas que sigue a este Anexo, se describió la definición del indicador utilizada y se proporcionó una referencia para la fuente. La compilación y la elaboración de estas tablas a partir de las diversas fuentes de datos estuvieron a cargo de personal de la sede del ONUSIDA en Ginebra. Estas personas no asumen ninguna responsabilidad respecto de la precisión de los datos de la fuente original.

Indicadores

Desde que se compiló el primer informe del UNGASS sobre los progresos realizados, *Seguimiento del UNGASS de 2001: Informe sobre los progresos realizados en la respuesta mundial al VIH/SIDA*, en 2003, se han perfeccionado y consolidado los indicadores básicos en cada ronda de presentación de informes en colaboración con

los asociados mundiales y el Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre Vigilancia y Evaluación (MERG), el grupo internacional que establece las normas relativas a vigilancia y evaluación. Las modificaciones realizadas a los indicadores establecidos por el UNGASS desde la última ronda de informes se resumen a continuación (Tabla 1). Las explicaciones sobre cómo se desarrollaron los indicadores pueden consultarse en el documento siguiente en la página web del ONUSIDA: *Seguimiento de la Declaración de compromiso del UNGASS sobre el VIH/SIDA: Directrices para el desarrollo de indicadores básicos (abril de 2007)*.

En la ronda anterior de presentación de informes del UNGASS, los indicadores se agruparon en dos categorías, según la naturaleza de la epidemia. Para esta ronda de informes no se estableció la diferencia entre un conjunto de indicadores de epidemia generalizada y un conjunto de indicadores de epidemia concentrada o de baja prevalencia. La razón es que las epidemias no se ajustan claramente en simples clasificaciones dicotómicas. En 2006, por ejemplo, algunos países con epidemia generalizada y prevalencia relativamente alta reconocieron que las subepidemias en las poblaciones más expuestas —profesionales del sexo, usuarios de drogas inyectables y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres— eran importantes dentro de su epidemia y que los programas de prevención dirigidos a estas poblaciones constituían un elemento fundamental de su respuesta nacional. Con buen criterio, además de informar sobre el conjunto de indicadores para la epidemia generalizada, estos países decidieron informar sobre los indicadores para estas poblaciones.

Para esta ronda de informes se pidió a todos los países, independientemente de su situación económica o epidemiológica, que informaran sobre todos los indicadores, según correspondiera. Se esperaba que los países analizaran cada indicador desde la perspectiva de la dinámica particular de su epidemia. Cuando los países decidieron no informar sobre un determinado indicador, se les pidió que explicaran por qué habían tomado esa decisión con el objeto de realizar un análisis que diferenciara entre una ausencia de datos y la

Tabla 1

Modificaciones realizadas a los indicadores del UNGASS desde la ronda anterior de presentación de informes

2005	2007	Comentarios sobre los cambios
Indicadores de compromiso y de acción en el plano nacional		
Monto de fondos nacionales desembolsados por los gobiernos en países de ingresos bajos y medianos	Gastos relacionados con el sida, por fuente de financiamiento	Cambió la definición
Índice compuesto de política nacional	Índice compuesto de política nacional	Se agregaron preguntas
Porcentaje de unidades de sangre transfundidas que se analizaron para detectar VIH	Porcentaje de unidades de donación de sangre analizadas sistemáticamente para la detección del VIH de una manera con garantía de la calidad	Cambió de sangre transfundida a sangre donada. Se agregó una segunda parte al indicador sobre la proporción de sangre analizada según los procedimientos operativos estándar y la garantía de calidad.
Porcentaje de mujeres y hombres con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica de combinación	Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica de combinación	Se incluyeron los niños
Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que reciben un tratamiento completo de profilaxis antirretrovírica para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron medicamentos antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil	Cambió la definición
	Porcentaje de casos nuevos estimados de tuberculosis en VIH-positivos que recibieron tratamiento para la tuberculosis y el VIH	Se agregó el indicador a la lista básica
	Porcentaje de mujeres y hombres de 15-49 años que recibieron una prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen sus resultados	Se agregó el indicador a la lista básica
Porcentaje de las poblaciones más expuestas que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen los resultados	Porcentaje de las poblaciones más expuestas que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen los resultados	Sin cambios
Porcentaje de las poblaciones más expuestas que logran atender los programas de prevención del VIH	Porcentaje de las poblaciones más expuestas que logran atender los programas de prevención del VIH	Cambió la definición
Porcentaje de huérfanos y niños vulnerables cuyas familias recibieron apoyo externo básico gratuito para la atención infantil	Porcentaje de huérfanos y niños vulnerables cuyas familias recibieron apoyo externo básico gratuito para la atención infantil	Sin cambios
Porcentaje de escuelas con docentes capacitados en la educación sobre el VIH/sida basada en las aptitudes para la vida y que la impartieron durante el último año académico	Porcentaje de escuelas que impartieron enseñanza sobre el VIH basada en las aptitudes para la vida durante el último año académico	Cambió la definición
Porcentaje de empresas o sociedades importantes que tienen políticas y programas sobre el VIH/sida para el lugar de trabajo		Se excluyó de la lista de indicadores básicos. Se incorporó al ICPN.
Porcentaje de mujeres y hombres con infecciones de transmisión sexual en establecimientos de atención de la salud que reciben diagnóstico, tratamiento y asesoramiento adecuados		Se excluyó de la lista de indicadores básicos. En revisión para los informes de 2010

Indicadores del conocimiento y el comportamiento		
Proporción actual de asistencia escolar entre huérfanos y no huérfanos, de 10-14 años de edad	Asistencia escolar actual entre huérfanos y no huérfanos de 10- 14 años de edad	Ya no hace falta el cálculo de la proporción
Porcentaje de mujeres y varones de 15-24 años de edad que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que rechazan las principales ideas erróneas sobre su transmisión	Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años de edad que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las principales ideas erróneas acerca de la transmisión del VIH	Se sugiere el reemplazo —donde corresponda— de las dos preguntas sobre ideas erróneas por las correspondientes versiones locales.
Porcentaje de poblaciones más expuestas que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las principales ideas erróneas acerca de la transmisión del VIH	Porcentaje de poblaciones más expuestas que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las principales conceptos ideas erróneas de la transmisión del VIH	Se sugiere el reemplazo —donde corresponda— de las dos preguntas sobre ideas erróneas por las correspondientes versiones locales.
Porcentaje de mujeres y varones jóvenes que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 24 años de edad que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años	Se amplió el intervalo de edad
Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 24 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con una pareja que no era su cónyuge ni cohabitaba con ellos	Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja	Se amplió el intervalo de edad y se cambió la definición
Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 24 años de edad que informaron haber usado preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja que no era su cónyuge ni cohabitaba con ellos	Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declaran haber utilizado un preservativo en la última relación sexual	Se amplió el intervalo de edad y se cambió la definición
Porcentaje de profesionales del sexo de ambos sexos que comunican haber usado preservativo con su cliente más reciente	Porcentaje de profesionales del sexo de ambos sexos que comunican haber usado preservativo con su cliente más reciente	Sin cambios
Porcentaje de varones que señalan haber usado un preservativo en su última relación sexual anal con una pareja masculina	Porcentaje de varones que señalan haber usado un preservativo en su última relación sexual anal con una pareja masculina	Sin cambios
Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que durante los últimos 12 meses adoptaron comportamientos que reducen la transmisión del VIH, es decir, que evitan compartir el equipo de inyección y usan preservativos (para los países en los que el consumo de drogas inyectables es una modalidad establecida de transmisión del VIH)	Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que informan haber utilizado preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales	El indicador compuesto se dividió en dos indicadores componentes (parte 1)
	Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que informan haber utilizado equipo de inyección estéril la última vez que se inyectaron	El indicador compuesto se dividió en dos indicadores componentes (parte 2)
Indicadores del impacto		
Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 24 años de edad que están infectados por el VIH	Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 24 años de edad que están infectados por el VIH	Sin cambios
Porcentaje de las poblaciones más expuestas que están infectadas por el VIH	Porcentaje de las poblaciones más expuestas que están infectadas por el VIH	Sin cambios
Porcentaje de adultos y niños con VIH que continúan vivos 12 meses después de haber iniciado el tratamiento antirretrovírico.	Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que siguen con el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de haberlo comenzado	Cambió la definición
Porcentaje de lactantes que nacieron con el VIH de madres infectadas	Porcentaje de lactantes que nacieron con el VIH de madres infectadas	Continúa en el conjunto básico pero se calcula en el ONUSIDA, Ginebra

no aplicabilidad de determinados indicadores a situaciones nacionales particulares.

Desafíos para la vigilancia de las poblaciones más expuestas

Garantizar que las muestras sean representativas a nivel de país y establecer un sistema mundial de información sobre la respuesta respecto de la cobertura de los programas y de los comportamientos de riesgo para las poblaciones más expuestas entrañan importantes dificultades técnicas y éticas. Se están desarrollando métodos que intentan obtener muestras representativas de estas poblaciones, con las que es difícil entrar en contacto (por ejemplo, el muestreo dirigido por encuestados). Mientras estos métodos van perfeccionándose, se reconoce que es posible que los países no puedan corroborar la representatividad de las muestras utilizadas para las encuestas realizadas en las poblaciones más expuestas. Los datos obtenidos de las encuestas de vigilancia comportamental (EVC), que con frecuencia provienen de muestras de conveniencia en las áreas de influencia del programa, tienden a generar un sesgo cuando se miden la cobertura del servicio y los comportamientos de riesgo. Por lo tanto, se aconsejó a los países que informaran los datos para estos indicadores utilizando la encuesta más reciente hecha en poblaciones más expuestas que haya sido revisada y avalada por técnicos expertos del país, como grupos técnicos de trabajo de vigilancia y evaluación o consejos nacionales de investigación.

Durante el análisis de los datos mundiales, se observaron varias diferencias metodológicas entre los países respecto de la recopilación de datos sobre las poblaciones más expuestas. En su mayoría, estas diferencias se relacionan con la definición de los grupos, los instrumentos de medición y el período utilizado para la recopilación de datos. Todas las diferencias detectadas se presentan sistemáticamente en las notas al pie de las tablas.

En el plano nacional, es importante interpretar estos datos de indicadores junto con el ICPN informado, que proporciona una idea general sobre el marco normativo y la respuesta programática respecto de la mayoría de las poblaciones de riesgo en un país dado, tanto desde la perspectiva del gobierno como desde la de grupos no gubernamentales y de la sociedad civil.

Índice compuesto de política nacional

El ICPN es un extenso cuestionario que se completa mediante una revisión de documentos pertinentes y entrevistas con personas más entendidas en los temas tratados. Una de las partes¹ del ICPN es respondida por funcionarios gubernamentales, mientras que la otra² está a cargo de representantes de la sociedad civil y de organizaciones bilaterales y multilaterales. El proceso consultivo recomendado para responder al ICPN apunta a fomentar un marco propicio para la inclusión de ambas perspectivas, la gubernamental y la no gubernamental, en la respuesta integrada al ICPN que presenta el gobierno como parte del informe del UNGASS. Sin embargo, esto no siempre se respeta. El informe regional sobre los datos del UNGASS 2006 del Caribe observó que “no siempre queda claro cuál es la respuesta que prevalece en el caso de discrepancia en las opiniones” (*Keeping score: AIDS responses in the Caribbean: a consolidated analysis based on Caribbean reports submitted to the UNGASS 2006*, pág. 25). Para garantizar la plena independencia de las respuestas del gobierno y las no gubernamentales, por ejemplo, el gobierno de Rwanda intencionalmente no participó en la reunión de consenso en las que se unificaron las respuestas de la sociedad civil al ICPN (Informe del UNGASS de Rwanda, 2008). Por lo general, las respuestas de los gobiernos al ICPN son más optimistas que las que proveen las organizaciones no gubernamentales. Siempre que se contó con ellos, en el informe se proporcionaron los datos del ICPN sobre ambas perspectivas.

¹ Los funcionarios del gobierno responden las preguntas sobre el plan estratégico nacional, el apoyo político y las políticas y estrategias clave de los programas relacionados con el VIH.

² Los representantes de las organizaciones no gubernamentales responden las preguntas sobre la situación de los derechos humanos en el país con respecto al VIH; la participación de la sociedad civil en la respuesta al VIH y sobre las políticas y estrategias clave de los programas relacionados con el VIH.

Notas sobre indicadores específicos

1. Gastos relacionados con el sida

A medida que continúa la ampliación de la respuesta nacional e internacional al sida, es cada vez más importante hacer un seguimiento detallado de (i) la forma en que se invierten los fondos a nivel nacional y (ii) del origen de esos fondos. Los datos se utilizan para medir el compromiso y la acción en el plano nacional, componentes importantes de la *Declaración de compromiso del UNGASS sobre el VIH/SIDA*. Además, los datos ayudan a que quienes toman las decisiones a nivel nacional puedan vigilar el alcance y la eficacia de sus programas. Cuando se los agrupa entre varios países, los datos también ayudan a la comunidad internacional a evaluar la situación de la respuesta mundial. Esta información estratégica respalda la función coordinadora de la Autoridad Nacional del Sida en cada país y sienta las bases para la asignación de los recursos y los procesos mejorados de planificación estratégica.

Dado que los distintos países pueden elegir entre diferentes metodologías e instrumentos para vigilar el flujo de los fondos para el sida —es decir, Evaluaciones del Gasto Nacional destinado al Sida (National AIDS Spending Assessments, NASA); subcuenta del sida de las Cuentas Nacionales de Salud (National Health Accounts, NHA) y las Encuestas ad hoc sobre el Flujo de los Recursos—, la Matriz Nacional de Financiamiento incluye una hoja de cálculo que permite ingresar, revisar e informar fácilmente los datos financieros obtenidos a partir de cualquiera de estas tres metodologías. Dado que se ha logrado un “cruce” entre las NASA y las NHA para los gastos de salud destinados al sida, ya no existe diferencia entre estas herramientas para rastrear los gastos de salud; las NASA sólo proporcionan más detalles sobre los gastos realizados en actividades fuera del sistema de salud, como mitigación social, educación, justicia y otras. Se inició un proceso de concordancia semejante para el Proyecto de Flujo de Recursos del Instituto Demográfico Interdisciplinario de los Países Bajos/UNFPA/ONUSIDA.

El objetivo de este indicador es recopilar datos precisos y sistemáticos sobre el modo en que se gastan los fondos a nivel nacional y sobre el origen de esos fondos.

³ En el marco de las estimaciones de necesidades de recursos y de las evaluaciones de gastos destinados al sida, se define como niños vulnerables a aquellos que tienen al menos un padre que está vivo pero gravemente enfermo (en especial a causa del VIH) y, por lo tanto, no puede cuidarlos.

Definición: Gasto nacional e internacional relacionado con el sida por categorías y fuentes de financiamiento.

Este indicador se mide utilizando una Evaluación del Gasto Nacional destinado al Sida, que documenta los gastos reales clasificados en ocho categorías y por fuente de financiamiento, incluido el gasto público de sus propias fuentes (es decir, de los ingresos fiscales, como los impuestos) y de fuentes internacionales:

1. Prevención
2. Atención y tratamiento
3. Huérfanos y niños vulnerables³
4. Fortalecimiento de la gestión y la administración de los programas
5. Incentivos para recursos humanos
6. Protección social y servicios sociales (excluidos huérfanos y niños vulnerables)
7. Facilitación del desarrollo del medio y la comunidad
8. Investigación (exceptuada la investigación de las operaciones, que está incluida en gestión de los programas).

Tres grupos principales de fuentes de financiamiento:

1. Pública nacional
2. Internacional
3. Privada nacional (opcional para el informe del UNGASS).

2. Políticas gubernamentales en relación con el VIH y el sida

Índice compuesto de política nacional

El propósito del Índice compuesto de política nacional es evaluar el progreso en el desarrollo y la ejecución de políticas y estrategias para la lucha contra el VIH y el sida en el plano nacional.

El índice compuesto cubre las siguientes grandes áreas de política, estrategia y ejecución de programas.

Parte A: respondida por funcionarios del gobierno

1. Plan estratégico
2. Apoyo político
3. Prevención

4. Tratamiento, atención y apoyo
5. Vigilancia y evaluación.

Parte B: respondida por representantes de la sociedad civil

1. Derechos humanos
2. Participación de la sociedad civil
3. Prevención
4. Asistencia y apoyo

3. Seguridad hematológica

El propósito de este indicador es evaluar el progreso en lo que respecta a garantizar el suministro de sangre segura. El indicador es válido para todos los países y se mide anualmente utilizando la base de datos mundial de la OMS sobre el Protocolo sobre Sangre Segura.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de unidades de donación de sangre analizadas sistemáticamente para la detección del VIH de una manera con garantía de la calidad.

Numerador: Número de unidades de donación de sangre analizadas sistemáticamente para la detección del VIH en centros hematológicos o laboratorios que realizan el análisis sistemático de sangre que: (i) han seguido los procedimientos operativos estándar y (ii) han participado en algún esquema externo de garantía de calidad.

Denominador: Número total de unidades de donación de sangre.

4. Tratamiento del VIH: terapia antirretrovírica

El propósito de este indicador es evaluar el progreso de los países en lo que concierne a la provisión de terapia antirretrovírica de combinación a adultos y niños con infección avanzada por el VIH. El indicador es válido para todos los países y los datos para el numerador se recopilan en forma continua (mensual o trimestralmente), mientras que el denominador es una estimación.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica.

Numerador: Número de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica según el protocolo de tratamiento aprobado en el país (o las normas de la OMS y el ONUSIDA) al final del período del informe.

Denominador: Número estimado de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada.

Notas sobre la metodología: todos los análisis de este indicador llevados a cabo para el *Informe mundial* —incluidas las cifras citadas de cada país— reflejan numeradores que atravesaron un proceso de conciliación realizado por tres organismos (ONUSIDA, OMS, UNICEF) y denominadores estimados directamente por el Grupo de Referencia del ONUSIDA y la OMS sobre metodología para Estimaciones, Elaboración de Modelos y Proyecciones (Spectrum).

El proceso de conciliación garantizó que todos los organismos informaran la misma cifra aprobada por el país, que fuera la más reciente y satisficiera la definición de personas con infección avanzada por el VIH que están recibiendo tratamiento. En los casos de discrepancia entre los tres organismos, se realizaron todos los esfuerzos posibles para obtener del país en cuestión la aprobación de un valor final para el indicador. En los casos en que esto no fue posible, el valor informado para el país lleva una nota al pie en el Anexo 2.

En cuanto a los datos representativos de 2007, algunos países no habían informado datos hasta diciembre de 2007. En estos casos, los datos se proyectaron a diciembre para que reflejaran un período coherente.⁴

Con el fin de mantener la coherencia, para todos los análisis y las cifras citadas en el texto, se utilizaron los denominadores estimados con la metodología del Grupo de Referencia del ONUSIDA/OMS para Estimaciones, Elaboración de Modelos y Proyecciones. Los denominadores informados por los países se incluyen en el Anexo 2.

5. Prevención de la transmisión materno-infantil

Sin intervenciones preventivas, los bebés que nacen de madres infectadas por el VIH que, además, los amamantan, tienen alrededor de una posibilidad en tres de contraer la infección. Esto puede suceder

⁴ Método utilizado para la proyección: todos los valores informados referidos a períodos anteriores a diciembre de 2007 se proyectan tomando los últimos dos datos informados y calculando el crecimiento por mes, que luego se utiliza para proyectar a diciembre de 2007.

durante el embarazo, durante el trabajo de parto y el parto mismo, o después del parto, por la lactancia. El riesgo de transmisión maternoinfantil puede reducirse de manera significativa a través de enfoques complementarios de los esquemas profilácticos antirretrovíricos para la madre con o sin profilaxis para el bebé, de la aplicación de prácticas seguras en el parto y del uso de alternativas seguras para la lactancia. También la profilaxis antirretrovírica seguida de la lactancia materna de manera exclusiva puede reducir el riesgo de transmisión vertical cuando la lactancia se limita a los primeros seis meses.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la prevención de la transmisión vertical del VIH.

Definición y componentes del indicador

Definición: *Porcentaje de embarazadas infectadas por el VIH que recibieron medicamentos antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil.*

Numerador: *Porcentaje de embarazadas infectadas por el VIH que recibieron medicamentos antirretrovíricos durante los últimos 12 meses para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil.*

Denominador: *Número estimado de embarazadas infectadas por el VIH en los últimos 12 meses.*

Todos los análisis de este indicador llevados a cabo para el *Informe mundial* —incluidas las cifras citadas de cada país— reflejan numeradores que atravesaron un proceso de conciliación realizado por tres organismos (ONUSIDA, OMS, UNICEF) y denominadores estimados directamente mediante la metodología del Grupo de Referencia del ONUSIDA y la OMS sobre Estimaciones, Elaboración de Modelos y Proyecciones (Spectrum).

El proceso de conciliación aseguró que todos los organismos informaran la misma cifra aprobada por el país, que fuera la más reciente y satisficiera la definición de mujeres infectadas por el VIH que recibieron terapia antirretrovírica durante los últimos 12 meses, y así reflejara un año completo. En los casos de discrepancia entre los tres organismos, se realizaron todos los esfuerzos posibles para obtener del país en cuestión la aprobación de un valor final para el indicador. En los casos en que esto no fue posible, el valor informado para el país lleva una nota al pie en el Anexo 2.

En cuanto a los datos representativos de 2007, algunos países no habían informado datos que reflejaran 12 meses. En estos casos, los datos se proyectaron para que reflejaran un período coherente.⁵

Con el fin de mantener la coherencia, para todos los análisis y las cifras citadas en el texto, se utilizaron los denominadores estimados con la metodología del Grupo de Referencia del ONUSIDA/OMS para Estimaciones, Elaboración de Modelos y Proyecciones. Los denominadores informados por los países se incluyen en el Anexo 2.

6. Tratamiento conjunto para la tuberculosis y para el VIH

La tuberculosis es una de las causas más comunes de morbilidad y mortalidad en las personas que viven con el VIH, aun en aquellos que reciben terapia antirretrovírica. Para mejorar la calidad y la cantidad de vida de las personas que viven con el VIH es necesario intensificar la detección precoz de la tuberculosis y el acceso a diagnóstico y tratamiento de calidad, en conformidad con las directrices internacionales y nacionales. Es importante medir el porcentaje de casos de personas VIH-positivas con tuberculosis que acceden al tratamiento adecuado para la tuberculosis y el VIH.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la detección y el tratamiento de la tuberculosis en las personas que viven con el VIH.

Definición y componentes del indicador

Definición: *Porcentaje de casos nuevos estimados de tuberculosis en VIH-positivos que recibieron tratamiento para la tuberculosis y el VIH.*

Numerador: *Número de adultos con infección por el VIH en etapa avanzada que están recibiendo terapia antirretrovírica de combinación, según el protocolo de tratamiento aprobado en el país (o las normas de la OMS y el ONUSIDA) y que iniciaron el tratamiento para la tuberculosis (en conformidad con las directrices del programa nacional sobre tuberculosis) dentro del año del informe.*

Denominador: *Número estimado de casos nuevos de tuberculosis en personas que viven con el VIH.*

⁵ Método para la proyección: todos los valores informados que representan un periodo menor de 12 meses se proyectan tomando el número de embarazadas VIH-positivas que reciben antirretrovíricos y dividiendo por el número de meses que los datos representan y multiplicando por 12 meses.

7. Pruebas del VIH en la población general

Con el objeto de protegerse a sí mismos y evitar infectar a otros, es importante que las personas conozcan su estado serológico en relación con el VIH. El conocimiento del estado propio es también un factor fundamental en la decisión de buscar tratamiento.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la puesta en práctica de las pruebas y el asesoramiento sobre el VIH.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que recibieron una prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen sus resultados.

Numerador: Número de encuestados de 15 a 49 años de edad que se hicieron la prueba del VIH durante los últimos 12 meses y conocen los resultados.

Denominador: Número de encuestados de 15 a 49 años de edad.

Algunos países eligieron informar sobre este indicador utilizando datos obtenidos a través de los programas de pruebas del VIH. Estos datos no son comparables con los obtenidos a través de las encuestas realizadas en la población general, y llevan una nota al pie en la tabla de datos.

8. Pruebas del VIH en las poblaciones más expuestas

Con el objeto de protegerse a sí mismos y evitar infectar a otros, es importante que las poblaciones más expuestas conozcan su estado serológico en relación con el VIH. El conocimiento del estado propio es también un factor fundamental en la decisión de buscar tratamiento. Este indicador debería calcularse por separado para cada población considerada más expuesta en cada país: profesionales del sexo, usuarios de drogas inyectables y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la puesta en práctica de las pruebas y el asesoramiento sobre el VIH en las poblaciones más expuestas.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de las poblaciones más expuestas que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen los resultados.

Numerador: Número de encuestados pertenecientes a las poblaciones más expuestas que se hicieron la

prueba del VIH durante los últimos 12 meses y conocen los resultados.

Denominador: Número de la población más expuesta incluido en la muestra.

9. Poblaciones más expuestas: programas de prevención

Con frecuencia es difícil establecer contacto con las poblaciones más expuestas a través de los programas de prevención del VIH. Sin embargo, con el objeto de evitar la propagación del VIH en estas poblaciones y en la población en general, es importante que estas personas accedan a los servicios ofrecidos. Este indicador debería calcularse separadamente para cada población considerada más expuesta en un país determinado: profesionales del sexo, usuarios de drogas inyectables y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la puesta en práctica de los programas de prevención del VIH dirigidos a las poblaciones más expuestas.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de las poblaciones más expuestas que logran atender los programas de prevención del VIH.

Numerador: Número de encuestados pertenecientes a poblaciones más expuestas que respondieron “sí” a las dos (a las tres en el caso de usuarios de drogas inyectables) preguntas siguientes:

1. *¿Sabe dónde ir si desea hacerse una prueba del VIH?*
2. *¿Alguien le entregó preservativos en los últimos doce meses?*
3. *(Usuarios de drogas inyectables) ¿Alguien le entregó agujas y jeringas estériles en los últimos doce meses?*

Denominador: Número total de encuestados

10. Ayuda para niños afectados por el VIH y el sida

En tanto el número de niños huérfanos y vulnerables continúa aumentando, es necesario que se garantice la ayuda necesaria para respaldar a las familias y a las comunidades. En la práctica, la atención y el apoyo para los niños huérfanos provienen de las familias y las comunidades. Para que esta ayuda sea sólida, es importante que los hogares se conecten con apoyo adicional proveniente de fuentes externas.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la provisión de apoyo a los hogares que cuidan de niños huérfanos y vulnerables entre 0 y 17 años de edad.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de huérfanos y niños vulnerables entre 0 y 17 años de edad cuyas familias recibieron apoyo externo básico gratuito para la atención infantil

Numerador: Número de niños huérfanos y vulnerables que viven en hogares que recibieron al menos uno de cuatro tipos de apoyo para cada niño.

Denominador: Número total de niños huérfanos y vulnerables entre 0 y 17 años de edad.

A los fines de este indicador y de acuerdo con las definiciones del UNICEF (ver referencia, abajo), se define huérfano como un niño menor de 18 años que ha perdido a uno de sus padres o a ambos.

Un niño vulnerable por causa del VIH debe tener menos de 18 años y:

- (i) haber perdido a uno de sus padres o a ambos; o
- (ii) uno de sus padres debe padecer una enfermedad crónica (independientemente de que viva o no en la misma casa que el niño); o
- (iii) vivir en un hogar en el que, en los últimos 12 meses, al menos un adulto haya fallecido y haya estado enfermo durante tres de los cuatro meses previos a su fallecimiento; o
- (iv) vivir en un hogar en el que al menos un adulto haya estado gravemente enfermo durante al menos tres de los 12 meses anteriores.

Algunos países eligieron informar sobre este indicador utilizando datos obtenidos a través de los programas de pruebas del VIH. Estos datos no son comparables con los obtenidos a través de las encuestas realizadas en la población general, y llevan una nota al pie en la tabla de datos.

11. Educación impartida en las escuelas basada en las aptitudes necesarias para la vida

La educación basada en las aptitudes necesarias para la vida es una metodología eficaz que utiliza ejercicios de participación para enseñar a los jóvenes comportamientos que los ayuden a lidiar con los desafíos y las exigencias de la vida cotidiana. Incluye, por ejemplo, técnicas de

toma de decisiones y de resolución de problemas, pensamiento creativo y crítico, conocimiento de uno mismo, comunicación y relaciones interpersonales. También puede enseñar a los jóvenes a enfrentar sus emociones y las causas de su estrés. Cuando se lo adapta específicamente a la educación escolar sobre el VIH, el enfoque basado en las aptitudes necesarias para la vida ayuda a los jóvenes a entender y evaluar los factores individuales, sociales y ambientales que aumentan o reducen el riesgo de transmisión del VIH. Si se lo lleva a la práctica de la manera apropiada, puede influir positivamente sobre los comportamientos, por ejemplo, la postergación del inicio sexual y la reducción del número de parejas sexuales.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado hacia la puesta en práctica de la educación basada en las aptitudes necesarias para la vida, impartida en todas las escuelas.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de escuelas que impartieron enseñanza sobre el VIH basada en las aptitudes para la vida durante el último año académico.

Numerador: Número de escuelas que impartieron enseñanza sobre el VIH basada en las aptitudes para la vida durante el último año académico.

Denominador: Número de escuelas encuestadas.

12. Huérfanos: asistencia escolar

El sida se apodera de números cada vez más altos de adultos justo en el momento de sus vidas en que están formando familias y criando niños. En consecuencia, la prevalencia de huérfanos aumenta de manera uniforme en muchos países, mientras que la menor cantidad de parientes en la edad adulta indicada hace que los niños enfrenten un futuro cada vez más incierto. A menudo, la orfandad viene acompañada de prejuicios y mayor pobreza, factores que limitan aún más las oportunidades de los niños de completar su educación escolar y que pueden dar lugar a la adopción de estrategias para sobrevivir que aumenten su vulnerabilidad al VIH. Por lo tanto, es importante hacer un seguimiento del grado en que los programas de apoyo en la lucha contra el sida logran su objetivo en relación con garantizar las oportunidades educativas de los niños huérfanos.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la prevención de la desventaja relativa que muestran los huérfanos, en

comparación con los no huérfanos, en cuanto a la asistencia escolar.

Definición y componentes del indicador

Definición: Asistencia escolar actual entre huérfanos y no huérfanos de 10 a 14 años de edad.

Parte A: Tasa actual de asistencia escolar de los niños huérfanos entre 10 y 14 años de edad.

Numerador: Número de niños que han perdido a ambos padres y que asisten a la escuela.

Denominador: Número de niños que han perdido a ambos padres.

Parte B: Tasa actual de asistencia escolar de los niños entre 10 y 14 años cuyos padres, ambos, están vivos, y que viven con al menos uno de ellos.

Numerador: Número de niños cuyos padres, ambos, están vivos, que viven con al menos uno de ellos y que van a la escuela.

Denominador: Número de niños cuyos padres, ambos, están vivos, y que viven con al menos uno de ellos.

13. Jóvenes: conocimiento sobre la prevención del VIH

Las epidemias de VIH se han perpetuado principalmente a través de la transmisión sexual de la infección a las sucesivas generaciones de jóvenes. Los conocimientos sólidos sobre el VIH y el sida constituyen un requisito fundamental —aunque con frecuencia insuficiente— para la adopción de comportamientos que reducen el riesgo de transmisión del VIH.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en pos del conocimiento universal de los datos fundamentales que atañen a la transmisión del VIH.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años de edad que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las falsas ideas principales acerca de la transmisión del VIH.

Numerador: Número de encuestados entre 15 y 24 años de edad que respondieron correctamente las cinco preguntas siguientes:

1. *¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH teniendo relaciones sexuales con sólo una pareja no infectada que, a su vez, no tenga otras parejas?*

2. *¿Puede una persona reducir el riesgo de contraer el VIH usando preservativo cada vez que tiene relaciones sexuales?*

3. *¿Puede una persona de aspecto saludable tener VIH?*

4. *¿Puede una persona contraer el VIH por una picadura de mosquito?*

5. *¿Puede una persona contraer el VIH por compartir una comida con alguien que está infectado?*

Denominador: Número de encuestados entre 15 y 24 años de edad.

14. Poblaciones más expuestas: conocimiento sobre la prevención del VIH

Por lo general, la transmisión sexual o el uso de equipos de inyección contaminados son los factores determinantes de las epidemias concentradas. Los conocimientos sólidos sobre el VIH constituyen un requisito fundamental para que las personas adopten comportamientos que reduzcan su riesgo de infección. Este indicador debería calcularse separadamente para cada población considerada más expuesta en un país determinado: profesionales del sexo, usuarios de drogas inyectables y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en el desarrollo del conocimiento de los hechos fundamentales que atañen a la transmisión del VIH entre las poblaciones más expuestas.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de poblaciones más expuestas que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las principales ideas erróneas acerca de la transmisión del VIH.

Numerador: Número de encuestados en la población más expuesta que respondieron correctamente las cinco preguntas siguientes:

1. *¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH teniendo relaciones sexuales con sólo una pareja no infectada que, a su vez, no tenga otras parejas?*
3. *¿Puede una persona reducir el riesgo de contraer el VIH usando preservativo cada vez que tiene relaciones sexuales?*

3. ¿Puede una persona de aspecto saludable tener VIH?
4. ¿Puede una persona contraer el VIH por una picadura de mosquito?
5. ¿Puede una persona contraer el VIH por compartir una comida con alguien que está infectado?

Denominador: Número de encuestados en la población más expuesta que respondieron, incluida la respuesta “no lo sé”, a las cinco preguntas.

15. Relaciones sexuales antes de los 15 años de edad

En muchos países, una de las metas principales es retrasar la edad a la que los jóvenes se inician en el sexo y desalentar la actividad sexual prematrimonial, para reducir la posible exposición al VIH. También se tienen pruebas suficientes para sugerir que la iniciación sexual a una edad más tardía reduce la susceptibilidad a la infección por acto sexual, al menos para las mujeres.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en aumentar la edad a la que las mujeres y los varones jóvenes, entre 15 y 24 años, se inician en el sexo.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 24 años de edad que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años.

Numerador: Número de encuestados (15-24 años) que informan haber tenido relaciones sexuales por primera vez antes de los 15 años de edad.

Denominador: Número de encuestados entre 15 y 24 años de edad.

16. Relaciones sexuales de mayor riesgo

La propagación del VIH depende en gran medida de las relaciones sexuales sin protección entre personas con un número elevado de parejas sexuales. Quienes tienen varias parejas sexuales (en forma concurrente o sucesiva) corren mayor riesgo de transmisión del VIH que quienes no se vinculan con una red sexual más extensa.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en reducir el porcentaje de personas que practican sexo de mayor riesgo.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja.

Numerador: Número de encuestados de 15 a 49 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja.

Denominador: Número de encuestados entre 15 y 49 años de edad.

17. Uso de preservativo durante relaciones sexuales de mayor riesgo

El uso de preservativo es una medida importante de protección contra el VIH, en especial entre las personas que tienen múltiples parejas sexuales.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la prevención de la exposición al VIH a través de relaciones sexuales sin protección con parejas no habituales.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y usaron preservativo en la última relación sexual.

Numerador: Número de encuestados (entre 15 y 49 años de edad) que declararon haber tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y haber usado preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales.

Denominador: Número de encuestados de 15 a 49 años que declararon haber tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses.

18. Profesionales del sexo: uso de preservativos

Son varios los factores que aumentan el riesgo de exposición al VIH entre los profesionales del sexo, entre ellos, el tener múltiples parejas sexuales no habituales y relaciones sexuales más frecuentes. Sin embargo, los profesionales del sexo pueden reducir marcadamente el riesgo de transmisión del VIH, de y a los clientes, mediante el uso sistemático y correcto de preservativos.

Nota: Los países con epidemias generalizadas también pueden tener subepidemias concentradas entre los profesionales del sexo. Si eso ocurre, sería de gran utilidad que calcularan e informaran este indicador para esta población.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la prevención de la exposición de los profesionales del sexo al VIH a

través de las relaciones sexuales sin protección con sus clientes.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de profesionales del sexo de ambos sexos que comunican haber usado preservativo con su cliente más reciente.

Numerador: Número de encuestados que informaron haber usado preservativo con su último cliente en los últimos 12 meses.

Denominador: Número de encuestados que informaron haber tenido relaciones sexuales remuneradas en los últimos 12 meses.

19. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: uso de preservativos

Los preservativos pueden reducir notablemente el riesgo de transmisión sexual del VIH. Por lo tanto, es importante que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres usen preservativos en forma sistemática y correcta, dado el alto riesgo de transmisión del VIH durante las relaciones sexuales anales sin protección. Además, es posible que los hombres que tienen relaciones sexuales vía anal con otros hombres tengan también parejas femeninas que podrían infectarse. El uso de preservativo con su pareja masculina más reciente se considera un indicador confiable de comportamiento a más largo plazo.

Nota: Los países con epidemias generalizadas también pueden tener subepidemias concentradas entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Si eso ocurre, sería de gran utilidad que calcularan e informaran este indicador para esta población.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la prevención de la exposición al VIH de los hombres que tienen relaciones sexuales anales sin protección con una pareja masculina.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de varones que informaron haber usado un preservativo en su última relación sexual anal con una pareja masculina.

Numerador: Número de encuestados que informaron haber usado preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales anales.

Denominador: Número de encuestados que informaron haber tenido relaciones sexuales anales con una pareja varón en los últimos seis meses.

20. Consumidores de drogas inyectables: uso de preservativos

Las prácticas sexuales y de inyección seguras entre los usuarios de drogas inyectables son fundamentales aun en aquellos países en los que predominan otras modalidades de transmisión del VIH porque: (i) el riesgo de transmisión del VIH como consecuencia del uso de equipos de inyección contaminados es extremadamente elevado, y (ii) los usuarios de drogas inyectables pueden propagar el VIH (por ejemplo, mediante la transmisión sexual) a la población en general.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la prevención de la transmisión sexual del VIH.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que informan haber usado preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales.

Numerador: Número de encuestados que informaron haber usado preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales.

Denominador: Número de encuestados que informaron haber tenido relaciones sexuales en el último mes.

21. Consumidores de drogas inyectables: prácticas seguras de inyección

Las prácticas sexuales y de inyección seguras entre los usuarios de drogas inyectables son fundamentales aun en aquellos países en los que predominan otras modalidades de transmisión del VIH porque: (i) el riesgo de transmisión del VIH como consecuencia del uso de equipos de inyección contaminados es extremadamente elevado, y (ii) los usuarios de drogas inyectables pueden propagar el VIH (por ejemplo, mediante la transmisión sexual) a la población en general.

Nota: Los países con epidemias generalizadas también pueden tener subepidemias concentradas entre los usuarios de drogas inyectables. Si eso ocurre, sería de gran utilidad que calcularan e informaran este indicador para esta población.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en la prevención de la

transmisión del VIH asociada al consumo de drogas inyectables.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que informan haber utilizado equipo de inyección estéril la última vez que se inyectaron.

Numerador: Número de encuestados que informaron haber utilizado equipo de inyección estéril la última vez que se inyectaron drogas.

Denominador: Número de encuestados que informaron haberse inyectado drogas en el último mes.

24. Tratamiento del VIH: supervivencia después de 12 meses de iniciada la terapia antirretrovírica

Uno de los objetivos de cualquier programa de tratamiento antirretrovírico es prolongar la supervivencia de las personas infectadas. Habida cuenta de la ampliación del acceso a la terapia antirretrovírica en todo el mundo, también es importante comprender por qué y de qué manera las personas abandonan los programas de tratamiento. Estos datos pueden utilizarse para demostrar la eficacia de dichos programas y para destacar los obstáculos que detienen la expansión y corregirlos.

El propósito de este indicador es evaluar el progreso realizado en aumentar la supervivencia de los adultos y niños infectados haciendo que permanezcan en el tratamiento antirretrovírico.

Definición y componentes del indicador

Definición: Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que siguen con el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de haberlo comenzado.

Numerador: Número de adultos y niños que continúan vivos y recibiendo tratamiento antirretrovírico 12 meses después de haberlo comenzado.

Denominador: Número total de adultos y niños que iniciaron el tratamiento antirretrovírico, para quienes se esperaba que alcanzaran los resultados de los 12 meses dentro del período del informe, incluidos aquellos que fallecieron después de iniciar el tratamiento antirretrovírico, los que abandonaron el tratamiento y los registrados como perdidos en el seguimiento al mes 12.

Se hicieron modificaciones en este indicador para que reflejara sólo la supervivencia mínima. Por esta razón, es posible que el indicador refleje una tasa de supervivencia inferior a la definición de supervivencia máxima que excluye a las personas que abandonaron la terapia antirretrovírica, que fallecieron o que se perdieron en el seguimiento. En aquellos casos en que se sabe que el valor informado para un dato no refleja esta definición, la información se incluyó en una nota al pie de las tablas del anexo.

Todos los análisis de este indicador llevados a cabo para el *Informe mundial*, incluidas las cifras citadas por país, reflejan numeradores sometidos a un proceso de conciliación realizado por dos organismos (ONUSIDA y OMS).

El proceso de conciliación aseguró que todos los organismos informaran la misma cifra aprobada por el país, que fuera la más reciente y satisficiera la definición de una supervivencia mínima de 12 meses de una cohorte. En los casos de discrepancia entre los dos organismos, se realizaron todos los esfuerzos posibles para obtener del país en cuestión la aprobación de un valor final para el indicador. En los casos en que esto no fue posible, el valor informado para el país lleva una nota al pie en el Anexo 2.

Países que presentaron informes sobre la aplicación de la Declaración de compromiso (n = 147)

Ingresos altos

Antigua y Barbuda
 Barbados
 Bahamas
 Chipre
 Estonia
 Israel
 Qatar
 Eslovenia
 Trinidad y Tobago
 Australia
 Bélgica
 Canadá
 Suiza
 Alemania
 España
 Finlandia
 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
 Grecia
 Irlanda
 Japón
 Países Bajos
 Nueva Zelandia
 Suecia

Caribe

Haití
 Cuba
 República Dominicana
 Jamaica
 Dominica
 Granada
 Saint Kitts y Nevis
 Santa Lucía
 San Vicente y las Granadinas

Asia oriental

Mongolia
 China

Europa oriental y Asia central

Kirguistán
 Tayikistán
 Uzbekistán

Armenia
 Azerbaiyán
 Bosnia y Herzegovina
 Belarús
 Georgia
 Moldova
 Ucrania
 Bulgaria
 Croacia
 Kazajstán
 Lituania
 Letonia
 Rumania
 Federación de Rusia

América Latina

Bolivia
 Colombia
 Ecuador
 Guatemala
 Guyana
 Honduras
 Nicaragua
 Perú
 Paraguay
 Suriname
 El Salvador
 Argentina
 Brasil
 Belice
 Chile
 Costa Rica
 México
 Panamá
 Uruguay

África del Norte y Oriente Medio

Sudán
 Argelia
 Jordania
 Marruecos
 Túnez
 Líbano
 Turquía

Oceanía

Papua Nueva Guinea
 Fiji

Micronesia, Estados Federados de
Islas Marshall
Tuvalu
Palau

Asia meridional y sudoriental

Afganistán
Bangladesh
India
Camboya
República Democrática Popular Lao
Nepal
Pakistán
Vietnam
Indonesia
Irán, República Islámica del
Sri Lanka
Filipinas
Tailandia
Malasia

África subsahariana

Burkina Faso
Burundi
Benin
Rep. Democrática del Congo
República Centroafricana
Côte d'Ivoire
Eritrea
Etiopía
Ghana
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Comoras
Madagascar
Malí
Mauritania
Malawi
Mozambique
Níger
Nigeria
Rwanda
Sierra Leona
Senegal
Somalia
Santo Tomé y Príncipe
Chad

Togo
República Unida de Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Angola
Congo, República Democrática del
Camerún
Cabo Verde
Lesotho
Namibia
Swazilandia
Botswana
Gabón
Mauricio
Seychelles
Sudáfrica

Europa occidental y central

Albania
Ex República Yugoslava de Macedonia
Hungría
Montenegro
Polonia
Serbia

Indicador 1 del UNGASS. Informes de los países de gastos nacionales e internacionales relacionados con el sida por categorías de servicio y fuentes de financiamiento.

Región/país que presenta el informe	Año del gasto	Total informado de gasto público nacional e internacional en millones de dólares estadounidenses	Parte por fuente de financiación					Gastos totales relacionados con el VIH en servicios seleccionados (US\$ millone)		
			Pública nacional (%)	Internacional				Prevención		
				Bilaterales (%)	Multilaterales		Todas las demás fuentes internacionales o no especificadas (%)	Total para prevención	Comunicación para cambio social y comportamental	Asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH
					Fondo Mundial (%)	ONU y todas las demás multilaterales (%)				
Caribe										
Antigua y Barbuda	2006	\$0,157	65,9%	25,4%	8,7%	0,0%	0,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Antigua y Barbuda ¹	2007	\$0,160	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Aruba ¹	2005	\$0,010	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Aruba ¹	2006	\$0,010	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Aruba ¹	2007	\$0,010	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Bahamas ¹	2006	\$2,145	71,6%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	28,4%	\$0,005	NC / NI	NC / NI
Barbados ¹	2006	\$7,073	98,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	2,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Cuba	2007	\$41,927	80,9%	0,0%	19,1%	0,0%	0,0%	\$6,385	\$5,584	\$0,801
República Dominicana ¹	2007	\$13,737	44,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	56,0%	\$4,121	NC / NI	NC / NI
Granada ¹	2006	\$1,050	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Haití	2006	\$70,284	0,6%	67,3%	24,0%	6,50%	1,55%	\$12,597	\$1,882	\$3,427
Jamaica	2005	\$11,306	54,5%	5,8%	39,7%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Jamaica	2006	\$10,362	65,9%	5,2%	28,9%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Jamaica	2007	\$14,749	62,5%	2,0%	35,5%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Santa Lucía	2006	\$1,000	21,4%	0,0%	7,8%	46,7%	24,10%	\$0,604	\$0,105	\$0,014
Santa Lucía	2007	\$0,772	21,6%	0,0%	13,9%	64,6%	0,0%	\$0,446	\$0,202	\$0,042
Trinidad y Tabago	2006	\$12,148	95,6%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	\$5,626	\$3,218	\$0,118
Islas Turcas y Caicos	2006	\$0,958	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Islas Turcas y Caicos	2007	\$1,109	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Asia oriental										
China	2006	\$138,927	77,1%	4,6%	17,5%	0,8%	0,0%	\$0,927	\$0,927	NC / NI
China ²	2007	\$124,116	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$48,078	\$46,392	\$0,897
Japón	2006	\$68,135	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	\$4,130	NC / NI	NC / NI
Mongolia	2007	\$3,377	7,3%	23,6%	36,0%	19,2%	14,0%	\$1,946	\$0,179	\$0,184
Europa oriental y Asia central										
Armenia	2007	\$2,476	16,2%	7,3%	55,7%	20,8%	0,0%	\$1,296	\$0,101	\$0,197
Azerbaiyán	2007	\$2,220	65,7%	0,0%	34,3%	NC / NI	0,0%	\$0,851	NC / NI	\$0,851
Belarús	2006	\$13,133	68,19%	0,0%	28,53%	2,25%	1,03%	\$9,745	\$0,491	\$0,977
Bulgaria	2005	\$7,778	35,40%	0,0%	57,71%	6,89%	0,0%	\$3,758	\$0,336	\$0,627
Bulgaria	2006	\$6,604	48,8%	0,0%	43,0%	8,2%	0,0%	\$3,114	\$0,440	\$0,491
Bulgaria	2007	\$6,659	50,8%	0,0%	43,4%	5,9%	0,0%	\$2,877	\$0,418	\$0,552
Croacia	2006	\$8,424	73,8%	0,0%	23,0%	2,3%	0,9%	\$3,743	NC / NI	\$0,442
Georgia	2006	\$5,263	10,9%	19,3%	56,5%	13,3%	0,0%	\$2,563	\$0,058	\$0,066

Indicador 1 del UNGASS. Informes de los países de gastos nacionales e internacionales relacionados con el sida por categorías de servicio y fuentes de financiamiento.

Gastos totales relacionados con el VIH en servicios seleccionados (US\$ millone)

Prevención			Atención y tratamiento		Niños huérfanos y vulnerables	Apoyo al programa			Otros gastos relacionados con el VIH
Programas para profesionales del sexo y sus clientes, para HSH y programa para reducción del daño para UDI	Marketing social de preservativos, provisión de preservativos en el sector público y comercial, y preservativo femenino	Prevención de la transmisión maternoinfantil	Total para atención y tratamiento	Terapia antirretrovírica		Total para el apoyo y la gestión del programa	Gestión, planificación y coordinación del programa	Vigilancia y evaluación ⁴	
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,704	\$0,408	NC / NI	\$0,145	\$0,115	\$0,001	\$1,290
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$32,604	\$11,314	NC / NI	\$0,176	\$0,176	NC / NI	\$2,762
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$3,434	NC / NI	NC / NI	\$2,473	NC / NI	NC / NI	\$3,709
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
\$0,914	\$0,818	\$3,288	\$31,192	\$13,910	\$2,450	\$20,286	\$10,159	\$4,639	\$3,759
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
\$0,001	\$0,103	\$0,010	\$0,066	\$0,015	\$0,052	\$0,080	\$0,048	\$0,025	\$0,198
\$0,005	\$0,050	\$0,001	\$0,077	\$0,029	\$0,075	\$0,139	\$0,051	\$0,086	\$0,036
\$0,651	\$0,170	\$0,113	\$3,989	\$1,184	\$0,131	\$1,778	\$1,405	\$0,054	\$0,624
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$1,012	NC / NI	\$0,505	\$7,300	\$4,781	\$2,329	\$129,153
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$56,583	\$43,669	NC / NI	\$17,362	\$0,947	\$4,502	\$2,093
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$9,389	NC / NI	NC / NI	\$17,398	NC / NI	NC / NI	\$37,218
\$0,312	\$0,291	\$0,076	\$0,205	\$0,010	\$0,016	\$0,801	\$0,453	\$0,198	\$0,409
\$0,154	\$0,016	\$0,045	\$0,392	\$0,098	\$0,004	\$0,287	\$0,188	\$0,099	\$0,498
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,500	\$0,417	NC / NI	\$0,411	\$0,411	NC / NI	\$0,458
NC / NI	\$0,233	\$0,366	\$1,443	\$0,823	\$0,084	\$0,854	\$0,233	\$0,221	\$1,007
\$0,842	NC / NI	NC / NI	\$2,689	\$1,614	NC / NI	\$0,561	\$0,337	\$0,135	\$0,770
\$0,588	\$0,122	NC / NI	\$2,585	\$1,955	NC / NI	\$0,363	\$0,218	\$0,087	\$0,543
\$0,597	NC / NI	NC / NI	\$2,932	\$2,025	NC / NI	\$0,348	\$0,209	\$0,084	\$0,501
\$0,509	NC / NI	NC / NI	\$4,354	NC / NI	NC / NI	\$0,328	\$0,125	\$0,080	NC / NI
\$1,025	\$0,079	\$0,225	\$0,839	\$0,552	NC / NI	\$1,036	\$0,206	\$0,088	\$0,824

Indicador 1 del UNGASS. Informes de los países de gastos nacionales e internacionales relacionados con el sida por categorías de servicio y fuentes de financiamiento.

Región/país que presenta el informe	Año del gasto	Total informado de gasto público nacional e internacional en millones de dólares estadounidenses	Parte por fuente de financiación					Gastos totales relacionados con el VIH en servicios seleccionados (US\$ millone)		
			Pública nacional (%)	Internacional				Total para prevención	Comunicación para cambio social y comportamental	Asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH
				Bilaterales (%)	Multilaterales		Todas las demás fuentes internacionales o no especificadas (%)			
					Fondo Mundial (%)	ONU y todas las demás multilaterales (%)				
Kazajstán	2007	\$17,959	70,0%	1,3%	27,3%	0,6%	0,7%	\$3,392	\$0,111	NC / NI
Kirguistán	2006	\$7,917	8,8%	8,7%	38,7%	43,8%	0,0%	\$6,469	\$0,049	\$0,088
Letonia ¹	2006	\$5,748	98,7%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	1,3%	\$0,996	\$0,032	\$0,186
República de Moldova	2007	\$8,186	26,9%	19,0%	17,1%	31,9%	5,1%	\$6,292	\$0,903	\$0,325
Rumania	2006	\$76,088	93,1%	0,0%	5,4%	1,4%	0,0%	\$5,239	NC / NI	NC / NI
Federación de Rusia ¹	2006	\$304,835	83,4%	0,0%	11,6%	0,3%	4,7%	\$61,749	NC / NI	NC / NI
Tayikistán	2006	\$5,211	5,7%	19,4%	36,6%	19,8%	18,5%	\$2,509	\$0,173	\$0,140
Ucrania	2005	\$39,414	42,9%	17,1%	32,9%	5,5%	1,7%	\$7,442	\$0,025	\$0,373
Ucrania	2006	\$55,417	50,8%	8,2%	36,3%	3,1%	1,6%	\$17,067	\$0,197	\$0,715
América Latina										
Argentina	2006	\$149,527	96,7%	0,1%	2,9%	0,2%	0,2%	\$24,855	\$2,141	\$3,011
Bolivia	2005	\$1,833	9,6%	44,7%	21,4%	NC / NI	24,2%	\$0,918	\$0,182	NC / NI
Bolivia	2006	\$4,025	9,1%	16,6%	51,6%	3,0%	19,8%	\$1,242	\$0,228	NC / NI
Bolivia	2007	\$3,183	16,9%	40,7%	16,5%	5,7%	20,1%	\$1,252	\$0,209	NC / NI
Brasil ¹	2006	\$565,186	99,5%	0,1%	0,0%	0,3%	0,0%	\$34,159	\$9,903	\$2,455
Chile	2005	\$54,070	83,6%	0,0%	16,4%	0,0%	0,0%	\$9,472	\$0,555	\$0,430
Colombia	2006	\$97,645	98,91%	0,0%	0,92%	0,14%	0,0%	\$34,662	\$2,799	\$0,031
Costa Rica	2006	\$11,271	89,6%	0,0%	9,1%	0,8%	0,6%	\$3,418	\$0,707	NC / NI
Ecuador ¹	2005	\$2,951	88,9%	0,0%	4,2%	6,8%	0,0%	\$0,545	\$0,013	\$0,250
Ecuador ¹	2006	\$10,209	31,9%	0,0%	61,8%	4,6%	1,7%	\$2,942	\$0,052	\$0,489
Ecuador ¹	2007	\$7,473	42,8%	0,0%	38,6%	3,7%	14,8%	\$2,413	\$0,022	\$0,435
El Salvador	2006	\$33,128	82,0%	1,3%	8,4%	7,7%	0,6%	\$9,691	\$1,483	\$1,135
Guatemala ¹	2005	\$19,142	66,4%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	33,6%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Guatemala ¹	2006	\$18,957	65,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	35,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Honduras	2006	\$14,354	28,9%	23,5%	28,5%	4,4%	14,5%	\$6,183	\$0,430	\$0,943
México ¹	2005	\$176,052	99,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,7%	\$40,663	\$0,291	\$2,950
Panamá	2006	\$14,164	97,3%	0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	\$0,438	NC / NI	\$0,038
Paraguay	2006	\$1,018	75,5%	0,0%	0,0%	17,2%	7,3%	\$0,234	NC / NI	\$0,111
Paraguay	2007	\$2,326	47,8%	0,0%	31,2%	11,2%	9,7%	\$0,796	NC / NI	\$0,154
Perú	2005	\$21,875	41,33%	6,63%	34,06%	2,86%	15,12%	\$5,115	\$0,063	NC / NI
Perú	2006	\$32,387	41,07%	1,72%	32,0%	1,74%	23,47%	\$4,769	\$0,197	NC / NI
Perú	2007	\$28,008	44,5%	3,6%	21,8%	4,4%	25,7%	\$9,060	\$0,978	NC / NI
Uruguay ¹	2005	\$6,245	94,9%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	5,1%	\$0,770	\$0,030	\$0,162
Uruguay ¹	2006	\$5,731	93,3%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	6,7%	\$0,852	\$0,081	\$0,168

Indicador 1 del UNGASS. Informes de los países de gastos nacionales e internacionales relacionados con el sida por categorías de servicio y fuentes de financiamiento.

Gastos totales relacionados con el VIH en servicios seleccionados (US\$ millone)

Prevención			Atención y tratamiento		Niños huérfanos y vulnerables	Apoyo al programa			Otros gastos relacionados con el VIH
Programas para profesionales del sexo y sus clientes, para HSH y programa para reducción del daño para UDI	Marketing social de preservativos, provisión de preservativos en el sector público y comercial, y preservativo femenino	Prevención de la transmisión maternoinfantil	Total para atención y tratamiento	Terapia antirretrovírica		Total para el apoyo y la gestión del programa	Gestión, planificación y coordinación del programa	Vigilancia y evaluación ⁴	
\$0,030	\$0,899	NC / NI	\$2,400	\$2,066	NC / NI	\$11,850	\$0,158	\$0,181	\$0,317
\$0,610	\$0,016	NC / NI	\$0,847	\$0,169	\$0,033	\$0,470	\$0,355	\$0,030	\$0,098
\$0,338	NC / NI	\$0,028	\$4,400	\$4,400	NC / NI	\$0,352	\$0,352	NC / NI	NC / NI
\$0,332	NC / NI	\$0,231	\$0,680	\$0,456	NC / NI	\$1,137	\$0,185	\$0,337	\$0,078
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$57,796	NC / NI	NC / NI	\$0,322	NC / NI	NC / NI	\$12,732
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$96,798	NC / NI	\$32,610	\$18,636	NC / NI	NC / NI	\$95,041
\$0,285	\$0,105	\$0,030	\$0,144	\$0,114	\$0,020	\$0,335	\$0,144	\$0,095	\$2,203
\$3,174	NC / NI	\$0,837	\$15,751	\$2,416	\$0,952	\$7,678	\$3,342	\$0,991	\$7,591
\$7,267	NC / NI	\$0,529	\$23,289	\$5,352	\$0,901	\$10,434	\$2,675	\$0,356	\$3,727
\$0,544	\$1,034	\$4,842	\$107,280	\$58,897	\$1,272	\$6,915	\$1,682	\$0,659	\$9,206
\$0,006	\$0,004	\$0,001	\$0,483	\$0,247	NC / NI	\$0,266	\$0,102	\$0,038	\$0,166
\$0,002	\$0,002	\$0,004	\$1,881	\$1,664	NC / NI	\$0,653	\$0,239	\$0,100	\$0,248
\$0,028	\$0,044	\$0,001	\$0,766	\$0,450	NC / NI	\$0,868	\$0,526	\$0,090	\$0,297
\$0,405	\$7,440	\$5,155	\$470,055	\$438,384	\$0,148	\$25,403	\$19,971	\$4,899	\$35,420
\$0,108	\$0,983	\$1,919	\$40,429	\$36,318	NC / NI	\$2,204	\$1,554	\$0,276	\$1,966
NC / NI	\$6,967	\$2,132	\$62,074	\$36,541	\$0,035	\$0,774	\$0,774	NC / NI	\$0,100
NC / NI	\$0,080	NC / NI	\$7,681	\$4,141	\$0,057	\$0,072	NC / NI	\$0,011	\$0,042
NC / NI	NC / NI	\$0,011	\$1,661	\$1,468	\$0,019	\$0,534	\$0,033	NC / NI	\$0,191
NC / NI	\$0,027	\$0,534	\$3,986	\$1,932	\$0,003	\$1,201	\$0,095	\$0,102	\$2,078
\$0,013	\$0,283	\$0,188	\$3,125	\$2,358	NC / NI	\$0,376	\$0,118	\$0,146	\$1,559
\$0,055	\$1,450	\$1,019	\$20,867	\$7,551	\$0,399	\$1,024	\$0,510	\$0,335	\$1,147
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
\$0,499	\$0,305	\$0,420	\$4,204	\$2,420	\$0,030	\$3,687	\$1,659	\$1,145	\$0,250
\$5,227	\$3,369	\$4,472	\$122,333	\$103,396	\$0,036	\$12,404	\$3,737	\$1,149	\$0,615
\$0,073	NC / NI	\$0,011	\$13,425	\$13,422	\$0,012	\$0,206	\$0,071	NC / NI	\$0,083
NC / NI	\$0,020	\$0,059	\$0,481	\$0,163	NC / NI	\$0,009	\$0,005	\$0,004	\$0,294
\$0,088	\$0,036	\$0,091	\$0,683	\$0,374	NC / NI	\$0,168	\$0,045	\$0,063	\$0,679
\$1,128	\$0,808	\$0,555	\$13,168	\$7,806	NC / NI	\$0,543	\$0,311	\$0,225	\$3,049
\$0,798	\$0,763	\$0,970	\$20,738	\$13,858	NC / NI	\$0,688	\$0,286	\$0,378	\$6,192
\$1,935	\$1,781	\$1,428	\$12,448	\$3,163	\$0,090	\$0,948	\$0,491	\$0,436	\$5,461
\$0,042	\$0,079	\$0,073	\$4,237	\$3,816	NC / NI	\$0,135	NC / NI	\$0,014	\$1,103
\$0,037	\$0,069	\$0,052	\$3,549	\$3,074	NC / NI	\$0,196	NC / NI	\$0,015	\$1,135

Indicador 1 del UNGASS. Informes de los países de gastos nacionales e internacionales relacionados con el sida por categorías de servicio y fuentes de financiamiento.

Región/país que presenta el informe	Año del gasto	Total informado de gasto público nacional e internacional en millones de dólares estadounidenses	Parte por fuente de financiación					Gastos totales relacionados con el VIH en servicios seleccionados (US\$ millone)		
			Pública nacional (%)	Internacional			Total para prevención	Comunicación para cambio social y comportamental	Asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH	
				Bilaterales (%)	Multilaterales					
					Fondo Mundial (%)	ONU y todas las demás multilaterales (%)				Todas las demás fuentes internacionales o no especificadas (%)
Oriente Medio y África del Norte										
Argelia	2006	\$3,674	30,9%	0,0%	65,2%	3,9%	0,0%	\$1,561	\$0,038	\$0,046
Jordania	2007	\$2,697	5,1%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	94,9%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Líbano	2007	\$2,735	30,5%	36,2%	0,0%	17,1%	16,2%	\$1,445	\$0,050	\$0,055
Marruecos	2006	\$6,900	33,0%	9,8%	32,5%	11,9%	12,8%	\$2,996	NC / NI	NC / NI
Marruecos	2007	\$8,833	30,5%	3,4%	54,5%	8,4%	3,2%	\$4,147	NC / NI	NC / NI
Sudán, Norte ¹	2007	\$15,985	8,8%	0,0%	57,9%	33,4%	0,0%	\$8,923	\$1,024	\$0,731
Sudán, Sur ¹	2006	\$0,260	NC / NI	NC / NI	NC / NI	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Sudán, Sur ¹	2007	\$1,313	NC / NI	NC / NI	NC / NI	100,0%	NC / NI	\$0,518	\$0,259	\$0,152
Turquía ¹	2006	\$54,175	92,3%	0,0%	3,2%	4,6%	0,0%	\$27,657	\$0,145	\$0,055
Turquía ¹	2007	\$56,472	89,3%	0,0%	3,5%	7,2%	0,0%	\$25,265	\$0,087	\$0,089
Oceanía										
Australia	2006	\$101,415	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	\$1,898	\$0,079	NC / NI
Islas Marshall	2007	\$0,123	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Palau	2007	\$0,333	16,4%	0,0%	10,7%	0,0%	72,9%	\$0,148	\$0,005	\$0,026
Asia meridional y sudoriental										
Camboya	2006	\$44,179	13,7%	42,5%	21,5%	19,2%	3,2%	\$19,948	\$0,685	\$2,587
Indonesia	2006	\$56,577	26,6%	47,7%	18,5%	7,2%	0,0%	\$23,180	\$3,765	\$0,128
Irán (República Islámica del)	2006	\$32,778	90,8%	0,0%	5,9%	3,3%	0,0%	\$20,483	NC / NI	NC / NI
República Democrática Popular Lao ¹	2006	\$4,676	0,5%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	99,5%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
República Democrática Popular Lao ¹	2007	\$5,824	0,4%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	99,6%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Nepal ¹	2006	\$8,897	2,4%	46,5%	12,7%	14,4%	24,0%	\$6,120	\$0,289	\$0,281
Pakistán	2007	\$5,077	36,1%	0,0%	0,0%	59,8%	4,1%	\$3,597	NC / NI	NC / NI
Filipinas	2005	\$6,842	18,9%	35,6%	28,7%	15,2%	1,7%	\$3,187	\$0,566	\$0,064
Filipinas	2006	\$7,686	34,6%	40,8%	8,0%	15,5%	1,0%	\$4,936	\$2,362	\$0,085
Sri Lanka	2007	\$1,706	99,4%	0,0%	NC / NI	0,6%	0,0%	\$0,011	NC / NI	NC / NI
Tailandia	2007	\$199,645	82,7%	0,5%	16,0%	0,8%	0,0%	\$28,186	\$0,188	\$5,497
Viet Nam ¹	2006	\$47,156	10,5%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	89,5%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
África subsahariana										
Angola ¹	2006	\$27,724	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Angola ¹	2007	\$47,494	82,14%	0,0%	5,87%	8,21%	3,78%	\$23,687	\$5,270	NC / NI
Benin ¹	2006	\$25,931	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Benin ¹	2007	\$25,992	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI

Indicador 1 del UNGASS. Informes de los países de gastos nacionales e internacionales relacionados con el sida por categorías de servicio y fuentes de financiamiento.

Gastos totales relacionados con el VIH en servicios seleccionados (US\$ millone)

Prevención			Atención y tratamiento		Niños huérfanos y vulnerables	Apoyo al programa			Otros gastos relacionados con el VIH
Programas para profesionales del sexo y sus clientes, para HSH y programa para reducción del daño para UDI	Marketing social de preservativos, provisión de preservativos en el sector público y comercial, y preservativo femenino	Prevención de la transmisión maternoinfantil	Total para atención y tratamiento	Terapia antirretrovírica		Total para el apoyo y la gestión del programa	Gestión, planificación y coordinación del programa	Vigilancia y evaluación ⁴	
\$0,088	\$0,407	\$0,027	\$1,578	\$1,044	NC / NI	\$0,206	NC / NI	\$0,172	\$0,329
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
\$0,298	\$0,029	NC / NI	\$0,850	\$0,820	NC / NI	\$0,243	\$0,163	\$0,080	\$0,197
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$2,673	NC / NI	NC / NI	\$0,518	NC / NI	NC / NI	\$0,713
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$3,644	NC / NI	NC / NI	\$0,708	NC / NI	NC / NI	\$0,334
NC / NI	\$0,792	\$0,243	\$1,479	\$1,351	\$0,095	\$4,306	\$3,469	\$0,508	\$1,182
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,060	\$0,100	\$0,100	NC / NI	\$0,100
NC / NI	NC / NI	\$0,051	\$0,234	\$0,200	\$0,100	\$0,220	\$0,150	\$0,070	\$0,240
\$0,816	\$0,085	\$0,015	\$25,085	\$6,500	\$0,070	\$1,102	\$0,332	\$0,770	\$0,261
\$0,878	NC / NI	\$0,040	\$27,429	\$8,012	\$0,200	\$1,175	\$0,356	\$0,750	\$2,003
\$1,345	NC / NI	NC / NI	\$93,003	\$93,003	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$6,514
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	\$0,015	\$0,021	\$0,016	\$0,009	NC / NI	\$0,117	\$0,074	\$0,032	\$0,053
\$0,626	\$4,381	NC / NI	\$9,603	\$2,708	\$2,019	\$8,826	\$4,494	\$4,230	\$3,784
\$0,143	\$0,260	\$0,022	\$14,074	\$0,092	\$0,046	\$12,161	\$0,941	\$0,361	\$7,116
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$2,944	NC / NI	NC / NI	\$4,509	NC / NI	NC / NI	\$4,843
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
\$2,227	\$1,326	NC / NI	\$1,122	\$0,013	\$0,022	\$0,962	\$0,460	\$0,336	\$0,671
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,046	NC / NI	\$0,149	\$0,412	NC / NI	NC / NI	\$0,873
\$1,331	\$0,360	NC / NI	\$0,550	\$0,394	\$0,011	\$2,109	\$0,782	\$1,135	\$0,985
\$1,531	\$0,003	\$0,062	\$0,123	\$0,008	\$0,023	\$1,814	\$0,832	\$0,883	\$0,791
\$0,001	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$1,695
\$1,029	\$2,529	\$3,542	\$143,334	\$93,625	\$3,006	\$19,449	\$10,991	\$5,896	\$5,669
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	\$1,700	\$17,095	\$6,225	NC / NI	\$1,529	\$1,529	NC / NI	\$5,183
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI

Indicador 1 del UNGASS. Informes de los países de gastos nacionales e internacionales relacionados con el sida por categorías de servicio y fuentes de financiamiento.

Región/país que presenta el informe	Año del gasto	Total informado de gasto público nacional e internacional en millones de dólares estadounidenses	Parte por fuente de financiación					Gastos totales relacionados con el VIH en servicios seleccionados (US\$ millone)		
			Pública nacional (%)	Internacional				Total para prevención	Comunicación para cambio social y comportamental	Asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH
				Bilaterales (%)	Multilaterales		Todas las demás fuentes internacionales o no especificadas (%)			
					Fondo Mundial (%)	ONU y todas las demás multilaterales (%)				
Botswana ¹	2005	\$206,939	79,8%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	20,2%	\$28,346	\$5,576	\$8,062
Botswana	2006	\$143,406	91,3%	8,1%	0,3%	NC / NI	0,4%	\$9,853	\$0,208	\$0,324
Botswana	2007	\$229,458	88,8%	10,5%	0,2%	NC / NI	0,4%	\$15,995	\$0,404	\$0,162
Burkina Faso	2006	\$43,275	22,3%	32,3%	6,7%	29,3%	9,4%	\$12,251	\$0,125	\$1,196
Camerún ¹	2005	\$43,174	10,2%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	89,8%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Camerún ¹	2006	\$33,938	17,7%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	82,3%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Camerún ¹	2007	\$37,826	25,4%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	74,6%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Cabo Verde ¹	2006	\$0,800	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,209	NC / NI	NC / NI
Cabo Verde ¹	2007	\$1,791	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,856	\$0,242	NC / NI
República Centroafricana	2006	\$14,694	4,3%	0,0%	13,4%	69,2%	13,1%	\$2,032	NC / NI	NC / NI
Chad ¹	2006	\$1,733	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Chad ¹	2007	\$5,108	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Comoras ¹	2007	\$0,150	100,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Congo	2007	\$16,151	31,1%	7,6%	29,1%	32,2%	0,0%	\$5,329	NC / NI	\$0,563
Cote d'Ivoire	2005	\$15,723	26,5%	37,6%	2,4%	26,8%	6,6%	\$3,998	\$0,037	\$0,354
Cote d'Ivoire	2006	\$39,130	12,0%	26,9%	0,8%	55,1%	5,2%	\$9,174	\$0,169	\$0,907
República Democrática del Congo ¹	2006	\$41,033	NC / NI	29,7%	25,0%	39,0%	6,3%	\$11,896	\$1,110	\$1,483
Eritrea	2005	\$15,412	4,1%	4,3%	23,4%	68,2%	0,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Eritrea	2006	\$7,183	9,7%	0,0%	66,4%	23,9%	0,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Eritrea	2007	\$7,793	9,7%	0,0%	50,6%	39,7%	0,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Gabón	2007	\$9,691	58,9%	0,3%	25,4%	11,5%	3,9%	\$3,489	NC / NI	NC / NI
Gambia	2007	\$16,931	92,7%	0,0%	7,3%	NC / NI	0,0%	\$16,023	\$0,007	\$0,200
Ghana	2006	\$22,982	21,4%	7,9%	39,6%	2,3%	28,8%	\$7,198	\$3,659	\$0,454
Guinea-Bissau	2006	\$2,859	0,0%	2,9%	24,2%	69,8%	3,1%	\$0,183	NC / NI	NC / NI
Guinea-Bissau	2007	\$2,800	0,0%	7,3%	25,6%	63,7%	3,4%	\$0,490	NC / NI	NC / NI
Lesotho	2006	\$24,436	18,7%	28,5%	14,5%	30,3%	7,9%	\$3,170	\$0,224	\$1,962
Madagascar	2007	\$16,823	18,2%	14,0%	32,9%	34,9%	0,0%	\$10,407	NC / NI	NC / NI
Malawi ¹	2005	\$56,491	32,3%	0,0%	8,1%	NC / NI	59,5%	\$5,758	\$0,675	\$0,618
Malí	2006	\$26,773	32,3%	28,7%	22,2%	3,8%	13,0%	\$11,740	\$1,156	\$0,069
Mauricio	2006	\$1,501	70,7%	0,0%	0,0%	29,3%	0,0%	\$0,506	\$0,008	\$0,045
Mozambique ⁷	2005	\$58,246	19,8%	41,5%	0,0%	30,9%	7,7%	\$26,236	\$3,594	\$2,177
Mozambique ⁷	2006	\$95,505	15,0%	46,8%	0,7%	31,4%	6,2%	\$31,555	\$4,811	\$2,413
Namibia ¹	2005	\$79,122	48,73%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	51,27%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Namibia ¹	2007	\$130,500	50,80%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	49,20%	\$18,639	NC / NI	NC / NI

Indicador 1 del UNGASS. Informes de los países de gastos nacionales e internacionales relacionados con el sida por categorías de servicio y fuentes de financiamiento.

Gastos totales relacionados con el VIH en servicios seleccionados (US\$ millone)

Prevención			Atención y tratamiento		Niños huérfanos y vulnerables	Apoyo al programa			Otros gastos relacionados con el VIH
Programas para profesionales del sexo y sus clientes, para HSH y programa para reducción del daño para UDI	Marketing social de preservativos, provisión de preservativos en el sector público y comercial, y preservativo femenino	Prevención de la transmisión maternoinfantil	Total para atención y tratamiento	Terapia antirretrovírica		Total para el apoyo y la gestión del programa	Gestión, planificación y coordinación del programa	Vigilancia y evaluación ⁴	
NC / NI	\$4,538	\$6,745	\$102,796	\$38,741	\$39,698	\$27,991	\$24,542	\$2,237	\$8,108
NC / NI	\$0,052	\$4,305	\$90,978	\$33,150	\$29,367	\$13,007	\$1,695	\$0,457	\$0,202
NC / NI	\$0,017	\$8,704	\$140,364	\$44,482	\$51,442	\$20,762	\$2,498	\$1,321	\$0,895
\$0,207	\$2,692	\$2,058	\$14,323	\$7,916	\$1,931	\$9,345	\$4,726	\$4,619	\$5,425
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,590	\$0,465	\$0,125	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,254	NC / NI	\$0,016	\$0,665	\$0,588	\$0,077	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$5,596	NC / NI	\$4,858	\$1,217	NC / NI	NC / NI	\$0,990
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
\$0,009	\$1,456	\$0,326	\$5,607	\$4,967	\$0,626	\$4,524	\$3,733	\$0,187	\$0,066
\$0,005	\$2,623	\$0,591	\$5,968	NC / NI	\$2,141	\$2,323	\$1,895	\$0,428	\$1,291
\$0,004	\$3,462	\$2,191	\$22,502	\$1,873	\$2,815	\$3,027	\$2,026	\$0,715	\$1,611
\$0,018	\$1,619	\$0,805	\$9,026	\$4,018	\$4,271	\$13,065	\$9,142	\$2,019	\$2,775
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
\$0,004	\$0,195	NC / NI	\$2,544	\$1,828	\$0,708	\$2,468	\$0,423	\$0,523	\$0,481
NC / NI	\$0,116	\$0,191	\$0,062	NC / NI	\$0,077	\$0,145	\$0,006	\$0,116	\$0,625
\$0,017	\$0,768	NC / NI	\$15,784	\$4,297	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,246	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$2,430
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$1,160	NC / NI	\$0,006	NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$1,144
NC / NI	\$0,225	\$0,291	\$4,834	\$1,192	\$3,967	\$5,180	\$3,143	\$0,443	\$7,286
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$0,323	NC / NI	\$0,199	\$4,023	NC / NI	NC / NI	\$1,872
NC / NI	\$0,125	\$0,021	\$27,490	NC / NI	\$1,009	\$5,523	\$2,614	\$0,821	\$16,712
\$0,340	\$0,170	\$0,222	\$3,022	\$1,331	\$0,820	\$6,327	\$2,627	\$0,515	\$4,864
\$0,166	NC / NI	\$0,023	\$0,304	\$0,304	\$0,456	\$0,198	\$0,184	\$0,014	\$0,037
\$0,305	\$2,488	\$2,558	\$12,939	\$6,718	\$4,101	\$10,509	\$8,799	\$1,491	\$4,460
\$0,140	\$2,627	\$4,935	\$35,489	\$19,422	\$7,273	\$14,573	\$10,561	\$2,145	\$6,616
NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
NC / NI	NC / NI	NC / NI	\$74,574	NC / NI	NC / NI	\$14,871	NC / NI	NC / NI	\$22,416

Indicador 1 del UNGASS. Informes de los países de gastos nacionales e internacionales relacionados con el sida por categorías de servicio y fuentes de financiamiento.

Región/país que presenta el informe	Año del gasto	Total informado de gasto público nacional e internacional en millones de dólares estadounidenses	Parte por fuente de financiación					Gastos totales relacionados con el VIH en servicios seleccionados (US\$ millone)		
			Pública nacional (%)	Internacional				Total para prevención	Comunicación para cambio social y comportamental	Asesoramiento y pruebas voluntarias del VIH
				Bilaterales (%)	Multilaterales		Todas las demás fuentes internacionales o no especificadas (%)			
					Fondo Mundial (%)	ONU y todas las demás multilaterales (%)				
Níger	2006	\$21,632	52,4%	6,6%	14,9%	26,0%	0,0%	\$21,632	\$19,982	\$0,002
Nigeria ³	2006	\$19,141	56,2%	0,3%	28,9%	14,6%	0,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Nigeria ³	2007	\$19,141	56,2%	0,3%	28,9%	14,6%	0,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Rwanda ⁵	2006	\$84,742	5,1%	0,0%	15,3%	17,3%	62,3%	\$20,651	\$4,002	\$4,656
Senegal ¹	2006	\$11,935	48,5%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	51,5%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Senegal ¹	2007	\$17,815	47,8%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	52,2%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Seychelles	2007	\$0,146	87,1%	0,0%	0,0%	12,9%	0,0%	\$0,146	NC / NI	NC / NI
Sierra Leona ¹	2006	\$7,760	4,2%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	95,8%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Sierra Leona ¹	2007	\$5,619	4,2%	NC / NI	NC / NI	NC / NI	95,8%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Somalia ¹	2006	\$12,203	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Somalia ¹	2007	\$9,812	NC / NI	0,0%	59,9%	36,2%	3,9%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Sudáfrica ⁶	2006	\$575,680	74,0%	7,1%	14,0%	3,4%	1,5%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Sudáfrica ⁶	2007	\$621,623	77,3%	4,0%	13,0%	3,2%	2,6%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Swazilandia	2006	\$49,113	39,8%	5,8%	31,0%	9,7%	13,6%	\$8,301	\$2,900	\$2,243
Tanzania	2005	\$266,371	40,6%	7,1%	14,2%	3,1%	35,0%	\$82,399	\$1,295	\$4,961
Tanzania ¹	2006	\$323,501	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Togo	2006	\$8,435	11,9%	3,9%	65,2%	10,5%	8,5%	\$6,320	\$1,245	\$1,584
Togo	2007	\$11,793	13,3%	4,4%	53,2%	11,8%	17,4%	\$8,632	\$1,790	\$1,688
Uganda	2005	\$202,419	6,1%	77,3%	4,4%	4,8%	7,4%	\$37,841	\$12,707	\$12,006
Zambia	2006	\$189,930	15,3%	60,9%	12,9%	7,0%	3,9%	\$47,062	\$5,118	\$8,254
Zimbabwe ¹	2005	\$89,432	16,4%	71,9%	0,0%	11,7%	0,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Zimbabwe ¹	2006	\$129,517	49,0%	32,4%	0,0%	18,6%	0,0%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Europa occidental y central										
Albania	2005	\$2,377	46,7%	0,0%	0,0%	0,0%	53,3%	NC / NI	NC / NI	NC / NI
Polonia	2007	\$42,786	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	\$4,400	\$0,271	\$0,154
Suiza	2006	\$18,506	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	\$5,747	\$3,448	NC / NI
Ex República Yugoslava de Macedonia	2005	\$3,627	46,4%	0,0%	37,1%	13,24%	3,30%	\$2,939	\$0,173	\$0,281

Indicador 3 del UNGASS. Porcentaje de unidades de donación de sangre analizadas sistemáticamente para la detección del VIH de una manera con garantía de la calidad

País (o territorio)	Valor indicador ¹
Afganistán	39
Argelia	100
Antigua y Barbuda	33
Argentina	100
Armenia	100
Australia	100
Austria	100 ²
Bahamas	100
Bahrein	100 ²
Barbados	100
Belarús	100
Bélgica	100
Belice	100
Benin	99
Bhután	50 ²
Bolivia	88
Bosnia y Herzegovina	0
Botswana	100
Bulgaria	100
Burkina Faso	66
Burundi	100
Camboya	97
Canadá	100
Cabo Verde	61
República Centrafricana	76
Chad	100
China	100
Colombia	100
Comoras	100
Congo, República del	100
Costa Rica	100
Côte d'Ivoire	100
Croacia	86
Cuba	100
Chipre	100
República Checa	100 ²
Rep. Democrática del Congo	47
Dominica	100

Indicador 3 del UNGASS. Porcentaje de unidades de donación de sangre analizadas sistemáticamente para la detección del VIH de una manera con garantía de la calidad

País (o territorio)	Valor indicador ¹
República Dominicana	100
Ecuador	100
El Salvador	100
Eritrea	100
Estonia	100
Etiopía	100
Fiji	100
Finlandia	100
Gabón	100
Georgia	0
Alemania	100
Ghana	100
Grenada	91
Guatemala	100
Guinea	53
Guinea-Bissau	100
Guyana	100
Haití	100
Honduras	46
Hungría	100
India	100
Irán, República Islámica del	100
Irlanda	100
Israel	100
Jamaica	100
Japón	100
Jordania	100
Kazajstán	95
Kenya	100
Kuwait	100 ²
Kirguistán	88
República Democrática Popular Lao	100
Letonia	100
Libano	100
Lesotho	100
Lituania	100
Luxemburgo	100 ²
Madagascar	99

Indicador 3 del UNGASS. Porcentaje de unidades de donación de sangre analizadas sistemáticamente para la detección del VIH de una manera con garantía de la calidad

País (o territorio)	Valor indicador ¹
Malawi	99
Malasia	100
Maldivas	0 ²
Malí	94
Malta	100 ²
Islas Marshall	100
Mauritania	100
Mauricio	100
México	100
Moldova	74
Mongolia	72
Montenegro	100
Marruecos	100
Mozambique	36
Namibia	100 ²
Nepal	100
Países Bajos	100 ²
Nueva Zelandia	100
Nicaragua	90
Níger	100
Nigeria	100
Noruega	100 ²
Pakistán	87
Palau	100
Panamá	100
Papua Nueva Guinea	100
Paraguay	95
Perú	99
Polonia	100 ²
República de Corea	100 ²
Rumania	100
Rwanda	100
Saint Kitts y Nevis	100
Santa Lucía	100
San Vicente y las Granadinas	100
Samoa	100 ²
Santo Tomé y Príncipe	0
Senegal	78

Indicador 3 del UNGASS. Porcentaje de unidades de donación de sangre analizadas sistemáticamente para la detección del VIH de una manera con garantía de la calidad

País (o territorio)	Valor indicador ¹
Serbia	100
Seychelles	100
Sierra Leona	100
Singapur	100
Eslovenia	100
Sudáfrica	100
España	100
Sri Lanka	42
Suriname	100
Swazilandia	100
Suecia	100
Suiza	100
Tayikistán	97
Tailandia	99
Timor-Leste	58 ²
Togo	85
Trinidad y Tabago	100
Túnez	100
Turquía	100
Uganda	100
Ucrania	0
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	100
República Unida de Tanzania	100
Uruguay	100
Zambia	100
Zimbabwe	100

¹ Fecha de informe 2007, pero la recopilación de datos puede variar de 2005 a 2007

² Datos provistos por el Departamento de Seguridad Transfusional de la OMS

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)						
País (o territorio)	2004		2005		2006	
	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)
Albania	50	45 ⁶	...
Argelia	424	13 [6-24]	588 ⁶	14 [7-26]
Andorra	24 ⁶	...
Angola	3000	9 [2-16]	3000	8 [3-13]	6514 ⁵	16 [6-23]
Antigua y Barbuda	0	...	40	60 ¹³	114	...
Argentina	29500	70 [52->95]	30127	65 [49-90]	35211	71 [55->95]
Armenia	...	0 ¹²	29	6 [4-8]	47	8 [5-12]
Azerbaiján	...	0 ¹²	7	1 ¹³
Bahamas	1252	48 [34-67]
Bangladesh	5	<1 [<1-1]	5	<1 [<1-<1]	59 ³	3 [2-5]
Barbados	333	39 [29-52]	582	65 [48-86]	623	67 [50-90]
Belarús	33	<1 [<1-1]	120	3 [2-4]	638	15 [11-22]
Bélgica	...	94 ¹²	6450 ⁶	67 [39->95]
Belize	178	20 [12-35]	180	19 [12-33]	435 ³	42 [27-68]
Benin	2000	13 [11-17]	4673	28 [23-36]	7634 ³	42 [35-53]
Bhután	5	... ²	5	... ²	19 ⁶	... ²
Bolivia	130	7 [5-10]	300	16 [11-22]	382	18 [13-25]
Bosnia y Herzegovina	13	10 ¹²	29	...	19 ⁵	...
Botswana	37000	44 [37-54]	59946	64 [55-76]	79490	76 [66-88]
Brasil	154000	74 [64-88]	174000	80 [69-95]	174270 ⁵	78 [68-94]
Bulgaria	90	45	187	...	196	...
Burkina Faso	3000	7 [6-10]	8214	19 [15-25]	14079	31 [25-39]
Burundi	3000	6 [5-8]	6416	13 [10-18]	8048	17 [13-23]
Camboya	5000	14 [11-18]	12396	34 [28-44]	20131	54 [45-66]
Camerún	14000	9 [7-11]	23820	14 [11-18]	28403	16 [13-21]
Canadá	21000 ⁶	...
Cabo Verde	215	...	223	...
República Centroafricana	1000	3 [2-3]	1647	4 [3-5]	2782	6 [5-8]
Chad	300	1 [<1-1]	5275	11 [6-18]	5500	11 [7-16]
Chile	9000	>95 [74->95]	6964	67 [51-89]	7782	68 [52-90]
China	9000	7 [5-11]	19282	13 [9-20]	31140 ⁶	19 [12-29]
Colombia	12000	28 [19-40]	13000	27 [19-39]	17540	34 [24-48]
Comoras	200	... ²	5	>95 ¹³
Congo, República del	464	2 [1-2]	2967	11 [9-14]	3186	12 [10-15]
Costa Rica	2000	>95 [83->95]	2717	>95 [88->95]	2866	>95 [75->95]
Côte d'Ivoire	5000	3 [2-4]	18533	10 [8-13]	36348	19 [16-25]
Croacia	204	>95 ¹²	247	...	291 ⁵	...
Cuba	2000	>95 [>95->95]	2079	>95 [>95->95]	1711	>95 [76->95]

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)									
2007									
Personas que reciben tratamiento				Cantidad de personas que reciben tratamiento ART informada por el país	Mes y año del valor informado por el país	Cantidad de personas que reciben tratamiento ART al final de 2007 ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Necesidad total estimada con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ¹⁸	Total de necesidad informada por el país
Varón	Mujer	Ambos sexos <15 años	Ambos sexos >15 años						
...	...	12	62	74	Dic 07	74
...	...	45	884	929	Oct 07	993 ³	20 [10-36]	4900 [2700-10000]	...
...
...	...	363 ⁸	10877 ⁸	11540	Dic 07	11540	25 [11-35]	47000 [33000-110000]	45287
14	16	30	Sep 07	148 ³	161
22557	15685	3654	34588	38242	Dic 07	38242	73 [57->95]	53000 [38000-67000]	38242
52	26	4	74	78	Dic 07	78	12 [8-17]	660 [<500-1000]	860
...	...	0	81	81	Dic 07	81	14 [6-24]	580 [<500-1300]	...
577	667	98	1146	1244	Sep 07	1244	43 [31-64]	2900 [1900-4100]	2083
...	178	Dic 07	178	7 [4-12]	2400 [1500-4000]	1125
358 ⁷	302 ⁷	17 ¹⁵	...	660	Jun 07	660 ⁷	73 [56->95]	980 [730-1300]	772
655	229	69	815	884	Dic 07	884	20 [14-29]	4300 [3000-6200]	1210
...	10000 [6100-18000]	...
263	295	65	493	558	Dic 07	558	49 [32-76]	1100 [740-1700]	4131
...	...	542	9223	9765	Dic 07	9765	49 [41-60]	20000 [16000-24000]	21706
10	8	0	18	18	Dic 07	18	... ²	<100 [<100-<100]	...
345	151	22	474	496	Dic 07	496	22 [16-30]	2300 [1700-3100]	1055
22	8	1	29	30	Dic 07	30	30
32623 ⁸	50795 ⁸	9496 ⁸	73922 ⁸	92932	Dic 07	92932	79 [69->95]	120000 [100000-130000]	110000
109057	71943	6815	174185	181000	Dic 07	181000	80 [69->95]	230000 [190000-260000]	...
150	71	3	218	221	Dic 07	221
5084	10804	629 ¹⁴	15259	15888	Sep 07	16938 ³	35 [29-43]	48000 [39000-58000]	47942
3486	7408	1198	9696	10894	Dic 07	10894	23 [18-31]	47000 [35000-59000]	23532
13118	13546	2541	24123	26664	Dic 07	26664	67 [57-80]	40000 [34000-47000]	29200
16036	29781	1694	44123	45817	Dic 07	45817	25 [21-32]	180000 [140000-220000]	86453
...
125	166	23	268	291	Dic 07	291	1028
3215	4822	380 ¹⁴	5876 ¹⁰	8037	Sep 07	9591 ³	21 [18-27]	45000 [36000-54000]	36920
2738	4662	148	7252	7400	Dic 07	7400	13 [9-18]	55000 [41000-79000]	21000
8495	1728	10223	Dic 07	10223	82 [64->95]	12000 [9100-16000]	9023
19245 ^{8,10}	15148 ^{8,10}	766 ⁸	33846 ⁸	35112	Dic 07	35112
...	...	3 ¹⁵	54000 [39000-78000]	...
4	3	1	6	7	Dic 07	7	... ²	<100 [<100-<100]	8
1886	2830	462	4254	4716	Sep 07	4956 ³	17 [14-21]	29000 [23000-35000]	11895
...	2952	Dic 07	2952 ⁶	>95 [64->95]	2800 [1600-4600]	3060
12349 ⁸	22525 ⁸	1785 ⁸	33089 ⁸	46007	Sep 07	51812 ³	28 [23-35]	190000 [150000-230000]	165448
...	310	Jun 07	322 ³
...	...	17	3089	3106	Dic 07	3106	>95 [>95->95]	1400 [760-2500]	1887

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)

País (o territorio)	2004		2005		2006	
	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)
Chipre
República Checa	270	34 [18-57]	322	37 [19-62]	570 ⁶	60 [32->95]
Rep. Democrática del Congo	4000	4 [3-5]	7721	7 [6-9]	17561	15 [13-19]
Djibouti	200	6 [4-9]	350	9 [6-13]	598 ³	14 [11-20]
Dominica	5	...	21	37 ¹³	37	...
República Dominicana	1000	5 [4-7]	2582	12 [10-17]	5001	24 [19-31]
Ecuador	1000	16 [9-28]	1567	23 [14-41]	1745 ³	24 [14-43]
Egipto	58	4 [3-5]	200	11 [8-16]	205 ⁶	10 [7-14]
El Salvador	2000	23 [2-76]	2873	31 [3-65]	4712	46 [6-75]
Guinea Ecuatorial	5	<1 [<1-<1]	5	<1 [<1-<1]	414 ³	14 [10-19]
Eritrea	50	<1 [<1-<1]	563	6 [4-10]	1175	12 [8-19]
Estonia	76	12 [4-33]	201	19 [7-48]	495	33 [15-76]
Etiopía	11000	4 [3-5]	20477	7 [6-9]	53720	18 [15-23]
Fiji
Finlandia	...	95 ¹²	450 ⁶	54 ¹³
Francia	64 ¹³
Gabón	2000	20 [13-31]	2000	17 [12-26]	5278	39 [28-56]
Gambia	150	9 [5-19]	150	8 [5-16]	400 ³	19 [11-38]
Georgia	83	8 ¹²	140	>95 ¹³	267	69 ¹³
Alemania	...	95 ¹²	27000 ⁶	...
Ghana	2000	3 [2-3]	4328	5 [4-7]	9882 ³	12 [9-15]
Grecia	3426	...
Granada	33	...
Guatemala	4000	24 [17-37]	5632	32 [22-46]	6030	31 [22-44]
Guinea	1000	7 [5-11]	2101	13 [9-19]	4699	26 [19-36]
Guinea-Bissau	62	2 [1-2]	349	9 [6-13]
Guyana	500	12 [8-17]	1200	29 [19-41]	1569	37 [26-51]
Haití	3000	10 [8-13]	6896	22 [17-28]	8796	26 [21-33]
Honduras	3000	27 [11-53]	4305	39 [19-70]	4674	41 [22-66]
Hungría	300	20 [11-33]	402	24 [14-39]	412	22 [13-37]
India	28000	3 [2-7]	51888	6 [4-11]	90597	10 [7-16]
Indonesia	3000	19 [8->95]	3520	14 [7-69]	5100	15 [7-41]
Irán, República Islámica del	420	3 [2-4]	525 ³	3 [2-5]
Iraq	75	...	0 ⁶	...
Israel	2431	61 ¹³
Jamaica	500	7 [5-11]	1456	20 [14-29]	2633	33 [25-48]
Japón	48	...
Jordania	40	21 ¹²	45	...	45 ⁶	...

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)									
2007									
Personas que reciben tratamiento				Cantidad de personas que reciben tratamiento ART informada por el país	Mes y año del valor informado por el país	Cantidad de personas que reciben tratamiento ART al final de 2007 ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Necesidad total estimada con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ¹⁸	Total de necesidad informada por el país
Varón	Mujer	Ambos sexos <15 años	Ambos sexos >15 años						
117	34	1	150	151	Dic 07	151	154
...	570	Jun 07	570 ⁶	56 [30->95]	1000 [590-1900]	...
...	...	1632 ¹⁵	...	14678	Jun 07	28925 ³	24 [20-29]	[99000-150000]	347490
343	362	25	680	705	Dic 07	705 ⁶	16 [12-21]	4500 [3300-5900]	...
9 ⁷	28 ⁷	2	37	39	Dic 07	39	53
3661	3803	589	7610	8199	Dic 07	8199	38 [31-48]	22000 [17000-27000]	21780
...	...	252	2962	3214	Dic 07	3214	42 [25-71]	7600 [4500-13000]	7632
...	...	18 ¹⁵	...	209	Dic 07	209 ⁶	9 [7-13]	2200 [1600-3100]	...
2136 ¹⁰	2315 ¹⁰	693 ¹⁰	3758 ¹⁰	5773	Dic 07	5773	51 [9-74]	11000 [7800-63000]	4840
...	859	Sep 07	985 ^{3,6}	31 [23-43]	3100 [2300-4300]	...
...	...	65	1236	1301	Dic 07	1301	13 [9-20]	10000 [6700-15000]	12940
...	772	Dic 07	772	38 [19-81]	2000 [960-4100]	...
40138	50074	4534	85678	90212	Dic 07	90212	29 [25-36]	310000 [250000-370000]	258284
...	...	1	27	28	Dic 07	28 ⁶	... ²	<200 [<100-<200]	...
...	1000 [600-1800]	...
...	88000 [51000-140000]	...
2886	3487	73	6300	6373	Dic 07	6373	42 [30-60]	15000 [11000-21000]	14598
...	423	Sep 07	431 ³	18 [12-37]	2300 [1200-3700]	4787
239	95	15	319	334	Nov 07	343 ³	... ²	<500 [<200-<500]	476
...	35000 [20000-64000]	...
...	...	576	12781	13357	Dic 07	13357	15 (13-19)	87000 (69000-110000)	74060
...	6400 [3500-11000]	...
24 ⁷	21 ⁷	2	45	47	Dic 07	47	129
...	...	597	7215	7812	Dic 07	7812	37 [28-51]	21000 [15000-28000]	11113
2296	2932	307	4921	5228	Sep 07	5660 ⁵	27 [21-37]	21000 [15000-27000]	23250
321	569	41	849	890	Dic 07	890	20 [13-30]	4400 [2900-6600]	3171
894	1071	162	1803	1965	Dic 07	1965	45 [33-61]	4300 [3200-6000]	3240
6240	8274	439	...	14514	Dic 07	14514	41 [33-51]	36000 [29000-43000]	27738
...	...	751	4829	5580	Dic 07	5580	47 [29-71]	12000 [7900-19000]	9916
381	71	7	445	452	Dic 07	452	22 [13-38]	2000 [1200-3600]	...
73061 ⁸	40888 ⁸	8887 ⁸	114133 ⁸	158020	Dic 07	158020	... ⁹
...	...	19 ¹⁵	6600 ⁶	15 [8-28]	43000 [23000-84000]	...
697	132	21	808	829	Sep 07	945 ³	5 [4-7]	19000 [13000-26000]	8730
0	0	0	0	0	Dic 07	0
...	2400 [1200-6100]	...
...	...	336 ¹⁵	...	3637	Dic 07	3637	43 [32-60]	8500 [6000-11000]	6000
...	6300 [4600-7200]	...
42	11	4	49	53	Dic 07	53

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)

País (o territorio)	2004		2005		2006	
	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)
Kazajstán	7	<1 [$<1-5$]	240	23 [12-62]	326	23 [13-39]
Kenya	29000	6 [5-8]	65773	14 [12-19]	125026	27 [22-36]
Kiribati
Kirguistán	46	... ²	47	23 ¹³
República Democrática Popular Lao	104	... ²	104	... ²	479	94 [48->95]
Letonia	202	25 [9-38]	235	19 [9-29]	301 ⁶	18 [10-27]
Libano	200	28 [11-54]	213	25 [10-46]
Lesotho	3000	4 [3-5]	8400	11 [9-14]	17667 ³	22 [18-29]
Liberia	397	5 [2-8]	796 ³	10 [4-14]
Jamahiriyá Árabe Libia	100	...	450
Lituania	37	55 ¹²	55	... ²	75 ⁵	79 ¹³
Luxemburgo ²	312 ⁶	... ²
Madagascar	6	<1 [$<1-1$]	6	<1 [$<1-1$]	92 ³	3 [2-5]
Malawi	13183	5 [4-7]	29087	11 [9-14]	59980	21 [18-27]
Malasia	2700	23 [16-33]	2700	19 [13-26]
Maldivas ²	1 ⁶	... ²
Malí	808	4 [3-5]	7038	28 [22-38]	11508	42 [33-54]
Malta
Islas Marshall
Mauritania	39	2 [1-4]	256	8 [5-15]
Mauricio	120	...	120	18 [8-40]	243	24 [13-42]
México	29000	45 [31-67]	30624	45 [31-64]	39295	54 [38-77]
Micronesia, Estados Federados de	0 ¹³
Moldova	120	8 ¹²	222	... ²	262	48 ¹³
Mongolia	2	13 ¹³
Montenegro	26	...
Marruecos	465	13 [9-19]	880	22 [14-31]	1370	29 [20-42]
Mozambique	7000	3 [2-3]	19854	7 [5-9]	40891 ³	12 [10-16]
Myanmar	2000	3 [2-4]	3500	5 [3-7]	5295 ³	7 [5-10]
Namibia	9000	22 [17-28]	29200	62 [50-80]	33593	64 [52-81]
Nauru ²
Nepal	75	<1 [$<1-1$]	75	<1 [$<1-1$]	541 ³	3 [2-4]
Países Bajos	...	>95 ¹²
Nicaragua	33	3 [1-4]	163	13 [4-19]	387	26 [9-38]
Níger	609	5 [3-6]	1168	8 [6-11]
Nigeria	13000	2 [$<1-3$]	41224	6 [3-9]	95008	13 [8-19]
Omán	100	...	225
Pakistán	100	<1 [$<1-1$]	132	<1 [$<1-1$]	167 ³	<1 [$<1-1$]

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)									
2007									
Personas que reciben tratamiento				Cantidad de personas que reciben tratamiento ART informada por el país	Mes y año del valor informado por el país	Cantidad de personas que reciben tratamiento ART al final de 2007 ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Necesidad total estimada con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ¹⁸	Total de necesidad informada por el país
Varón	Mujer	Ambos sexos <15 años	Ambos sexos >15 años						
283	159	71	371	442	Dic 07	442	23 [14-36]	1900 [1200-3200]	1078
60200 ⁸	111800 ⁸	15090 ⁸	156910 ⁸	177000	Dic 07	177000	38 [31-48]	[370000-570000]	407000
...	5	Dic 07	5
67	20	26	61	87	Dic 07	87	14 [8-26]	610 [<500-1100]	345
427	273	36	664	700	Dic 07	700	>95 [59->95]	690 [<200-1200]	1182
...	323	May 07	323	15 [9-22]	2200 [1500-3400]	...
192	54	9	237	246	Dic 07	246	26 [11-45]	940 [550-2300]	432
7582	14128	1553	20157	21710	Dic 07	21710	26 [21-33]	85000 [66000-100000]	84791
...	...	92 ¹⁵	...	1414	Dic 07	1414 ⁶	17 [9-23]	8500 [6100-17000]	...
...	1000	Dic 07	1000 ⁶
81	17	1	97	98	Dic 07	98	18 [8-31]	550 [<500-1200]	131
... ²	<500 [<500-770]	...
...	138	Dic 07	138	4 [3-7]	3200 [2000-5400]	1206
51204 ^{8,11}	79284 ^{8,11}	10238 ^{8,11,14}	120250 ^{8,11}	100649	Dic 07	100649	35 [29-42]	290000 [240000-340000]	252720
...	...	500 ¹⁵	...	6590	Oct 07	6762 ³	35 [24-49]	20000 [14000-28000]	13080
...	1 ⁶	... ²	<100 [<100-<100]	...
4369	7803	579	11593	12172	Nov 07	12398 ³	41 [32-51]	30000 [24000-38000]	31198
...	65	Jun 07	65 ⁶	... ²	<500 [<500-640]	...
...	1	Dic 07	1
469	370	23	816	839	Dic 07	839	23 [13-40]	3600 [2100-6300]	1627
...	321	Dic 07	321	22 [14-32]	1500 [1000-2400]	1200
...	76000 [54000-110000]	...
...	1	Dic 07	1
261	203	19	445	464	Dic 07	464	58 [43-86]	800 [540-1100]	856
3	0	0	3	3	Dic 07	3	... ²	<100 [<100-<100]	26
...	...	1 ¹⁵
867	781	58	1590	1648	Dic 07	1648	31 [21-44]	5300 [3700-7900]	2230
32990	52832	6320	79502	85822	Nov 07	89592 ³	24 [20-31]	370000 [290000-460000]	294986
6634	4466	11100	Dic 07	11100	15 [11-20]	76000 [55000-100000]	...
13783	25939	5283	34439	52316	Dic 07	52316	88 [73->95]	59000 [48000-72000]	56239
...	0 ⁶
762	478	51	1189	1240	Sep 07	1432 ³	7 [5-11]	20000 [13000-30000]	19200
...	7919	Abr 07	7919 ⁶	61 [36->95]	13000 [7100-22000]	...
336	186	45	477	522	Dic 07	522	30 [11-43]	1700 [1200-4700]	1233
723	751	62 ¹⁴	1412	1474	Oct 07	1536 ³	10 [7-13]	16000 [12000-22000]	8929
40643 ^{8,10}	65429 ^{8,10}	15345 ^{8,10}	61381 ^{8,10}	145392	Sep 07	197000 ³	26 [17-36]	750000 [550000-1100000]	...
200	60	260	Dic 07	260 ⁶
415	135	21	529	550	Dic 07	550	3 [2-4]	20000 [13000-34000]	7400

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)						
País (o territorio)	2004		2005		2006	
	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)
Palau	33 ¹³	2	...
Panamá	2000	33 [25-44]	2765	43 [33-57]	2835	42 [32-54]
Papua Nueva Guinea	171	7 [6-9]	320	10 [9-12]	1098	26 [22-31]
Paraguay	300	10 [5-18]	640	18 [10-32]	1026 ³	25 [13-43]
Perú	2000	12 [9-16]	6410	35 [26-47]	8424	42 [31-54]
Filipinas	71	4 ¹²	170	24 [17-35]
Polonia	2000	35 [20-59]	2707	39 [22-66]	3072	38 [21-64]
Rumania	6000	82 [70->95]	6116	77 [66->95]	6790	81 [69->95]
Federación de Rusia	3000	4 [2-7]	5000	5 [2-7]	14681	10 [6-15]
Rwanda	7000	10 [9-13]	19289	29 [24-36]	34636	52 [45-63]
Saint Kitts y Nevis	24	...	32	...	39	...
Santa Lucía	20	...	50	81 ¹³	50	...
San Vicente y las Granadinas	32	...	64	>95 ¹³	80 ³	...
Samoa
Santo Tomé y Príncipe	17	...	51	...
Senegal	1600	26 [18-38]	4200	54 [40-75]	5500	57 [44-75]
Serbia	317	11 [6-19]	580	19 [9-32]	608	18 [9-31]
Seychelles	43	...	43	...	82	...
Sierra Leona	210	2 [1-4]	1416	12 [7-19]
Eslovaquia	65	95 ¹²	65	...	96 ⁶	...
Eslovenia	147	...
Islas Salomón
Somalia	35	<1 [<1-1]	111	2 [1-4]
Sudáfrica	55000	4 [3-6]	206718	15 [12-20]	324754 ³	21 [17-28]
España	...	92 ¹²	77500 ⁶	...
Sri Lanka	25	4 [3-6]	25	4 [3-5]	69	10 [7-14]
Sudán	400	<1 [<1-<1]	400	<1 [<1-<1]	... ¹⁷	...
Suriname	220	25 [12-63]	391	36 [20-70]	460	35 [22-60]
Swazilandia	6000	14 [12-17]	13006	27 [23-34]	18493 ³	35 [30-42]
Suecia	...	95 ¹²	2800	74 ¹³
República Árabe Siria	468	...	60
Tayikistán	...	0 ¹²	5	<1 [<1-7]	37	4 [2-10]
Tailandia	50000	21 [15-30]	81158	34 [26-47]	112196 ³	46 [35-62]
Ex República Yugoslava de Macedonia	2	20 ¹²	7	...	11	...
Togo	2000	6 [4-8]	6545	18 [14-23]	6993	18 [14-23]
Trinidad y Tabago	1000	28 [19-43]	1700	46 [30-70]	2113	53 [36-78]
Túnez	229	31 [21-45]	298	33 [23-46]
Turquía	250	...	344	...	685	...

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)									
2007									
Personas que reciben tratamiento				Cantidad de personas que reciben tratamiento ART informada por el país	Mes y año del valor informado por el país	Cantidad de personas que reciben tratamiento ART al final de 2007 ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Necesidad total estimada con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ¹⁸	Total de necesidad informada por el país
Varón	Mujer	Ambos sexos <15 años	Ambos sexos >15 años						
1	2	0	3	3	Dic 07	3	3
...	...	167	...	3994	Dic 07	3994	56 [43-71]	7200 [5600-9300]	6500
1037	1213	185	2065	2250	Dic 07	2250	38 [33-45]	5900 [5000-6800]	6348
678 ⁷	271 ⁷	104	949	1053	Nov 07	1056 ³	22 [12-37]	4800 [2900-8800]	3066
...	...	322 ¹⁰	7721 ¹⁰	10860	Dic 07	10860 ⁶	48 [36-62]	23000 [17000-30000]	...
134	202	4	332	336	Dic 07	336	31 [22-45]	1100 [740-1500]	600
2 392	990	118	3264	3382	Dic 07	3382 ⁶	36 [20-62]	9300 [5500-17000]	4390
3231 ¹⁰	3187 ¹⁰	196	6304	6500	Dic 07	6500	73 [62->95]	8900 [5400-10000]	6418
...	31094	Dic 07	31094	16 [10-25]	190000 [120000-300000]	33365
17980 ⁸	30089 ⁸	4350 ⁸	43719 ⁸	48069	Dic 07	48569	71 [62-84]	68000 [58000-78000]	...
...	53 ⁶
40	32	2	70	72	Sep 07	78 ³	384
...	104 ⁶
...	6	Dic 07	6 ⁶
27	47	2	72	74	Dic 07	74	300
2220	4479	384	6315	6699	Dic 07	6699	56 [44-70]	12000 [9600-15000]	10465
...	628	May 07	628	17 (8-30)	3700 [2100-7700]	...
...	94
...	2649	Dic 07	2649	20 (13-30)	13000 [9000-20000]	596
79 ¹⁰	17 ¹⁰	0	98	98	Jun 07	98
...	157	Jul 07	157
...	3	Dic 07	3 ⁶
86	125	5	206	211	Dic 07	211	3 [2-6]	6300 [3500-11000]	5284
73882 ^{8,16}	130401 ^{8,16}	32060 ^{8,10}	339671 ^{8,10}	428951	Sep 07	458951 ³	28 [22-36]	1700000 [1300000-2100000]	889000
...	100000 [54000-170000]	...
...	107	Dic 07	107	14 [10-20]	780 [540-1100]	776
...	Dic 07	... ¹⁷	1 [1-2]	87000 [58000-120000]	...
...	...	58 ¹⁰	650 ¹⁰	729	Dic 07	729	46 [30-74]	1600 [980-2400]	...
7702	12908	2123	22412	24535	Dic 07	24535	42 [36-50]	59000 [49000-68000]	58249
...	4500 [2500-8100]	784
57	18	4	71	75	Dic 07	75 ⁶
57	29	4	82	86	Dic 07	86	6 [4-11]	1300 [750-2400]	79
...	...	6687 ⁸	126852 ⁸	143539	Sep 07	152974 ³	61 [47-81]	250000 [190000-320000]	252387
4	11	1	14	15	Dic 07	15
2793	5187	559	7421	7980	Dic 07	7980	19 [15-24]	41000 [33000-52000]	26232
...	2592	Dic 07	2592	58 [41-82]	4500 [3100-6300]	...
...	1000 [760-1500]	...
...	...	9 ¹⁵

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)

País (o territorio)	2004		2005		2006	
	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ¹	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Todas las personas que reciben terapia ART ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)
Uganda	44000	12 [9-15]	74869	21 [16-26]	96294 ³	27 [22-33]
Ucrania	1000	2 [2-3]	3450	5 [4-7]	4777	6 [5-8]
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	...	92 ¹²	36000 ⁵	>95 ¹³
República Unida de Tanzania	3000	<1 [<1-<1]	21543	5 [4-6]	60342	14 [12-18]
Estados Unidos de América	70 ¹³
Uruguay	900	48 [8->95]	1427	64 [14->95]	1495 ⁶	55 [17->95]
Uzbekistán	259 ⁶	30 [12-66]
Vanuatu	2 ⁶	...
Venezuela	9000	45 [8-79]	15417	64 [14->95]	...	53 [16-88]
Viet Nam	300	<1 [<1-1]	3000	6 [4-10]	8310	14 [9-23]
Yemen	0 ⁶	...
Zambia	20000	7 [6-9]	48585	16 [13-20]	82030	26 [22-32]
Zimbabwe	8000	1 [1-2]	24500	4 [3-5]	66920	11 [9-15]

¹ Los valores de 2004 y 2005 son los informados a la OMS, a menos que se indique lo contrario. En algunos casos, cuando los datos de 2005 no estaban disponibles, se utilizaron los valores de 2004

² Las cifras de cobertura no se calculan para países con una necesidad estimada menor que 500

³ Los valores informados por los países están proyectados a diciembre (ver métodos en notas del anexo)

⁴ Valores conciliados entre ONUSIDA, OMS y UNICEF en consultas con los países, a menos que se indique lo contrario

⁵ El país informó al ONUSIDA un valor diferente: Angola = 7491; Bosnia y Herzegovina = 33; Brasil = 184252; Croacia = 73; Lituania = 84; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte = 324000

⁶ El ONUSIDA no recibió datos, los valores fueron proporcionados por la OMS. Los valores son hasta fines de diciembre, excepto los siguientes, que corresponden a 2006: Albania = oct; Argelia = nov; Bélgica = abril; Canadá = sep; Finlandia = ago; Iraq = jun; Jordania = sep; Uruguay = sep; Vanuatu = oct; Yemen = sep

⁷ Los datos incluyen adultos únicamente

⁸ Los valores 2007 separados por edad y/o sexo no incluyen datos del sector privado y, por tanto, no dan como resultado el total que sí incluye datos del sector privado

⁹ Las estimaciones epidemiológicas se encontraban en revisión al momento de la publicación

¹⁰ Los datos separados pueden no dar como resultado el total informado, dado que puede faltar información sobre la edad y el sexo para algunos pacientes. Debe tenerse en cuenta que estos datos pueden no representar exactamente la distribución nacional de sexo y edades para el tratamiento ART ya que los datos faltantes pueden no estar distribuidos en forma pareja entre sexo y edad.

¹¹ Las cifras acumulativas informadas por el país no dan cuenta del desgaste, las personas perdidas en el seguimiento o las que fallecieron

¹² Fuente diferente: valor 2003 informado por el país al ONUSIDA para el informe UNGASS 2004

¹³ Fuente diferente: valor informado al ONUSIDA solamente

¹⁴ El valor de datos informado por el país difiere del informado al UNICEF

¹⁵ Valor informado al UNICEF para dic, a excepción de Jamaica y Liberia, cuyos valores corresponden a septiembre

¹⁶ Para Sudáfrica, el valor informado por el país para varones es 167278 y para mujeres es 204452

¹⁷ Los valores de datos se informaron por separado para Sudán del norte y Sudán del sur: Sudán del norte dic 2006 = 807, dic 2007 = 775; Sudán del sur dic 2006 = 161, sep 2007 = 303

¹⁸ Las estimaciones se dan en números redondos. Sin embargo, se utilizaron números sin redondear en el cálculo de las tasas de cobertura, totales mundiales y regionales, de modo que pueden encontrarse discrepancias menores entre los totales presentados y los calculados usando las estimaciones sin redondear

Indicador 4 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con infección por el VIH en etapa avanzada que reciben terapia antirretrovírica (ART)									
2007									
Personas que reciben tratamiento				Cantidad de personas que reciben tratamiento ART informada por el país	Mes y año del valor informado por el país	Cantidad de personas que reciben tratamiento ART al final de 2007 ⁴	Porcentaje de personas con VIH avanzado que reciben terapia antirretrovírica, con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto)	Necesidad total estimada con la metodología de OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ¹⁸	Total de necesidad informada por el país
Varón	Mujer	Ambos sexos <15 años	Ambos sexos >15 años						
30 943 ¹⁰	52606 ¹⁰	8532	102700	111232	Sep 07	115348 ³	33 [27-40]	350000 [290000-430000]	312000
4111	3546	908	6749	7657	Dic 07	7657	8 [7-11]	91000 [69000-120000]	21770
...	35000 [20000-58000]	...
30100 ¹⁰	53346 ¹⁰	11176	124520	135696	Dic 07	135696	31 [26-38]	440000 [360000-530000]	1867918
...	780000 [440000-1300000]	...
...	1776	Dic 07	1776	56 [23->95]	3100 [1700-7800]	1970
...	...	225 ¹⁵	319 ⁶	24 [9-51]	1400 [630-3500]	...
...	2	Dic 07	2 ⁶
...	15417 ⁶	44 [17-75]	35000 [21000-89000]	...
6872 ¹⁰	2118 ¹⁰	789	14180	14969	Sep 07	17354 ³	26 [17-42]	67000 [41000-110000]	49960
69	38	1	106	107	Dic 07	107 ⁶
65648 ⁸	83551 ⁸	11602 ⁸	137597 ⁸	149199	Dic 07	151199	46 [40-56]	330000 [270000-380000]	370000
32377 ^{8,10}	52837 ^{8,10}	8237 ^{8,10}	77479 ^{8,10}	97692	Dic 07	97692	18 [15-23]	570000 [440000-690000]	260000

Indicador 5 del UNGASS. Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil

País (o territorio)	2004		2005		2006
	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos ¹	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos ¹	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos ¹
Afganistán	0
Argelia	18 ⁵
Angola	2 [2-3]	1923
Antigua y Barbuda	50 ⁵	4 ^{3,5}
Argentina	...	55 ⁴	...	[94->95]	2120
Armenia	...	3 ⁴	5
Australia
Azerbaiyán	1
Bahamas	95 ⁵
Bangladesh	5
Barbados	90 ⁵	37
Belarús	119	[83->95]	158
Belice	...	70 ⁴	38	[18-47]	57
Benin	1214	27 [23-31]	2378
Bhután	3
Bolivia	27 ⁵
Bosnia y Herzegovina	0 ⁵
Botswana	10508	89 [82->95]	7543	64 [59-70]	12994
Brasil	7233	[60->95]	6771	[56->95]	6510
Bulgaria	1 ⁵
Burkina Faso	398	5 [4-6]	937	11 [9-13]	1615
Burundi	374	4 [3-6]	524	6 [5-9]	1112 ³
Camboya	159	[6-9]	228	[10-15]	312
Camerún	4200	11 [10-13]	3592	10 [9-12]	7588 ³
Cabo Verde	12	...	43 ³
República Centroafricana	243	2 [2-3]	803	7 [7-8]	1943
Chad	193	1 [<1-2]	254 ³
Chile	139 ⁵
China	118	[1-3]	135	[1-3]	650
Colombia	112 ³
Comoras	0
Congo, República del	312	7 [6-8]	1093	23 [20-28]	325
Costa Rica	21 ³
Côte d'Ivoire	2543	8 [7-9]	2773
Croacia	3 ⁵
Cuba	34 ⁵
República Checa	15
Rep. Democrática del Congo	846	2 [2-3]	1725	5 [4-6]	3422 ³
Djibouti	49	6 [5-8]	16	2 [2-3]	52 ⁵
Dominica	>95 ⁵	1 ⁵

Indicador 5 del UNGASS. Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil						
2006	2007					
Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ⁶	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Bajo	Alto	Total de embarazadas VIH-positivas, según estimación con metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ¹³	Total de embarazadas VIH-positivas según lo informado a ONUSIDA ¹²
...	0
[3-12]	19	[3-12]	<200	660	... [<200-660]	0
11 [9-14]	1645	9 [7-13]	13000	22000	18000 [13000-22000]	22332
83 ⁵	4 ⁷	5
[94->95]	2193	[93->95]	1200	2400	... [1200-2400]	2530
[16-38]	6	[19-45]	<100	<100	... [<100-<100]	6
...	28	...	<100	<100	... [<100-<100]	33
<1-4]	6	[4-17]	<100	<200	... [<100-<200]	...
>95 [86->95]	77 ⁷	>95 [68->95]	<100	<200	<100 [<100-<200]	76
[1-5]	<200	<500	... [<200-<500]	...
[>95->95]	20	[73->95]	<100	<100	... [<100-<100]	21
[>95->95]	127	[90->95]	<100	<200	... [<100-<200]	144
[26-69]	55	[24-64]	<100	<500	... [<100-<500]	57
53 [45-61]	1830	40 [35-47]	3900	5300	4500 [3900-5300]	1158
[44->95]	...	-	<100	<100	... [<100-<100]	...
[11-20]	34 ⁵	[12-13]	<200	<500	... [<200-<500]	763
0 ⁵	0 ⁵	1
>95 [>95->95]	12419	>95 [>95->95]	10000	12000	11000 [10000-12000]	...
[55->95]	6188	[49->95]	5600	13000	... [5600-13000]	12535
...	1 ⁵
19 [16-23]	1480	18 [15-22]	6800	10000	8300 [6800-10000]	18495
14 [10-20]	1102	14 [11-22]	5100	10000	7800 [5100-10000]	18010
[14-22]	505	[25-41]	1200	2000	... [1200-2000]	4509
22 [18-30]	7516 ⁷	22 [18-34]	22000	42000	34000 [22000-42000]	67875
31 ⁵	51	99
18 [16-20]	3714 ⁷	34 [30-38]	9800	12000	11000 [9800-12000]	36093
1 [1-2]	...	1 [1-2]	10000	22000	18000 [10000-22000]	...
[28-57]	117	[12-23]	<500	500	... [<500-500]	117
[6-15]	593	[6-14]	4300	11000	... [4300-11000]	787
[3-7]	144	[4-9]	1600	3700	... [1600-3700]	184
0	0	0	<100	<100	... [<100-<100]	4
7 [6-9]	240 ⁸	5 [4-7]	3400	5400	4400 [3400-5400]	1617
[9-27]	...	[9-25]	<100	<500	... [<100-<500]	37
9 [8-11]	3240 ⁷	12 [9-16]	21000	34000	28000 [21000-34000]	21977
>95 ⁵	2	3
[33->95]	41	[37->95]	<100	<200	... [<100-<200]	35
[84->95]	<100	<100	... [<100-<100]	...
9 [8-11]	3435	9 [8-10]	33000	46000	38000 [33000-46000]	68865
...	610	1000	820 [610-1000]	...
>95 ⁵	1	1

Indicador 5 del UNGASS. Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil

País (o territorio)	2004		2005		2006
	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ¹	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ¹	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ¹
República Dominicana	968	[38-61]	676	[27-43]	738
Ecuador	223	[30-94]	213 ³
Egipto
El Salvador	144	[11-36]	193 ³
Guinea Ecuatorial	103 ⁵
Eritrea	61	3 [2-4]	88	4 [3-5]	75
Estonia
Etiopía	1390	2 [2-2]	2341	4 [3-4]	2330
Fiji	25 ⁵	5
Gabón	90	4 [3-5]	89
Gambia	87	[11-37]	103
Georgia	7	[47->95]	15	[7-21]	15 ³
Alemania	80 ⁵	225 ⁵
Ghana	196	1 [1-1]	1078	7 [7-8]	1239
Grecia	18 ⁵
Granada	5 ⁵
Guatemala	11	[<1-<1]	111	[1-3]	167 ³
Guinea	146	3 [2-3]	77	1 [1-2]	486
Guinea-Bissau	20 ⁵	195 ³
Guyana	73	[14-42]	112	[22-74]	144
Haití	620	13 [11-16]	800	17 [14-20]	991
Honduras	198	[18-54]	200
Hungría	0 ⁵
India	4289	[4-7]	2279	[2-4]	7007 ³
Indonesia	15	[<1-2]	4	[<1-<1]	40 ⁵
Irán, República Islámica del	19 ⁵
Jamaica	323	[52->95]	300	[48->95]	371 ³
Japón	29 ⁵
Jordania	0
Kazajstán	37	[19-66]	47	[16-69]	80 ³
Kenya	21069	25 [22-29]	19403	24 [21-28]	37130
Kirguistán	9
República Democrática Popular Lao	2	[2-17]	11	[9-30]	24 ⁵
Letonia	37 ⁵
Lesotho	821	6 [6-7]	1811	14 [13-16]	2005 ³
Liberia	3	<1 [<1-<1]	130	5 [4-6]	76
Lituania	1	[3-13]	2 ⁵
Madagascar	8	[1-3]	7 ³
Malawi	2719	4 [3-4]	5076	7 [6-8]	9231
Malasia	141	[9-21]	170

Indicador 5 del UNGASS. Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil						
2006	2007					
Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ⁷	Cantidad de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ⁶	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Bajo	Alto	Total de embarazadas VIH-positivas, según estimación con metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ¹³	Total de embarazadas VIH-positivas según lo informado a ONUSIDA ¹²
[32-54]	795	[36-65]	1200	2200	... [1200-2200]	1649
[28-87]	268	[34->95]	<500	800	... [<500-800]	347
...	5	[2-2]	<200	<500	... [<200-<500]	...
[17-48]	130	[12-32]	<500	1100	... [<500-1100]	130
14 [11-20]	-	...	530	940	710 [530-940]	...
3 [2-5]	168 ⁷	7 [4-11]	1600	4000	2500 [1600-4000]	3578
...	<100	<200	<100 [<100-<200]	...
4 [3-4]	4888	7 [7-8]	58000	74000	66000 [58000-74000]	75420
[60-76]	7	[82->95]	<100	<100	... [<100-<100]	7
4 [3-5]	494	21 [14-32]	1600	3500	2300 [1600-3500]	2570
[13-44]	133 ⁷	[17-58]	<500	800	... [<500-800]	709
[40->95]	22	[41->95]	<100	<100	... [<100-<100]	25
[40->95]	<200	590	... [<200-590]	...
9 [8-10]	2896	21 [18-24]	12000	16000	14000 [12000-16000]	19918
[14-45]	21	[16-69]	<100	<200	... [<100-<200]	21
50 ⁵	7	10
[2-5]	373	[5-12]	3200	8100	... [3200-8100]	2270
8 [6-10]	679 ⁷	11 [8-14]	5000	8600	6200 [5000-8600]	1722
13 [9-19]	349	24 [17-34]	1000	2100	1500 [1000-2100]	3716
[29->95]	<200	<500	... [<200-<500]	...
20 [17-24]	1107 ⁹	22 [18-26]	4200	6100	5100 [4200-6100]	5224
[18-64]	220	[19-79]	<500	1200	... [<500-1200]	...
0 ⁵	1	[2-8]	<100	<100	... [<100-<100]	1
[8-16]	8816	[10-24]	37000	92000	... [37000-92000]	86121
[<1-2]	89	[2-4]	2100	5300	... [2100-5300]	...
[1-2]	22	[1-2]	940	1800	... [940-1800]	220
[58->95]	292 ⁷	[45->95]	<500	640	... [<500-640]	171
[49-62]	<100	<100	... [<100-<100]	...
...	2 ¹⁰	0
[23->95]	126	[30->95]	<100	<500	... [<100-<500]	210
48 [42-56]	52858 ⁷	69 [61-80]	66000	86000	76000 [66000-86000]	105000
[8-27]	3	[2-8]	<100	<200	... [<100-<200]	197
[14-42]	24	[9-36]	<100	<500	... [<100-<500]	235
[34-78]	37	[33-75]	<100	<200	... [<100-<200]	38
16 [15-18]	3966	32 [29-36]	11000	14000	12000 [11000-14000]	12750
3 [2-3]	224	7 [6-9]	2400	3900	3100 [2400-3900]	...
[6-25]	9	[27->95]	<100	<100	... [<100-<100]	10
[1-3]	25	[3-9]	<500	760	... [<500-760]	1521
13 [11-15]	23158	32 [28-36]	64000	82000	73000 [64000-82000]	71847
[9-23]	183	[9-24]	770	2000	... [770-2000]	158

Indicador 5 del UNGASS. Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil

País (o territorio)	2004		2005		2006
	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ¹	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ¹	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ¹
Malí	87	[1-1]	415	[4-6]	656
Mauritania	10	[1-4]	12 ³
Mauricio	...	>95 ⁴	23 ⁵
México	146 ³
Moldova	31	[56->95]	32	...	62
Mongolia	1
Montenegro	0
Marruecos
Mozambique	3117	3 [3-4]	8490	9 [8-11]	12150
Myanmar	274	[4-8]	629	[9-18]	993
Namibia	1126	12 [10-14]	4055	43 [36-52]	6022 ³
Nepal	35
Nueva Zelanda	8 ⁵
Nicaragua	29	[11-31]	26
Níger	0	0	57	[1-3]	214 ³
Nigeria	1050	<1 [<1-<1]	532	<1 [<1-<1]	6168 ³
Pakistán	8
Panamá	153 ⁵
Papua Nueva Guinea	46	5 [5-6]	46	4 [4-4]	31
Paraguay	47	[6-20]	73 ³
Perú	161	[10-20]	188	[11-22]	560 ³
Filipinas	2 ⁵
Polonia	62 ³
Rumania	21	[6-11]	...	<1 ⁵	75
Federación de Rusia	5601	[55->95]	5709	[54->95]	6224 ³
Rwanda	4141	35 [31-40]	5782	51 [45-58]	7768
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía	20 ⁵	3 ⁵
San Vicente y las Granadinas	62 ⁵	17 ⁵
Santo Tomé y Príncipe	2	...	8	...	11 ⁵
Senegal	57	[1-2]	212 ⁵
Serbia	5	[4-15]	6	[5-17]	2
Seychelles	>95 ⁵	5 ⁵
Sierra Leona	17	<1 [<1-<1]	57	1 [1-2]	354
Singapur
Somalia	3 ⁵	5
Sudáfrica	32541	15 [13-17]	75077	34 [29-40]	111357 ³
Sri Lanka	1 ³
Suriname	33	[22-67]	35
Swazilandia	592	5 [4-5]	4780	36 [33-40]	8221

Indicador 5 del UNGASS. Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil						
2006		2007				
Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ⁶	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Bajo	Alto	Total de embarazadas VIH-positivas, según estimación con metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ¹³	Total de embarazadas VIH-positivas según lo informado a ONUSIDA ¹²
[6-10]	1018	[10-15]	6800	11000	... [6800-11000]	8570
[2-5]	45	[6-20]	<500	770	... [<500-770]	800
[8-28]	19	[6-23]	<100	<500	... [<100-<500]	60
[3-7]	2000	4900	... [2000-4900]	...
[50->95]	73	[51->95]	<100	<200	... [<100-<200]	86
[10-56]	0	0	<100	<100	... [<100-<100]	13
...	1
...	42	[8-18]	<500	550	... [<500-550]	544
13 [11-15]	44975	46 [39-56]	81000	120000	97000 [81000-120000]	150995
[14-31]	1280	[18-43]	2900	7100	... [2900-7100]	...
65 [54-79]	...	64 [53-80]	7600	11000	9400 [7600-11000]	...
[2-4]	36	[2-4]	990	2300	... [990-2300]	1800
[57->95]	9 ⁵	[61->95]	<100	<100	... [<100-<100]	...
[9-27]	43	[15-44]	<100	<500	... [<100-<500]	174
[5-10]	1006 ⁷	[20-47]	2100	5000	... [2100-5000]	6710
3 [3-5]	12278	7 [5-10]	130000	240000	190000 [130000-240000]	...
<1-<1]	5	<1-<1]	1500	3700	... [1500-3700]	...
[32-65]	71 ⁷	[14-29]	<500	510	... [<500-510]	377
2 [2-2]	84	4 [4-5]	1800	2100	1900 [1800-2100]	3621
[9-30]	141 ⁷	[17-57]	<500	830	... [<500-830]	374
[33-64]	502	[28-56]	890	1800	... [890-1800]	...
[1-2]	1	<1-<1]	<200	<500	... [<200-<500]	2
[26-87]	63	[26-85]	<100	<500	... [<100-<500]	63
[23-45]	68	[22-42]	<200	<500	... [<200-<500]	70
[57->95]	6419	[59->95]	4500	11000	... [4500-11000]	...
71 [62-81]	6485 ⁷	60 [51-71]	9100	13000	11000 [9100-13000]	...
>95 ⁵
64 ⁵	11	14
85 ⁵
9 ⁵	22	90
[4-8] ⁵	264	[4-9]	3000	6300	... [3000-6300]	385
[2-6]	...	[2-5]	<100	<200	... [<100-<200]	...
>95 ⁵
8 [6-11]	919	21 [15-29]	3100	6200	4400 [3100-6200]	520
...	12 ⁷	[24-72]	<100	<100	... [<100-<100]	...
[0-1]	11	[1-2]	510	1700	... [510-1700]	2865
50 [43-60]	127164 ⁷	57 [49-69]	180000	260000	220000 [180000-260000]	290000
[1-3]	1	[1-3]	<100	<100	... [<100-<100]	55
[20-61]	...	[18-57]	<100	<200	... [<100-<200]	...
62 [57-69]	8772	67 [60-74]	12000	15000	13000 [12000-15000]	13178

Indicador 5 del UNGASS. Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil

País (o territorio)	2004		2005		2006
	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos ¹	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos ¹	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Cantidad de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretroviricos ¹
Suecia	31 ⁵
Tayikistán	4	[1-7]	4
Tailandia	5020	[34-68]	5081	[34-71]	4305 ³
Timor-Leste
Togo	180	2 [2-3]	720	9 [7-11]	910
Trinidad y Tabago	71 ⁵	173 ⁵
Túnez	0
Turquía	4
Uganda	7907	9 [8-10]	12073	15 [13-17]	19991
Ucrania	2817	[53-91]	2168	[36-63]	2517
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	1065 ⁵
República Unida de Tanzania	1800	2 [2-2]	6202	6 [6-7]	14758
Uruguay	...	>95 ⁴	...	19 ⁵	53
Uzbekistán
Venezuela	310
Viet Nam	368	[6-16]	1385
Yemen
Zambia	12983	18 [16-20]	14071	19 [17-22]	25578
Zimbabwe	5534	8 [7-8]	8461	13 [12-14]	10127

¹ Valores notificados por UNICEF, a menos que se indique lo contrario. Los datos abarcan un periodo de 12 meses, a menos que se indique lo contrario

² Todos los valores están redondeados al entero más próximo. Se incluyen intervalos para los países con epidemia baja y concentrada

³ El valor difiere del informado a ONUSIDA en 2008

⁴ El valor de 2003 se utilizó para representar el año 2004, según informó el país a ONUSIDA para el UNGASS 2004

⁵ Valor informado a ONUSIDA

⁶ Todos los datos indican valores que representan un periodo de 12 meses que finalizó en diciembre de 2007. Estos valores se unificaron entre los informes de cada país y de ONUSIDA/OMS/UNICEF, a menos que se indique lo contrario

⁷ Los datos que no representaban un periodo de 12 meses se proyectaron para crear un valor correspondiente a 12 meses (véanse los métodos en las notas). Los valores informados se muestran en la tabla a continuación:

Países para los que se proyectó la cantidad de embarazadas infectadas con el VIH que recibieron antirretroviricos para la PTMI		
País	Fecha y mes del valor informado	Valor informado
Camerún	ene 07 a oct 07	6 263
República Centroafricana	ene 07 a jun 07	1 857
Côte d'Ivoire	ene 07 a jul 07	1 890
Eritrea	ene 07 a oct 07	140
Gambia	ene 07 a sep 07	100
Guinea	ene 07 a sep 07	509
Jamaica	ene 07 a jun 07	146
Kenya	ene 07 a jun 07	26 429
Myanmar	ene 07 a oct 07	1 067
Níger	ene 07 a jun 07	503
Panamá	ene 07 a sep 07	53
Paraguay	ene 07 a nov 07	129
Rwanda	ene 07 a nov 07	5 945
Sudáfrica	ene 07 a sep 07	95 373
Suecia	ene 07 a sep 07	23

Indicador 5 del UNGASS. Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil						
2006	2007					
Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ⁸	Cantidad de mujeres embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos ⁶	Porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibieron antirretrovíricos, con la metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ²	Bajo	Alto	Total de embarazadas VIH-positivas, según estimación con metodología OMS/ONUSIDA (Bajo-Alto) ¹³	Total de embarazadas VIH-positivas según lo informado a ONUSIDA ¹²
[21-66]	31 ^{7,11}	[21-63]	<100	<200	... [<100-<200]	31
[1-6]	9	[2-11]	<100	<500	... [<100-<500]	438
[29-63]	9352	[62->95]	6400	15000	... [6400-15000]	6196
...	2
11 [9-14]	705	9 [7-11]	6300	10000	8000 [6300-10000]	10329
[47->95]	137	[37-78]	<200	<500	... [<200-<500]	...
0	1	[1-3]	<100	<100	... [<100-<100]	...
>95
25 [22-28]	26484	34 [29-39]	68000	92000	78000 [68000-92000]	91000
[40-69]	3046	[45-79]	3800	6700	... [3800-6700]	3293
[76->95]	48 ^{5,9}	[3-14]	<500	1600	... [<500-1600]	487
15 [14-16]	31863	32 [29-35]	91000	110000	100000 [91000-110000]	114800
[22-79]	...	[20-76]	<100	<500	... [<100-<500]	...
[3-19]	95	[11-68]	<200	830	... [<200-830]	...
[8-25]	...	[7-24]	1300	4600	... [1300-4600]	...
[22-60]	744	[12-31]	2400	6400	... [2400-6400]	5352
...	2
35 [31-39]	35314	47 [41-52]	68000	86000	76000 [68000-86000]	90252
17 [16-19]	15381	29 [27-32]	48000	57000	52000 [48000-57000]	16769

⁸ El país informó 274 para ene a dic 2007

⁹ El país informó 1066 para ene a dic 2007

¹⁰ El país informó 0 para ene a dic 2007

¹¹ Representa Estocolmo únicamente

¹² La necesidad que informó el país no siempre representa la cantidad estimada de mujeres embarazadas VIH-positivas. En algunos casos puede referirse a la cantidad de mujeres embarazadas VIH-positivas identificadas u otra definición no necesariamente representativa del número con necesidad a escala nacional. Para obtener más información, consulte el informe de progreso específico del país: <http://data.unaids.org/pub/Report/2008>

¹³ Las estimaciones se dan en números redondos. Sin embargo, se utilizaron números sin redondear en el cálculo de las tasas y los totales mundiales y regionales, de modo que pueden encontrarse discrepancias menores entre los totales presentados y los calculados usando las estimaciones redondeadas.

Indicador 6 del UNGASS. Porcentaje de casos nuevos estimados de tuberculosis en VIH-positivos que recibieron tratamiento para la TB y el VIH

País (o territorio)	2007	
	Adultos tratados	Porcentaje de pacientes tratados
Afganistán	2	<1
Argelia ¹	82	87
Argentina	415	55
Armenia ¹	15	59
Azerbaiyán	3	4
Bahamas	26	81
Barbados	2	100
Belarús	136	72
Belice	9	69
Benin	157	31
Bolivia	60	41
Bulgaria ²	32	
Burkina Faso	199	1
Cabo Verde	3	3
República Centroafricana	3671	15
China	901	13
Costa Rica	13	100
Côte d'Ivoire	994	10
Croacia	3	100
Cuba	46	90
Dominica	1	100
República Dominicana ¹	322	115
Rep. Dem. del Congo	162	<1
Ecuador	150	40
El Salvador	63	100
Etiopía	2658	13
Fiji	2	40
Finlandia	0	
Gabón	521	13
Georgia	34	71
Grenada ²	0	
Guatemala	109	33
Guinea	245	61
Haití	61	5
Honduras	383	71
Hungría ³	7	<1
India	19400	23
Irán, República Islámica del	52	20
Jamaica	18	72
Japón	10	83
Jordania	0	
Kazajstán	76	33

Indicador 6 del UNGASS. Porcentaje de casos nuevos estimados de tuberculosis en VIH-positivos que recibieron tratamiento para la TB y el VIH

País (o territorio)	2007	
	Adultos tratados	Porcentaje de pacientes tratados
Letonia	27	57
Líbano ¹	3	148
Lituania	5	38
Malawi	18910	70
Malasia	72	33
Mauritania ^{1,4}	95	86
Mauricio	3	16
México	806	78
Marruecos	88	73
Mozambique ¹	1008	4
Nepal ¹	321	46
Nicaragua	13	14
Níger	197	1
Nigeria	28625	56
Panamá	270	5
Papua Nueva Guinea	320	35
Paraguay	20	14
Perú	93	11
Filipinas	99	49
Polonia ¹	70	176
República de Moldavia	23	10
Federación de Rusia ^{1,4}	463	39
Saint Kitts y Nevis	2	100
Santa Lucía	2	50
Santo Tomé y Príncipe ²	0	
Senegal	319	15
Seychelles	11	100
Eslovenia ²	0	
Somalia	14	2
Sudáfrica ³	159382	50
San Vicente y las Granadinas	4	100
Tayikistán	6	8
Ex Rep. Yug. de Macedonia ²	2	
Tailandia ¹	2260	23
Togo ¹	44	2
Turquía ²	47	
Ucrania	411	15
Rep. U. de Tanzania	188	12
Uruguay	20	25
Viet Nam	390	15
Zambia	21103	35

¹ Estimación del denominador provisto por la OMS (Informe sobre el Control Mundial de la Tuberculosis, 2008)

² No se dispone de denominador

³ El denominador es el número total de casos de TB informados en 2007

⁴ Para Mauritania, se dispone de datos para un periodo de 2 años únicamente; por lo tanto, el indicador para 2007 asume casos con distribución uniforme en cada año. Para la Federación de Rusia, se informan datos de 3 regiones geográficas únicamente: el Óblast de Ulyanovskaya, el Óblast de Saratovskaya, el Óblast de Tverskaya y Altayskiy Kray

Indicador 7 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que recibieron una prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen sus resultados

País (o territorio)	Valor informado por el país							Últimas encuestas DHS		
	Año de encuesta	Varón	Mujer	Ambos sexos				Año de encuesta	Varón	Mujer
		15-49	15-49	15-19	20-24	25-49	15-49		15-49	15-49
Afganistán	2007									27
Argelia	2006	0	1	0	1 ¹	1	1			
Angola	2006	7	4							5
Antigua y Barbuda	2006									25
Argentina	2005		8	4	12					
Barbados	2006	97 ¹	99 ¹							99 ¹
Belarús	2007	26	33	26	35	31	31			
Bélgica		8	9		5	10	9			
Belice	2006	10	20							15
Benin	2006	12	15	7	17	15	14	2006	5	7
Bolivia	2007	87 ¹	87 ¹	86 ¹	88 ¹	87 ¹	87 ¹			
Bosnia y Herzegovina	2006		0	0	0	0				
Burkina Faso	2007	18	23	15	28	27	21			
Burundi	2007	91 ¹	93 ¹	91 ¹	92 ¹	93 ¹	92 ¹			
Camboya	2006	5	3	2	6	4	4	2005	5	3
Camerún	2004	7	5	3	6	6	5	2004	7	5
Canadá	2006									32
Cabo Verde	2005	10	10	3	13	13	10	2005	10	10
República Centroafricana	2006	15	17	10	19	17	16			
Chad	2004	2	1	0	1	1	1	2004	2	1
Chile	2007	22	35	8	33	48	28			
China	2006	2	2							2
Colombia	2007	11 ²	27 ²							19 ²
Congo, República del	2005	3	3	1	4	4	3	2005	3	3
Costa Rica	2007	8 ¹	7 ¹			80 ¹	12 ¹			
Côte d'Ivoire	2005	3	4	2	3	4	3	2005	3	4
Cuba	2006	28	32	17	32	32	30			
Rep. Democrática del Congo	2007	4	4	2	5	5	4	2007	4	4
República Dominicana	2007	19	21	8	22	23	20	2007	19	21
Ecuador	2007		11	7	13	12				
Eritrea	2007									6
Etiopía	2005	2	2				2	2005	2	2
Gabón	2007	50 ¹	64 ¹	33 ¹	54 ¹	62 ¹	59 ¹			
Gambia	2005	8	12				10			
Alemania	2007	14	11				13			
Ghana	2006							2006	3	4
Grecia	2007	13	11	5	9	16	12			
Granada	2006	6	13	3	19	10	10			
Guinea	2005	3	1	1	2	2	2	2005	3	1
Guinea-Bissau	2006		5							
Guyana	2005	10	11	7	17	11	11	2005	10	11
Haití	2006	5	8	3	8	8	7	2005	5	8

Indicador 7 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que recibieron una prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen sus resultados

País (o territorio)	Valor informado por el país							Últimas encuestas DHS		
	Año de encuesta	Varón	Mujer	Ambos sexos				Año de encuesta	Varón	Mujer
		15-49	15-49	15-19	20-24	25-49	15-49		15-49	15-49
Honduras	2006	21 ¹	23 ¹				23 ¹			
Hungría	2007	0	0				0			
India	2006	1	1	0	2	2	1	2006	1	1
Israel				16	14	14	15			
Jamaica	2004	12	19			17	16			
Japón	2006						98 ¹			
Kazajstán	2007	4	5	2	4	5	7			
Kenya	2003	8	7	4	9	7	14	2003	8	7
Lesotho	2005	5	6	2	7	8	6	2004	5	6
Lituania	2007	24 ¹	20 ¹			24 ¹	24 ¹			
Madagascar	2004	1 ³	0 ³					2004	1	<1
Malawi	2007						11 ¹	2004	8	7
Malasia	2007						75 ¹			
Malí	2006	3	7	2	4	3	5	2006	10	7
Islas Marshall	2006	56 ¹	67 ¹	67 ¹	50 ¹		60 ¹			
Mauritania	2007	10	3				5			
Mauricio	2004				3 ¹	2 ¹	2 ¹			
México	2006						1 ¹			
Moldova	2007	6	11	3	10	10	8			
Montenegro	2006		3	1	4	3				
Marruecos	2007	6 ¹	4 ¹	3 ¹	6 ¹		5 ¹			
Mozambique	2004	2	2	3	3	2	2	2003	3	2
Namibia	2007	18	29	9	26	27	23	2006	18	29
Nicaragua	2007		5	2	4	7	5			
Níger	2006	4	2	2	2	3	2			
Nigeria	2005	9	8	3	8	11	9			
Palau	2006		16 ¹	27 ¹	20 ¹	14 ¹				
Filipinas	2003	2						2003		1
Polonia	2007						1 ¹			
Federación de Rusia	2007	30 ¹	38 ¹	20 ¹	35 ¹	37 ¹	34 ¹			
Rwanda	2005	11	12	4	16	13	11	2005	11	12
Saint Kitts y Nevis	2006					10 ¹	10 ¹			
Santa Lucía	2007	34 ¹	39 ¹				36 ¹			
San Vicente y las Granadinas	2006	8	12	6	12	12	10			
Senegal	2005	2	1	1	1	1	1	2005	1	2
Seychelles	2006	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹			
Sierra Leona	2007	8 ¹	9				9 ¹			
Singapur	2007	9	7	0	13	8	8			
Somalia	2004	5 ¹	3 ¹				4 ¹			
Sudáfrica	2006	90 ¹	90 ¹	90 ¹	90 ¹	90 ¹	90 ¹			
España	2003						25			
Sri Lanka	2007	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹	0 ¹			

Indicador 7 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que recibieron una prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen sus resultados										
País (o territorio)	Valor informado por el país							Últimas encuestas DHS		
	Año de encuesta	Varón	Mujer	Ambos sexos				Año de encuesta	Varón	Mujer
		15-49	15-49	15-19	20-24	25-49	15-49		15-49	15-49
Suriname	2006		30							
Swazilandia	2007	9	22	6	18	21	16	2007	9	22
Suiza	2007	7	7	5	7	7	7			
Tayikistán	2007	4 ¹	2 ¹	2 ¹	5 ¹		3 ¹			
Tailandia	2006	16	22	16	22	19	19			
Ex República Yugoslava de Macedonia	2006		3	2	3	3				
Togo	2007	16	15	10	17	17	16			
Trinidad y Tabago	2006						8 ¹			
Turquía	2006	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹	100 ¹			
Uganda	2006	10	12				12	2006	10	12
Ucrania	2007	11 ¹	20 ¹	12 ¹	19 ¹	16 ¹	16 ¹			
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	2006	1 ¹	3 ¹				2 ¹			
República Unida de Tanzania	2007						36	2004	7	6
Uruguay	2007	20	19	15	20	20	20			
Viet Nam	2005	3	2	1	3	3	2	2005	3	2
Zambia	2007	12	19	10	19	17	15	2007	12	19
Zimbabwe	2006	7	7	4	9	7	7	2006	7	7

¹ Metodología no armonizada con las directrices del UNGASS 2008

² 14 a 26 años

³ 15 a 24 años

Indicador 8 del UNGASS. Porcentaje de las poblaciones más expuestas que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen los resultados ¹

País (o territorio)	Profesionales del sexo				Usuarios de drogas inyectables				Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	
	2005		2007		2005		2007		2005	2007
	Todos	Todos	Varón	Mujer	Todos	Todos	Varón	Mujer	Todos	Todos
Afganistán		11 ⁵		11		6				
Argelia					15					
Angola		42 ⁵		42						
Argentina	36		38	65		47	43	62	96	98
Armenia	33	18 ⁵		18	21	23	23	13	42	5
Australia		63 ⁵		63		57 ⁴				50
Bahamas										61
Bangladesh	2 ⁵	6	8	5	3	3 ⁶	3			6
Barbados		73 ^{4,5}		73 ⁴						
Belarús	49	63 ⁵		63	39	49	49	49	55	53
Bélgica										62 ³
Benin		30 ⁵		30						
Bolivia		78 ⁴	85 ⁴	78 ⁴						100 ⁴
Bosnia y Herzegovina		96 ^{2,4}				53 ⁶	53			10 ^{2,4}
Bulgaria		53 ⁵		53		38	36	52		29
Burkina Faso		94 ^{4,5}		94 ⁴						
Burundi	38	38 ^{2,5}		38 ²						
Camboya		68 ⁵		68						58
Camerún		32 ^{2,5}		32 ²						
Canadá						59				43 ⁴
Chile										37
China		29 ⁵		29		41	40	45		33
Colombia		82	71	85						61
Congo, República del	3								8	
Costa Rica										43
Cuba		36	38	32						33
Côte d'Ivoire		51 ⁵		51						57 ⁴
Rep. Democrática del Congo		37 ^{2,5}		37 ²						
República Dominicana		64 ^{2,5}		64 ²						
Ecuador				87 ⁴						50 ⁴
El Salvador		96 ⁵		96						55
Eritrea		78								
Estonia		52 ⁵		56		62	63	60		27 ⁴
Etiopía		97 ⁵		97						
Gabón		54	33	55						
Georgia	24	33 ⁵		33	6	9 ⁶	9		27	30 ²
Alemania										18
Ghana		39								25
Grecia										39
Guatemala		93 ⁵		93						64

Indicador 8 del UNGASS. Porcentaje de las poblaciones más expuestas que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen los resultados ¹

UNGASS	Profesionales del sexo				Usuarios de drogas inyectables				Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	
	2005	2007		2005	2007		2005	2007		
		Todos	Varón		Mujer	Todos			Varón	Mujer
País (o territorio)	Todos	Todos	Varón	Mujer	Todos	Todos	Varón	Mujer	Todos	Todos
Guinea		58 ⁵		58						
Guyana		64		64						44
Haití		71								48
Honduras		71 ⁵		71						40
Hungría						8				
India				34						
Indonesia	15	31	52	25	18	36	36	42	15	32
Irán, República Islámica del		20 ⁵		20	9	23	23	16		
Jamaica	43	43 ⁵		43						
Japón										38
Kazajstán		70 ⁵		70		42	41	49		38
Kenya		12 ²								40
Kirguistán		53 ⁵		53		34	32	43		70
República Democrática Popular Lao	9									5
Letonia						61	62	60		
Líbano		24 ⁴	11 ⁴	25 ⁴		4 ⁴	2 ⁴	50 ⁴		14 ⁴
Lituania		50 ⁵		50		64	60	81		28
Madagascar		49 ⁵		49						
Malawi		69 ⁵		69						
Malasia		100 ^{3,4}				100 ⁴				100
Malí		7								
Mauritania		100 ^{4,5}		100 ⁴						15 ⁴
Mauricio		30 ²				20 ²	24 ²	0 ²		16 ²
México		72	63	76		31 ²	28 ²	48 ²		54
Moldova		31 ⁵		31		34	33	38		38
Mongolia	67	53 ⁵		53					23	60
Montenegro		73 ^{4,5}		73 ⁴						81 ⁴
Marruecos		51 ⁵		51	13	13	13	11		
Nepal		40	52	37		21 ⁶	21			30
Níger		38 ⁵		38						
Nigeria		38 ⁵		38		23	23	33		30
Pakistán		4	4	5			4 ⁴			
Panamá	77	55	59	52					45	76
Papua Nueva Guinea		47 ⁵		47						42
Paraguay		100 ⁵	100	100		100	100	100		100
Perú				54 ⁴						21
Filipinas		12 ⁵		12		4	4	15		16
Polonia						<1				<1
Rumania	36	35 ⁵		35	36	16 ⁴	17 ⁴	10 ⁴		47
Federación de Rusia		61 ⁵		61		46	44	50		32

Indicador 8 del UNGASS. Porcentaje de las poblaciones más expuestas que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen los resultados ¹

País (o territorio)	Profesionales del sexo				Usuarios de drogas inyectables				Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	
	2005		2007		2005		2007		2005	2007
	Todos	Todos	Varón	Mujer	Todos	Todos	Varón	Mujer	Todos	Todos
Rwanda		65 ⁵		65						
Santa Lucía					100 ⁴		100 ⁴	100 ⁴		
Santo Tomé y Príncipe		72 ^{4,5}		72 ⁴						
Senegal		70 ⁵		70					11	
Serbia									53	
Sierra Leona		79	75							
Singapur				100						47
España		67 ^{2,4,5}			68 ^{2,4}	67 ^{2,4}	72 ^{2,4}			49 ³
Sri Lanka		43 ⁵		43						14
Suriname		62	75	59						
Swazilandia		94 ^{4,5}		94 ⁴						
Suecia		34 ⁴	100 ⁴	33 ⁴	84 ⁴	83 ⁴	86 ⁴			41
Suiza			38		60	59	61			31
Tayikistán		29 ⁵		29	24	23	30			
Tailandia		53	54	52						35
Ex República Yugoslava de Macedonia	67	47	87	39	32	44	42	53	7	56
Togo		40	22	89						
Túnez				100 ⁴						35 ³
Turquía	26	97	100	97	8	11	0			31
Ucrania	32	46 ⁵		46	27	29	29	30	25	27
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte										17 ²
Uzbekistán		19 ⁵		19	18	18	18			25
Viet Nam		15 ⁵		15	11 ⁶	11				16
Zambia		17	14	23						

¹ Fecha de informe 2007, pero la recopilación de datos puede variar de 2005 a 2007

² La recopilación de datos comenzó antes de 2005

³ No se definió el periodo de recopilación de datos

⁴ Metodología no armonizada con las directrices del UNGASS 2008

⁵ Mujeres únicamente

⁶ Varones únicamente

Indicador 9 del UNGASS. Porcentaje de las poblaciones más expuestas que logran atender los programas de prevención del VIH ¹							
País (o territorio)	2007						
	Profesionales del sexo			Usuarios de drogas inyectables			Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
	Todos	Varón	Mujer	Todos	Varón	Mujer	
Afganistán	11 ³	9 ³	11 ³				
Angola	17						
Argentina			82				98
Armenia	41 ⁴		41	54	55	44	10
Bahamas							48
Bangladesh	54	47	57	82	82	90	13
Belarús	86 ⁴		86	56	54	61	90
Benin	60 ⁴		60				
Bulgaria	77 ⁴		77	47	45	60	30
Burkina Faso	37	15	59				
Burundi	72 ^{2,4}		72 ²				
Camerún	70 ^{2,4}		70 ²				
China	46 ⁴		46	25	25	25	38
Comoras	59 ⁴		59				
Costa Rica							26
Cuba	60	59	65				56
Côte d'Ivoire							100 ³
Ecuador			76				49
El Salvador	73						62
Eritrea	88 ^{3,4}		88 ³				
Estonia							56
Gabón	29	27	29				
Georgia				17 ⁵	17		
Grecia							19
Guatemala	93 ⁴		93				75
Guinea	92 ⁴		92				
Guyana	28 ⁴		28				17
Honduras	23 ⁴		23				24
Indonesia	40	60	34	45	44	55	40
Jamaica	60						
Kazajstán	71 ³			44 ³			48 ³
Kirguistán	89 ^{3,4}		89 ³	78 ³	78 ³	78 ³	77 ³
Letonia				47	45	53	
Líbano	<1 ³	11 ³	22 ³				15 ³
Lituania	43 ⁴		43				40
Malawi	69		69				
Malasia	86 ⁴						100 ³
México	36	55	28	5	5	4	18
Moldova	96		96	89	89	89	86
Mongolia	64						67
Marruecos	49 ⁴		49				
Nepal	42	56	39	78 ⁵	78		47

Indicador 9 del UNGASS. Porcentaje de las poblaciones más expuestas que logran atender los programas de prevención del VIH ¹							
País (o territorio)	Profesionales del sexo			Usuarios de drogas inyectables			Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
	Todos	Varón	Mujer	Todos	Varón	Mujer	
Pakistán	3 ³	3 ³	2 ³	16 ³			
Panamá	76	73	78				89
Papua Nueva Guinea	31 ⁴		31				10
Paraguay	18						
Perú			80				44
Filipinas	14 ⁴		14	14	13	28	19
Rumania							59
Federación de Rusia	39			24	33	21	17
Santo Tomé y Príncipe	80 ^{3,4}		80 ³				
Sierra Leona	73 ⁴		73				
Singapur			100 ³				
Swazilandia	77 ^{3,4}		77 ³				
Suecia	50 ³	100 ³	55 ³	27	26	30	
Tayikistán	60 ⁴		60	25	21	41	
Togo	76	75	81				
Turquía	42 ⁴		42		22	30	19
Ucrania	69 ⁴		69	46	45	50	50
Viet Nam	65 ^{3,4}		65 ³	43 ³	43 ³		26
Zambia	63 ^{2,4}		63 ²				

¹ Fecha de informe 2007, pero la recopilación de datos puede variar de 2005 a 2007

² La recopilación de datos comenzó antes de 2005

³ Metodología no armonizada con las directrices del UNGASS 2008

⁴ Mujeres únicamente

⁵ Varones únicamente

Indicador 10 del UNGASS. Porcentaje de huérfanos y niños vulnerables de 0 a 17 años cuyas familias recibieron apoyo externo básico gratuito para la atención infantil						
País (o territorio)	2005		Valor informado por el país para 2007		Últimas encuestas DHS (o MICS)	
	Año de encuesta	Cobertura	Año de encuesta	Cobertura	Año de encuesta	Cobertura
Benin			2006	69 ¹		
Botswana	2004	34				
Burkina Faso			2007	5 ¹		
Burundi			2006	50 ¹		
Camerún			2006	9	2006 ³	9
República Centroafricana			2006	20 ²	2007	8
Costa Rica			2006	100 ¹		
Côte d'Ivoire			2006	9 ¹	2005	9
Croacia			2007	100 ¹		
República Democrática del Congo					2007	9
República Dominicana			2007	4 ¹		
Etiopía	2004	4	2004	4		
Finlandia				99		
Gabón			2007	10		
Ghana			2006	2 ¹		
Guinea			2007	17 ¹		
Guinea-Bissau			2006	8	2006 ³	8
Haití			2006	5	2005	5
Kenya		10				
Lesotho	2004	25				
Madagascar	2003	7				
Malawi			2006	53 ²	2006 ³	19
Malí	2005	39	2007	45 ¹		
Namibia			2007	17	2006	17
Nigeria			2007	10 ¹		
Rwanda			2005	13	2005	13
Santa Lucía			2007	69 ¹		
Senegal			2007	44 ¹		
Seychelles			2006	100 ¹		
Sierra Leona			2005	1	2005	1
Sudáfrica			2007	67 ¹		
Swazilandia			2007	41	2007	41
Togo		10	2006	60 ²	2006 ³	6
Turquía			2006	100 ¹		
Uganda			2006	11	2006	11
República Unida de Tanzania			2006	51 ¹		
Zambia	2005	13	2007	16	2007	16
Zimbabwe			2006	31	2006	31

¹ Metodología no armonizada con las directrices del UNGASS 2008

² Diferente del valor provisto por UNICEF

³ La fuente es la encuesta basada en indicadores múltiples (MICS de UNICEF)

Indicador 11 del UNGASS. Porcentaje de escuelas que impartieron enseñanza sobre el VIH basada en las aptitudes para la vida durante el último año académico	
País (o territorio)	2007
Angola	1
Antigua y Barbuda	13
Azerbaiján	19
Bahamas	72
Barbados	41
Belarús	79
Bosnia y Herzegovina	24
Botswana	100
Bulgaria	6
Burkina Faso	1
Burundi	64
Camboya	26
Cabo Verde	100
República Centroafricana	15
Chad	4
Comoras	15
Congo, República del	82
Costa Rica	100
Croacia	5
Cuba	71
Côte d'Ivoire	1
Rep. Democrática del Congo	0
Dominica	100
República Dominicana	1
El Salvador	4
Eritrea	26
Etiopía	70
Finlandia	95
Gabón	35
Gambia	33
Alemania	50
Ghana	58
Grenada	0
Honduras	39
Indonesia	10
Irán, República Islámica del	0
Jamaica	24
Kazajstán	72
República Democrática Popular Lao	32
México	27
Moldova	93
Namibia	79

Indicador 11 del UNGASS. Porcentaje de escuelas que impartieron enseñanza sobre el VIH basada en las aptitudes para la vida durante el último año académico	
País (o territorio)	2007
Nepal	6
Nicaragua	8
Níger	8
Nigeria	34
Pakistán	6
Papua Nueva Guinea	25
Rumania	64
Federación de Rusia	82
Santa Lucía	91
San Vicente y las Granadinas	87
Santo Tomé y Príncipe	100
Serbia	1
Seychelles	100
Sudáfrica	96
Swazilandia	51
Togo	0
Turquía	100
Ucrania	57
Zambia	60
Zimbabwe	100

**Indicador 12 del UNGASS. Asistencia escolar actual entre huérfanos y no huérfanos de 10 a 14 años de edad
(proporción de huérfanos y no huérfanos)**

País (o territorio)	2003		2005		2007	
	Proporción	Año de encuesta	Proporción	Año de encuesta	Proporción	Año de encuesta
Angola	0,90					2001
Argentina						2005
Benin						2006
Bolivia						2003
Botswana	0,99					
Burkina Faso						2007
Burundi	0,70					2005
Camboya						2006
Camerún	0,94					2006
República Centroafricana	0,91					2006
Chad	0,96					2004
Colombia						2005
Comoras	0,59					
Congo, República del						2005
Croacia						2007
Cuba						2005
Côte d'Ivoire	0,83					2005
Rep. Democrática del Congo	0,72					2007
Guinea Ecuatorial	0,95					
Eritrea						2002
Etiopía	0,60					2004
Finlandia						>0,99
Gabón	0,98					2007
Gambia	0,85					2006
Ghana	0,93					2006
Guinea	1,13					2005
Guinea-Bissau	1,03					2006
Guyana						2005
Haití						2000
India						2006
Indonesia						2002
Jamaica						2005
Kenya	0,74	2005	0,97			2003
Lesotho	0,87					2007
Madagascar	0,65	2003	0,80			2004
Malawi	0,93	2004	0,97			
Malí	0,72					
Mozambique	0,47					2004
Namibia	0,92	2005	0,97			2007
Nicaragua						2007
Níger	1,07					2006
Nigeria	0,87					2007

Indicador 12 del UNGASS. Asistencia escolar actual entre huérfanos y no huérfanos de 10 a 14 años de edad (proporción de huérfanos y no huérfanos)					
País (o territorio)	2003	2005		2007	
	Proporción	Año de encuesta	Proporción	Año de encuesta	Proporción
Papua Nueva Guinea				2007	0,86
Perú				2006	
Rwanda	0,80			2005	0,82
Santa Lucía				2007	1,76 ²
Senegal	0,74			2007	1,25 ²
Sierra Leona	0,71			2005	0,83
Somalia	0,65			2006	0,78
Sudáfrica	0,95			2007	0,81 ²
Sudan	0,96				
Swazilandia	0,91			2007	0,97
Tailandia				2006	0,93
Togo	0,96			2007	0,94
Turquía				2007	0,70 ²
Uganda	0,95			2000	0,95
República Unida de Tanzania	0,74			2007	0,64
Zambia	0,87	2005	0,17	2005	1,02 ²
Zimbabwe	0,85			2006	0,95

¹ Valor de la Encuesta Demográfica y de Salud proporcionado por MEASURE DHS (www.measuredhs.com).

² El método de recopilación de datos difiere de la metodología que recomienda el UNGASS

³ Diferente del valor provisto por UNICEF

⁴ Encuesta basada en indicadores múltiples (MICS) con pequeños denominadores, por lo general casos no ponderados de 25 a 49

Indicador 13 del UNGASS. Porcentaje de hombres y mujeres jóvenes entre 15 y 24 años de edad que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las principales ideas erróneas acerca de la transmisión del VIH**

País (o territorio)	2003	2005		Valor informado por el país para 2007				Últimas encuestas DHS (o MICS)			
	Mujeres 15-24	Año de encuesta	Varones 15-24	Mujeres 15-24	Año de encuesta	Varones 15-24	Mujeres 15-24	Ambos sexos 15-24	Año de encuesta	Varones	Mujeres
Albania	<1								2005 ¹		6
Argelia					2006		16	16	2006 ¹		13
Angola			43	35	2006	25	21	23			
Antigua y Barbuda					2005			48			
Argentina					2005	83	89	86			
Armenia					2007	42	34	36	2005	15	23
Azerbaiyán	2								2006 ¹	5	6
Bangladesh					2005	24	21	22	2006 ¹		16
Belarús					2007	70	65	68	2005 ¹		34
Belice					2006	26	26	26			
Benin			11	8	2006	35	16	20	2006	35	16
Bolivia	22								2003	18	15
Bosnia y Herzegovina					2006		44		2005 ¹		48
Botswana	28										
Bulgaria					2006	18	21	19			
Burkina Faso					2007	45	46	45	2003	23	15
Burundi	24	2004	4	4	2005		31		2005 ¹		30
Camboya	37				2006	45	49	47	2005	45	50
Camerún	16	2004	34	27	2006		32	32	2004	34	27
Cabo Verde					2005	37	38	38	2005	36	36
República Centroafricana	5				2006	31	22	24	2006 ¹	27	17
Chad	5				2004	20	8	11	2004	19	7
Chile					2007						
China					2007	50	55	42			
Comoras	10								2000 ¹		18
Congo, República del					2005	22	10	13	2005	35	26
Costa Rica					2006	43	42	42			
Côte d'Ivoire	16				2005	28	18	22	2005	28	18
Croacia					2006	16	25	20			
Cuba	52				2006	55	61	58	2000 ¹		30
Chipre					2007	10	11	10			
Rep. Democrática del Congo					2006	29	22	26	2007	21	15
Djibouti									2006 ¹		18
República Dominicana	33				2007	34	41	37	2007 ¹	34	41
Ecuador					2006	31	27	29			
Guinea Ecuatorial	4								2000 ¹		4
Eritrea									2002		37
Estonia					2007	28	37	32			
Etiopía					2005	33	21	24	2005	33	20
Finlandia								85			
Gabón					2007	58	60	59			
Gambia	15				2005	34	25	29	2006 ¹		39

Indicador 13 del UNGASS. Porcentaje de hombres y mujeres jóvenes entre 15 y 24 años de edad que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las principales ideas erróneas acerca de la transmisión del VIH**											
País (o territorio)	2003	2005		Valor informado por el país para 2007				Últimas encuestas DHS (o MICS)			
	Mujeres 15-24	Año de encuesta	Varones 15-24	Mujeres 15-24	Año de encuesta	Varones 15-24	Mujeres 15-24	Ambos sexos 15-24	Año de encuesta	Varones	Mujeres
Georgia					2005		4				
Alemania					2007						
Ghana		2003	40	36					2006	33	25
Grecia					2007	27	23	25			
Granada					2006	43	40	41			
Guatemala					2002	10	9	9			
Guinea					2007	20	12	16	2005	23	17
Guinea-Bissau	8				2006		18		2006		18
Guyana	36				2005	34	44	39	2005	47	53
Haití	14				2006	40	32	35	2005	40	34
Honduras					2005	39	89	77	2006		30
India					2006	33	24	28	2006	36	20
Indonesia	7										
Irán, República Islámica del									2006 ¹		3
Jamaica					2004	23	47	35	2005 ¹		60
Japón					2004						
Kazajstán					2007	18	20	19	2006 ¹		22
Kenya	26	2005	80	58					2003	47	34
Kirguistán					2006	30	33	32	2006 ¹		20
Letonia					2007	3	3	3			
Lesotho	18								2004	19	27
Madagascar		2003	16	19	2006	46	45	45	2004	16	19
Malawi	34	2005	36	24					2004	36	24
Mali					2006	22	18	20	2006	22	18
Islas Marshall					2006	8	4	6	2007	39	27
Mauricio					2004			22			
México					2002	18	18				
Moldova	19				2006	26	27	26	2005		
Mongolia	32	2005	3	5	2005	17	15	16	2005 ¹		35
Montenegro					2006				2006 ¹		30
Marruecos					2007				2003		12
Mozambique					2004	39	25	28	2003	33	20
Namibia					2007	62	65	63	2006	62	65
Nepal					2006	44	28	32	2006	44	28
Nicaragua					2007		81	81	2001		22
Níger	5				2006	16	13	14	2006	16	13
Nigeria					2005	25	20	23	2003	21	18
Palau					2006		27				
Perú					2006			55	2007		19
Filipinas									2003	18	12
Federación de Rusia					2007	33	35	34			
Rwanda	23				2005	54	51	52	2005	54	51

Indicador 13 del UNGASS. Porcentaje de hombres y mujeres jóvenes entre 15 y 24 años de edad que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las principales ideas erróneas acerca de la transmisión del VIH**

País (o territorio)	2003	2005		Valor informado por el país para 2007				Últimas encuestas DHS (o MICS)			
	Mujeres 15-24	Año de encuesta	Varones 15-24	Mujeres 15-24	Año de encuesta	Varones 15-24	Mujeres 15-24	Ambos sexos 15-24	Año de encuesta	Varones	Mujeres
Saint Kitts y Nevis					2006			52			
Santa Lucía					2006	61	57	59			
San Vicente y las Granadinas					2006	59	40	49			
Santo Tomé y Príncipe	11				2006				2006 ¹		44
Senegal					2005	24	19	22	2005	26	21
Serbia					2006	20	21	20	2006 ¹		42
Seychelles					2003	59	67	63			
Sierra Leona	16				2007				2005 ¹		17
Singapur					2007	15	20	17			
Somalia		2004	13	8	2006		4	4	2006 ¹		4
Sudáfrica	20										
Sri Lanka					2007	10	7	8			
Suriname	27				2006		41	41	2006 ¹		41
Swazilandia	27				2007	52	52	52	2007	52	52
República Árabe Siria									2006 ¹		7
Tayikistán					2007	11	11	11	2005 ¹		3
Tailandia					2006	47	33	40	2005 ¹		46
Ex República Yugoslava de Macedonia					2007	19	26	22	2005 ¹		27
Togo	20				2007	59	44	51	2006 ¹		28
Trinidad y Tabago	33				2007			56	2006 ¹		28
Túnez						26	29	27			
Turquía					2007	35	39	37			
Tuvalu					2005						
Uganda	28				2006	38	32	33	2006	38	32
Ucrania					2007	39	42	40	2007	43	42
República Unida de Tanzania	26								2004	40	45
Uruguay					2007	52	48	50			
Uzbekistán	3								2006 ¹		31
Viet Nam	25				2005	50	42	46	2005	50	42
Zambia	26	2005	46	41	2007	37	34	35	2007	37	34
Zimbabwe		2003	56	54	2006	46	44	45	2006	46	44

¹ La fuente es la encuesta basada en indicadores múltiples (MICS de UNICEF)

Indicador 14 del UNGASS. Porcentaje de poblaciones más expuestas que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las principales ideas erróneas acerca de la transmisión del VIH¹

País (o territorio)	Profesionales del sexo				Usuarios de drogas inyectables				Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	
	2005		2007		2005		2007		2005	2007
	Todos	Todos	Varón	Mujer	Todos	Todos	Varón	Mujer	Todos	Todos
Argentina	69	67 ⁶							56	
Armenia	49	54 ⁴		54	60	68	69	56	54	74
Bahamas										45
Bangladesh	23	31	30	31	14	20 ⁵	20		14	27
Barbados	37 ^{3,4}		37 ³							
Belarús	24	50 ⁴		50	61	58	51	68	63	56
Benin										42
Bosnia y Herzegovina					22 ⁵	22				
Bulgaria	35 ⁴		35		29	28	34	32		
Burundi	4	44 ^{2,4}	44 ²							
Camerún	40 ^{2,4}		40 ²							
China	24 ⁴	41			36	49	48	52	37	55
Congo, República del	67									3
Costa Rica										49
Côte d'Ivoire	32 ⁴		32							
Cuba	52		49	61					54	
Rep. Democrática del Congo	30 ^{2,4}		30 ²							
Ecuador					47 ³					
El Salvador	6								25	
Estonia	83 ^{3,4}		83 ³		75 ³	75 ³	74 ³	60 ³		
Etiopía	36 ⁴		36							
Gabón	24		13	25						
Georgia	1	4 ⁴	4	36	41 ⁵	41	0 ²			
Grecia										74
Guatemala	3 ⁴		3						33	
Guinea	4 ⁴		4							
Guyana	63								67	
Haití	6 ⁴		6						36	
Honduras	21 ⁴		21						21	
India					38					
Indonesia	24	28	37	26	7	58	58	68	43	42
Irán, República Islámica del	8 ⁴		8		24	24	15			
Jamaica	26	26 ⁴	26							
Kazajstán	63 ⁴		63		63	63	63	66		
Kirguistán	1	36 ⁴	36		64	62	69	7	89	
República Democrática Popular Lao	21									31 ³
Letonia					45	44	50			
Lituania	24 ⁴		24						39	
Madagascar	30									
Malasia	78 ²						98 ²			

Indicador 14 del UNGASS. Porcentaje de poblaciones más expuestas que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y que también rechazan las principales ideas erróneas acerca de la transmisión del VIH¹

País (o territorio)	Profesionales del sexo				Usuarios de drogas inyectables				Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	
	2005		2007		2005		2007		2005	2007
	Todos	Varón	Mujer	Transexual	Todos	Varón	Mujer	Transexual	Todos	
Malí	90									
Mauricio		2 ^{2,4}				62 ²				48 ²
México		49	54	47						66
Moldova	35	58 ⁴		58	37	64	64	66	38	47
Mongolia		29 ⁴		29						23
Marruecos	72				7					
Nepal	17	32	41	30	50	66 ⁵	66		27	45
Nigeria		33 ⁴		33		34	34	36		44
Pakistán		10 ³	21 ³	<1 ³			20			
Panamá		91	91	92						78
Papua Nueva Guinea		35 ⁴		35						71
Perú									73	40
Filipinas		2		2		26	27	23		10
Rumania	14	14 ⁴		14	18	30	24	63		45
Federación de Rusia		36 ⁴		36		46	47	43		26
Rwanda		36 ⁴		36						
Santa Lucía						13 ³	10 ³	33 ³		
Santo Tomé y Príncipe				72						
Senegal		41 ⁴		41						
Sri Lanka		10 ⁴		10						20
Suriname		78	75	79						
Swazilandia		46 ⁴		46 ⁴						
Suecia		46	100	45						
Tayikistán		41 ⁴		41		46	45	51		
Tailandia		28	23	29		49				25
Ex República Yugoslava de Macedonia	10	47	67	43	27	34	32	47	34	41
Togo		45	46	42						
Turquía	22									
Ucrania	8	48 ⁴		48	21	47	47	45	49	47
Viet Nam	24	35 ⁴		35	34	38 ^{3,5}	38 ³			55 ³
Zambia		41	41	42						

¹ Fecha de informe 2007, pero la recopilación de datos puede variar de 2005 a 2007

² La recopilación de datos comenzó antes de 2005

³ Metodología no armonizada con las directrices del UNGASS 2008

⁴ Mujeres únicamente

⁵ Varones únicamente

⁶ Transexual

Indicador 15 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 24 años de edad que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años										
País (o territorio)	2005			Valor informado por el país para 2007				Últimas encuestas DHS (o MICS)		
	Año de encuesta	Varones	Mujeres	Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos 15-24	Año de encuesta	Varones	Mujeres
Angola		47	24	2006	36	28	32			
Antigua y Barbuda				2006			25			
Argentina				2005	27	19	23			
Armenia				2007	11	<1	3	2005	3	<1
Azerbaiyán								2006	1	1
Bangladesh				2005	4	1	2			
Barbados		36	26							
Belarús				2007	8	4	5			
Belice				2006	11	6	9			
Benin		16	9	2006	13	12	12	2006	13	12
Bosnia y Herzegovina				2006		1		2006 ¹		<1
Bulgaria				2006	13	7	10			
Burkina Faso				2007	3	7	6	2003	4	7
Burundi		14	6	2005		3		2005 ¹		3
Cambodia		<1	<1	2006	<1	1	1	2005	<1	1
Camerún	2004	23	35	2006		14		2006 ¹		14
Cabo Verde				2005	41	24	30	2005	41	24
República Centroafricana	2004	10	10	2006	20	33	30	2006	13	25
Chad				2004	19	39	35	2004	10	26
Chile				2006	12	6	9			
Colombia				2007			37	2005		13
Congo, República del	2003	10	10	2005	27	24	24	2005	27	24
Costa Rica				2006	15	7	11			
Cuba				2006	33	15	24			
Chipre				2007	15	1	8			
Côte d'Ivoire	2004	13	15	2005	15	19	18	2005	15	19
Rep. Democrática del Congo				2006	31	23	28	2007	18	18
República Dominicana				2007	24	33	29	2007	24	15
Ecuador				2004		10				
El Salvador				2003	54	21	27			
Eritrea								2002		13
Estonia				2007	10	11	10			
Etiopía		40	42	2005	2	16	12	2005	2	16
Fiji				2007			50			
Gabón				2007	38	14	25	2000	42	24
Gambia				2006		5		2006 ¹		5
Georgia				2005		2	2			
Alemania				2006	10	12	11			
Ghana								2006	4	6
Grecia				2007	35	7	24			
Granada				2006	32	20	25			
Guatemala				2002	20	9	11	1999		10

Indicador 15 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 24 años de edad que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años										
País (o territorio)	2005			Valor informado por el país para 2007				Últimas encuestas DHS (o MICS)		
	Año de encuesta	Varones	Mujeres	Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos 15-24	Año de encuesta	Varones	Mujeres
Guinea	2005	16	18	2007	20	31	25	2005	17	22
Guinea-Bissau				2006		22				
Guyana				2005	30	12	21	2005	13	9
Haití				2006	43	15	23	2005	43	15
Honduras				2005	19	11	13	2006		11
India				2006	2	4	3	2006	2	10
Irán, República Islámica del				2005						
Jamaica				2004						
Japón				2004	8	9	9			
Kazajstán				2007	20	3	9			
Kenya	2005	20	17	2003	29	14	21	2003	29	14
Kirguistán				2007	9	<1	5	2006 ¹		0
Letonia				2007	16	9	12			
Líbano				2004			4			
Lesotho	2004	27	14	2005	12	6	8	2004	13	6
Lituania				2006	22	10	16			
Madagascar	2003	22	31	2006	33	39	36	2004	9	15
Malawi				2006				2004	14	15
Malí				2006	5	25	6	2006	5	25
Islas Marshall				2006	17	10	14	2007	27	14
Mauritania				2007		14	14			
Mauricio				2004	3	1	2			
México				2005	4	4	4			
Moldova	2005	34	24	2006	8	1	4	2005	9	1
Mongolia	2005	3	<1	2005	3	<1	1			
Montenegro				2007	4	2	3	2006 ¹		<1
Marruecos				2007	8	1	5			
Mozambique				2004	26	28	28	2003	26	28
Namibia				2007	18	7	12	2006	18	7
Nepal								2006	4	7
Nicaragua				2007		14	14	2001		12
Níger				2006	8	39	25	2006	5	30
Nigeria	2005	5	15	2005	5	15	10	2003	7	21
Pakistán				2006	1	<1				
Palau				2006		5				
Papua Nueva Guinea				2007	4	4	4			
Perú				2007		6		2007		6
Filipinas								2003	2	1
Rumania				2006	17	3	10			
Federación de Rusia	2004	17	8	2007	12	3	7			
Rwanda				2005	13	4	7	2005	13	4
Saint Kitts y Nevis				2006	36	10	22			

Indicador 15 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y varones de 15 a 24 años de edad que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años										
País (o territorio)	2005			Valor informado por el país para 2007				Últimas encuestas DHS (o MICS)		
	Año de encuesta	Varones	Mujeres	Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos 15-24	Año de encuesta	Varones	Mujeres
Santa Lucía				2006	32	20	26			
San Vicente y las Granadinas	2005	63	37	2006	31	14	22			
Santo Tomé y Príncipe				2006						
Senegal				2005	12	9	10	2005	12	9
Sierra Leona				2005	25		25			
Singapur				2007	3	2	2			
Sudáfrica				2005	5	12	8			
España				2003	18	11	15			
Sri Lanka				2007			3			
Suriname				2006			8			
Swazilandia				2007	5	7	6	2007	5	7
Suecia				2007	15	21	19			
Suiza				2007	10	7	8			
Tayikistán				2006	1	<1	1			
Tailandia		11	7	2006	21	5	13			
Ex República Yugoslava de Macedonia				2007	8	1	5	2006 ¹		<1
Togo				2007	13	10	11	1998	<1	19
Trinidad y Tabago				2007			12			
Túnez					7	<1	4			
Turquía				2007						
Turkmenistán								2000		<1
Uganda				2006	12	16	15	2006	12	16
Ucrania				2007	7	3	5	2007	2	1
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte				2001	14	12	13			
República Unida de Tanzania				2005	10	13	11	2004	9	12
Uruguay				2007	25	10	18			
Uzbekistán								1996		1
Viet Nam				2005	1	<1	<1	2005	<1	1
Zambia				2007	16	14	15	2007	16	14
Zimbabwe		9	8	2006	5	5	5	2006	4	5

¹ La fuente es la encuesta basada en indicadores múltiples (MICS de UNICEF)

Indicador 16 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja

País (o territorio)	2003 ¹					2005 ¹				
	Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos		Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos	
		15-49	15-49	15-24	25-49		15-49	15-49	15-24	25-49
Angola										
Antigua y Barbuda										
Armenia	2000	9	<1	4	4	2005	9	<1	6	3
Azerbaiyán										
Bangladesh										
Belarús										
Belice										
Benin	1996		2			2001	22	1	7	8
Bolivia						2003	15	1	10	7
Bosnia y Herzegovina										
Burkina Faso	1999	13	1	9	6	2003	15	1	5	9
Burundi										
Camboya	2000		<1			2005	6	<1	2	4
Camerún	1998	41	10	25	25	2004	31	6	15	22
Canadá										
Cabo Verde						2005	36	3	19	19
República Centroafricana										
Chad	1997	19	1	11	8	2004	17	1	6	10
Chile										
Colombia	2000		3			2005		3		
Comoras										
Congo, República del						2005	24	7	15	16
Costa Rica										
Cuba										
Chipre										
Côte d'Ivoire	1998	33	5	19	19	2005	24	4	12	15
Rep. Democrática del Congo										
República Dominicana	1996	16	2	4	6	2002	23	2	13	13
Estonia										
Etiopía	2000	7	1	3	5	2005	2	<1	1	2
Gabón	2000	24	14	20	18					
Gambia										
Alemania										
Ghana						2003	10	1	4	7
Grecia										
Granada										
Guatemala										
Guinea	1999	26	4	15	15	2005	25	2	11	14
Guinea-Bissau										
Guyana						2005	7	1	6	3

Indicador 16 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja									
Valor informado por el país para 2007							Últimas encuestas DHS (o MICS)		
Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos				Año de encuesta	Varones	Mujeres
	15-49	15-49	15-49	15-19	20-24	25-49		15-49	15-49
2006	51	25	38	54	46	26			
2006			55						
							2005	9	<1
							2006	6	<1
2005	18		18	25	25	14			
2007	33	14	21	27	32	15			
2006	13 ²	4 ²	8 ²						
2006	12	35	17	62	30	8	2006	28	
							2003	15	1
2006		8		4	11				
2007	14	1	7	2	6	9	2006 ⁴		1 ²
							2005 ⁴		1 ²
2006	6	<1	3	1	4	3	2005	6	<1
2004	40	8	18	17	20	17	2006 ⁴		5 ²
2006			13						
2005	69	43	52	86	71	36	2005	36	3
2006	24 ²	6 ²	11 ²	6	14				
2004	17	1	8	4	9	10	2004	17	1
2006	12	2	7	6	14	6			
2007		4 ³			35 ³		2005	<1	3
2003	24	4	11			9			
2005	28	8	14	19	16	13	2005	24	7
2006	37	35	39						
2006	35	10	23	22	29	22			
2007	25	6	15						
2005	31	4	16	15	18	16	2005	24	4
2007	22	4	9	10	11	9	2007	17	3
2007	30	4	17	22	25	16	2007	24	3
2007	23	19	21	17	26				
2005	3	<1	2	1	2	2	2005	2	<1
2007	51	38	43	53	36	43			
2006		1 ²					2006 ⁴		1 ²
2007	35	22	29						
2006	22 ²	40 ²	26 ²				2006	8	1
2007	33	8	20	22	48	18			
2006	30	13	21	19	30	16			
2002	13		13	34	19	8			
2005	25	2	8	6	10	8	2005	25	2
2006				5	7		2006 ⁴		6 ²
2005	9	1	5				2005	7	1

Indicador 16 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja

País (o territorio)	2003 ¹					2005 ¹				
	Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos		Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos	
		15-49	15-49	15-24	25-49		15-49	15-49	15-24	25-49
Haití	2000	24	1	11	13	2005	23	1	11	13
Honduras						2006		1		
India						2006	1	<1	1	1
Jamaica										
Kazajstán										
Kenya	1998	24	3	16	11	2003	12	2	7	7
Kirguistán										
Libano										
Lesotho						2004	21	8	11	16
Lituania										
Madagascar						2004	17	3	11	9
Malawi	2000	15	1	6	9	2004	9	1	4	6
Malí	1996	13				2001	17	1	5	11
Islas Marshall										
Mauricio										
México										
Moldova						2005	11	1	9	4
Mongolia										
Montenegro										
Marruecos										
Mozambique						2003	30	5	18	17
Namibia	2000	16	2	9	10					
Nepal	2001	3								
Nicaragua	2001		1							
Níger	1998	10	1	7	5					
Nigeria						2003	15	2	5	10
Palau										
Papua Nueva Guinea										
Perú	1996	23	<1	4	9	2000		<1		
Filipinas						2003	6			
Polonia										
Federación de Rusia										
Rwanda	2000	2	<1	1	2	2005	3	<1	1	2
Saint Kitts y Nevis										
Santa Lucía										
San Vicente y las Granadinas										
Senegal						2005	13	1	4	10
Serbia										
Seychelles										
Sierra Leona										

Indicador 16 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja									
Valor informado por el país para 2007							Últimas encuestas DHS (o MICS)		
Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos				Año de encuesta	Varones	Mujeres
	15-49	15-49	15-49	15-19	20-24	25-49		15-49	15-49
2006	23	1	12	7	16	13	2005	23	1
2005	16	1	4				2006	<1	1
2006	8	2	5	6	9	4	2006	1	<1
2004	48	11	29						
2007	25	5	15	9	23	15			
2003	12	2	5	3	6	5	2003	12	2
2007	28	2	15	10	21		2006 ⁴		<1 ²
2004	24	4	17						
2005	30	11	16				2004	21	8
2007	43	26	41	<1	<1	41			
2004	20	3	7				2004	17	3
2005	1	1	1	2	1	1	2004	9	1
2006	23	2	5	5	4	1	2006	15	1
2006	23	18	21	19	30		2007	7	3
2004	9	1	5	4	5	6			
2003	8				6	9			
2007	16	2	8	11	19	5	2005	11	1
2005	54		54						
							2005 ⁴		<1 ²
2007	37	2	19	14	27				
2004	52	24	29	60	34	19	2003	30	5
2007	16	3	9	10	15	7	2006	11	2
							2006	2	<1
2007		2	2	1	2	2			
2006	9	1	2	5	4	2	2006	12	1
2005	19	2	10	3	10	14	2003	15	2
2006		9		36	13	5			
2007	13	2	8	6	11	7			
2006	33	12					2007		1
							2003	6	
2005	8	5	7						
2006	20	9	15	16	26	13			
2005	3	<1	2	<1	1	2	2005	3	<1
2006	53	19	36						
2007	42	25	35						
2006	25	10	17	13	32	9			
2005	25	4	8	7	11	7	2005	13	1
2006	42	11	26	32	24	<1	2005 ⁴		3 ²
2003	23	11	17						
2005	9	36	21						

Indicador 16 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja

País (o territorio)	2003 ¹					2005 ¹				
	Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos		Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos	
		15-49	15-49	15-24	25-49		15-49	15-49	15-24	25-49
Singapur										
Sudáfrica										
España										
Sri Lanka										
Suriname										
Swazilandia										
Suecia										
Suiza										
Tayikistán										
Tailandia										
Togo	1998	21	3	13	13					
Trinidad y Tabago										
Turquía										
Turkmenistán	2000		<1							
Uganda	1995	8	1	5	4	2001	18	2	6	12
Ucrania										
Uzbekistán										
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte										
República Unida de Tanzania	1999	29	9	17	20	2004	23	3	10	15
Uruguay										
Viet Nam						2005	14	2	6	9
Zambia	1996	27	4	18	12	2002	21	2	10	13
Zimbabwe	1999	13	2	6	8	2006	9	1	4	6

¹ Datos proporcionados por MEASURE DHS² 15 a 24 años³ 25 a 64 años únicamente⁴ La fuente es la encuesta basada en indicadores múltiples

Indicador 16 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que en los últimos 12 meses tuvieron relaciones sexuales con más de una pareja									
Valor informado por el país para 2007							Últimas encuestas DHS (o MICS)		
Año de encuesta	Varones	Mujeres	Ambos sexos				Año de encuesta	Varones	Mujeres
	15-49	15-49	15-49	15-19	20-24	25-49		15-49	15-49
2007	7	2	4	2	10	4			
2005	3	18	10	18	15	8			
2003	27	13	20						
2007	3	<1	2	1	1	3			
2006			3						
2007	14	2					2007	14	2
2007	23	23	23	33	34	11			
2007	18	10	14	25	26	10			
2006			6	3	9				
2006	18	1	9	24	18	7			
2007	26	6	16	10	22	17	2006 ⁴		3 ²
2007	94	79	85						
2007		15	15	19	20	11			
							2000		<1
2006	21	2	12	3	9	16	2006	21	2
2007	21	7	14	18	23	11	2007	13	2
							2006 ⁴		<1 ²
2001	25	15	20	30	35	16			
2006	20	5	13	46			2004	23	3
2007	23	11	17	28	35	11			
2005	1	<1	<1	<1	1	<1	2005	14	2
2007	14	1	7	3	7	9	2007	14	1
2006	14	1	7	7	9	6	2006	9	1

Indicador 17 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declaran haber utilizado un preservativo en la última relación sexual

País (o territorio)	2003 ¹					2005 ¹				
	Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49	Ambos sexos		Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49	Ambos sexos	
				15-24	25-49				15-24	25-49
Albania										
Angola										
Antigua y Barbuda										
Argentina										
Armenia	2000	32				2005	58			
Azerbaiyán										
Bangladesh										
Belarús										
Benin	1996		13			2001	23	18	33	17
Bosnia y Herzegovina										
Burkina Faso	1999	55	36	56		2003	43	44	68	33
Burundi										
Camboya						2005	41			
Camerún	1998	23	13	27	17	2004	38	35	53	28
Canadá										
Cabo Verde						2005	69	57	78	59
República Centroafricana										
Chad	1997	20	10	22	17	2004	20	7		
Chile										
Colombia	2000		22			2005		31		
Congo, República del						2005	30	23		
Costa Rica										
Cuba										
Chipre										
Côte d'Ivoire	1998	45	23	53	34	2005	38	41	59	26
Rep. Democrática del Congo										
República Dominicana	1996	9	19	7	10	2002	35	33	45	27
Estonia										
Etiopía	2000	20	11	43	10	2005	9			
Gabón	2000	40	26	41	29					
Gambia										
Alemania										
Ghana						2003	22	33	39	
Grecia										
Granada										
Guatemala										
Guinea	1999	24	9	31	17	2005	24	20	38	17
Guinea-Bissau										
Guyana						2005	53	56		
Haití	2000	21	30	30	16	2005	34	21	49	23

Indicador 17 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declaran haber utilizado un preservativo en la última relación sexual

Valor informado por el país para 2007							Últimas encuestas DHS (o MICS)		
Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49	Ambos sexos				Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49
			15-49	15-19	20-24	25-49			
2005									
2006	46	18	32	26	40	31			
2006			87						
2005	48	44	46	48	44				
							2005	58	
2006							2006	26	
								<1	
2005	35		35	42	31	36			
2007	62	60	61	76	68	49			
2006	25	42	32	31	36	29	2006	17	
2006		72		73	71				
2007	36	51	38	69	61	30	1999	55	
2004	55	45	49					36	
2006	40	12	39	83	73	23	2005	41	
2006	55	41	48	61	62	43	2006 ⁴	68 ⁵	
	23	16	19						
2005	72	46	58	70	61	47	2005	69	
								57	
2006									
2004	20	7					2004	20	
								7	
2006	30	18	28	32	34	25			
							2005	31	
2005	43	21	30	24	29	35	2005	30	
								23	
2006	15	11	13			12			
2006	41	33	39	72	53	30			
2007	63	53	61						
2005	52	34	44	47	45	42	2005	38	
								41	
2007	26	16	21	16	26	21	2007	16	
								8	
2007	42	33	37	54	44	34	2007	45	
								35	
2007	64	55	61	61	64				
2005	52	24	43	38	47	34	2005	9	
2007	72 ²	70 ²	71 ²	65 ²	73 ²	71 ²			
							2006 ⁴	64 ⁵	
2007			58						
2006	33	54					2006	38	
								35	
2007	71	55	67	61	58	75			
2006	68	52		61	63				
2002				47	58	50			
2005	32	26	31	35	43	27	2005	24	
								20	
							2006 ⁴	58 ⁵	
2005	53	56	53				2005	53	
								56	
2006	34	21	33	41	53	23	2005	34	
								21	

Indicador 17 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declaran haber utilizado un preservativo en la última relación sexual

País (o territorio)	2003 ¹					2005 ¹				
	Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49	Ambos sexos		Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49	Ambos sexos	
				15-24	25-49				15-24	25-49
Honduras						2006		27		
India						2006	23	12		
Jamaica										
Kazajstán										
Kenya	1998	36	18	38	30	2003	33	12	47	17
Kirguistán										
Libano										
Lesotho						2004	41	19	47	26
Lituania										
Madagascar						2004	9	2	12	6
Malawi	2000	14	15	26	7	2004	20	16	32	13
Malí	1996	34				2001	16	14	27	13
Islas Marshall										
Mauritania										
Mauricio										
México										
Moldova						2005	45	22	56	28
Mongolia										
Marruecos										
Mozambique						2003	19	14	38	10
Namibia	2000	65	45	72	56					
Nepal										
Nicaragua	2001		19							
Níger	1998	26	28							
Nigeria						2003	22	13	34	17
Palau										
Papua Nueva Guinea										
Perú	2000		15							
Filipinas						2003		22		
Rwanda	2000	28	30			2005	8	14		
Saint Kitts y Nevis										
Santa Lucía										
San Vicente y las Granadinas										
Santo Tomé y Príncipe										
Senegal						2005	31	21	61	22
Serbia										
Sierra Leona										
Singapur										
Sudáfrica										
España										

Indicador 17 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declaran haber utilizado un preservativo en la última relación sexual									
Valor informado por el país para 2007							Últimas encuestas DHS (o MICS)		
Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49	Ambos sexos				Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49
			15-49	15-19	20-24	25-49			
2006	38	32	37				2006		27
2006	67	62	66	61	68	66	2006	23	12
2004	67	53	64						
2007	82	82	82	88	93	77			
2003	33	12	30	48	47	17	2003	33	12
2007	81	75	80	85	78				
2004	72	67	72						
2004	41	19	34	49	40	26	2004	41	19
2007	46	20	44			44			
2004	13	5	8	8	8	8	2004	9	2
2004	47	30	38	35	47	33	2006 ⁴		45 ⁵
2006	38	17	20	19	29	34	2006	12	8
2006	19	15	18	17	19		2007	20	11
2007	10		10						
2004	44	46	44	50	43	43			
2003	20				78	14			
2007	48	60	49	45	50	52	2005	45	22
2005	34		34						
2007	61	75	62	63	61				
2003	19	14	18	28	28	10	2003	19	14
2007	74	66	68	79	76	60	2006	74	66
2006	54						2006	30	
2001		19					2001		19
2006	7	8					2006	7	8
2005	62	44	56	44	56	62			
2006		23				60			
2007	45	26	43	50	49	38			
2006			48	59	43		2007		31
2003	22						2003		22
2005	8	14	8				2005	8	14
2006			67						
2007	48	39	45						
2006	62	52	59	59	59				
2006		57 ³		60	59				
2005	62	37	52	39	51	59	2005	31	21
2006				73	78				
2007	11	26	37						
2007	51	0	42	50	14	51			
2005	67	47	64	80	72	56			
2003	50	42	46						

Indicador 17 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declaran haber utilizado un preservativo en la última relación sexual

País (o territorio)	2003 ¹					2005 ¹				
	Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49	Ambos sexos		Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49	Ambos sexos	
				15-24	25-49				15-24	25-49
Suriname										
Swazilandia										
Suiza										
Tayikistán										
Tailandia										
Togo	1998	33	21	42	25					
Turquía										
Uganda	1995	18	8	24	9	2001	24	25		
Ucrania										
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte										
República Unida de Tanzania	1999	22	16	25	17	2004	29	21	37	23
Uruguay										
Viet Nam						2005	58			
Zambia	1996	31	18	36	23	2001	27	21	40	20
Zimbabwe	1999	40	46	56	30	2006	36	41	57	24

¹ Datos proporcionados por MEASURE DHS

² Datos de dos ciudades únicamente

³ La mujer tiene de 15 a 24 años únicamente

⁴ La fuente es la encuesta basada en indicadores múltiples (MICS de UNICEF)

⁵ 15 a 24 años

Indicador 17 del UNGASS. Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que tuvieron más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y declaran haber utilizado un preservativo en la última relación sexual

Valor informado por el país para 2007							Últimas encuestas DHS (o MICS)		
Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49	Ambos sexos				Año de encuesta	Varón 15-49	Mujeres 15-49
			15-49	15-19	20-24	25-49			
2006			49						
2007	56	57	56		62	51	2007	56	57
2007	62	52	58	83	61	48			
2006			65	53	69				
2006	53	14	51	63	49	50			
2007	73	69	73	72	76	71	1998	33	21
2007		58	53	52	71	45			
2006	42	41	42		30	41	2006	42	41
2007	75	61	72	77	64	72	2007	46	48
2001	10	5	7	15	15	5			
2005	50	38	44	38	41		2004	29	21
2007	69	65	68	76	81	56			
	1	0	0	0	1	0	2005	58	
2007	50	37	46	39	49	48	2007	28	33
2006	71	47	64	50	67	68	2006	36	41

Indicador 18 del UNGASS. Porcentaje de profesionales del sexo (ambos sexos) que comunican haber usado preservativo con su cliente más reciente¹

País (o territorio)	2005			2007		
	Todos	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres
Afganistán				50 ^{3,5}		50 ³
Angola				78 ⁵		78
Armenia	89	100	89	91 ⁵		91
Bangladesh	40	44	32	63	44	67
Barbados				80 ⁵		80
Belarús	77	100	77	76 ⁵		76
Benin				83 ⁵		83
Bolivia				88 ⁴	57 ⁴	88 ⁴
Bulgaria				95 ⁵		95
Burkina Faso	96			99	98	99
Burundi	74		74	74 ^{2,5}		74 ²
Camboya	96		96	99 ⁵		99
Camerún				74 ^{2,4,5}		74 ^{2,4}
Canadá					61 ⁴	80 ⁴
Cabo Verde				74 ⁵		74
China			69	82 ⁵		82
Colombia				89	82	97
Comoras				59 ⁵		59
Costa Rica				92 ⁵		92
Côte d'Ivoire				96 ⁵		96
Croacia				86 ²		
Cuba				61	63	56
Rep. Democrática del Congo				61 ^{2,5}		61 ²
República Dominicana				96 ²		
Ecuador						95
El Salvador				96	89	97
Eritrea				76 ⁵		
Estonia				94 ⁵		94
Etiopía				87 ⁵		84
Gabón				67	53	67
Georgia			95	94 ⁵		94
Ghana				98		
Guatemala				96	91	97
Guinea				100 ⁵		100
Guinea-Bissau						60
Guyana				89 ⁵		89
Haití				90 ⁵		90
Honduras				68	71	66
India						88
Indonesia	55	48	56	69	72	68

Indicador 18 del UNGASS. Porcentaje de profesionales del sexo (ambos sexos) que comunican haber usado preservativo con su cliente más reciente¹

País (o territorio)	2005			2007		
	Todos	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres
Irán, República Islámica del				55 ⁵		55
Jamaica	84			84		
Kazajstán				97 ⁵		97
Kirguistán	81			84 ⁵		84
República Democrática Popular Lao	83	59	89			
Líbano				34 ⁴	47 ⁴	34 ⁴
Lithuania				77 ⁵		77
Madagascar				79		
Malawi				69 ⁵		69
Malasia				35 ²		
Malí				99 ⁵		99
Mauricio				100 ^{2,5}		100 ²
México				96	96	96
Moldova	98			93 ⁵		93
Mongolia	94	50	96	92 ⁵		92
Marruecos	38		38	54 ⁵		54
Nepal	67			81	93	77
Níger				96 ⁵		96
Nigeria				98 ⁵		98
Pakistán	23	7	37	34	21	45
Panamá	92	91	92	76	64	84
Papua Nueva Guinea				94 ⁵		94
Paraguay				76	71	78
Perú					42	96
Filipinas				65	50	65
Polonia						46 ²
Rumania			85	85 ⁵		85
Federación de Rusia	77			92 ⁵		92
Rwanda				87 ⁵		87
Santo Tomé y Príncipe						60
Senegal	86		87	99 ⁵		99
Sierra Leona				68 ⁵		68
Singapur						99
Sri Lanka			65	89 ⁵		89
Suriname				70	79	68
Swazilandia				98 ⁵		98
Suecia				22	100	20
Suiza					72	
Tayikistán				75 ⁵		75
Tailandia				96 ^{4,5}		

Indicador 18 del UNGASS. Porcentaje de profesionales del sexo (ambos sexos) que comunican haber usado preservativo con su cliente más reciente¹

País (o territorio)	2005			2007		
	Todos	Varones	Mujeres	Todos	Varones	Mujeres
Ex República Yugoslava de Macedonia	86	88	84	78	93	75
Togo				78	76	84
Turquía				33 ⁵		33
Ucrania	80		80	86 ⁵		86
Uzbekistán				65 ⁵		65
Viet Nam	90		90	97 ^{4,5}		97 ⁴
Zambia				81	72	82
Zimbabwe				4 ^{4,6}	4 ⁴	

¹ Fecha de informe 2007, pero la recopilación de datos puede variar de 2005 a 2007

² La recopilación de datos comenzó antes de 2005

³ No se definió el periodo de recopilación de datos

⁴ Metodología no armonizada con las directrices del UNGASS 2008

⁵ Mujeres únicamente

⁶ Varones únicamente

Indicador 19 del UNGASS. Porcentaje de varones que señalan haber usado un preservativo en su última relación sexual anal con una pareja masculina¹

UNGASS	2005	2007
País (o territorio)		
Argentina		91
Armenia	30	84
Australia		58 ^{3,4}
Bahamas		69
Bangladesh	49	24
Belarús	62	67
Bulgaria		46
Camboya		86
Chile		29
China	41	64
Colombia		80
Congo, República del	23	
Costa Rica		71
Côte d'Ivoire		47
Croacia		53
Cuba		55
República Dominicana		79 ²
Ecuador		63
El Salvador		83
Estonia		47
Fiji	20	
Georgia	54	
Alemania		58
Ghana		48
Grecia		89
Guatemala		78
Guyana		81
Haití		73
Honduras		47
Indonesia	48	39
Japón		55
Kazajstán		66
Kenya		75
Kirguistán	68	81
República Democrática Popular Lao		24 ⁴
Líbano		39 ⁴
Lituania		58
Malí		54
Mauricio		52 ²
México		79

Indicador 19 del UNGASS. Porcentaje de varones que señalan haber usado un preservativo en su última relación sexual anal con una pareja masculina¹

UNGASS	2005	2007
País (o territorio)		
Moldova	63	48
Mongolia	13	67
Nepal		74
Nigeria		53
Pakistán	8	24
Panamá	84	86
Papua Nueva Guinea		88 ⁴
Perú	46	47
Filipinas		32
Polonia		32 ^{2,4}
Rumania		73
Federación de Rusia	39	60
Santa Lucía		74
Senegal	45	55 ²
Eslovenia		75 ⁴
Sri Lanka		61
Suriname		89
Suecia		42 ⁴
Suiza		80 ⁴
Tailandia		88
Ex República Yugoslava de Macedonia	29	56
Togo		60
Trinidad y Tabago		47 ²
Turquía		37
Tuvalu		63
Ucrania	72	39
Uzbekistán		61
Viet Nam		61

¹ Fecha de informe 2007, pero la recopilación de datos puede variar de 2005 a 2007

² La recopilación de datos comenzó antes de 2005

³ No se definió el periodo de recopilación de datos

⁴ Metodología no armonizada con las directrices del UNGASS 2008

Indicador 20 del UNGASS. Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que informan haber usado preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales ¹			
País (o territorio)	Todos	Varones	Mujeres
Argentina	64	63	65
Armenia	56	56	55
Australia	20 ³	20 ³	20 ³
Azerbaiyán	18 ²		
Bangladesh	44	44	55
Belarús	59	57	65
Bosnia y Herzegovina	23 ⁴	23	
Bulgaria	19	18	28
Canadá	43		
China	34 ³	32 ³	43 ³
Estonia	68	66	74
Georgia	48 ⁴	48	
Grecia	48		
Indonesia	34	34	30
Irán, República Islámica del	33	33	30
Japón	65 ⁴	65	
Kazajistán	37	37	36
Kirguistán	11	11	9
Letonia	38	40	34
Líbano	15 ³	15 ³	
Malasia	5 ²		
Mauricio	13 ²	15 ²	0 ²
México	29	27	38
Moldova	68	73	52
Marruecos	13	12	21
Nepal	38 ⁴	38	
Nigeria	66	66	68
Pakistán		21	
Paraguay	33	33	36
Federación de Rusia	37	39	31
Suecia	25	28	19
Suiza	50 ³	53 ³	42 ³
Tayikistán	36	33	47
Tailandia	35		
Ex República Yugoslava de Macedonia	51	51	51
Turquía	10	9	13
Ucrania	55	55	56
Uzbekistán	39	37	50
Viet Nam	36 ^{3,4}	36 ³	

¹ Fecha de informe 2007, pero la recopilación de datos puede variar de 2005 a 2007

² El periodo de recopilación de datos comenzó antes de 2005

³ Metodología no armonizada con las directrices del UNGASS 2008

⁴ Varones únicamente

Indicador 21 del UNGASS. Porcentaje de usuarios de drogas inyectables que informan haber utilizado equipo de inyección estéril la última vez que se inyectaron¹

País (o territorio)	Todos	Varones	Mujeres
Afganistán	46		
Argentina	65	64	67
Armenia	95	95	93
Australia	71 ⁴		
Azerbaiyán	77		
Bangladesh	34	34	74
Belarús	71	71	70
Bosnia y Herzegovina	25 ⁵	25	
Bulgaria	25	26	23
Canadá	68 ^{3,4}		
China	41	42	32
Georgia	93 ⁵	93	
Grecia	67		
Indonesia	82 ²	82 ²	89 ²
Irán, República Islámica del	75	75	62
Japón	47 ⁵	47	
Kazajstán	59	59	58
Kirguistán	77	76	81
Letonia	90	87	96
Líbano	60 ⁴	63 ⁴	0 ⁴
Malasia	28 ²		
Mauricio	32 ²	32 ²	33 ²
México	14	15	9
Moldova	96	96	95
Marruecos	7	7	12
Nepal	96 ⁵	96	
Nigeria	89	89	86
Pakistán		28	
Paraguay	80	80	79
Filipinas	48	47	63
Rumania	28 ²	30 ²	17 ²
Federación de Rusia	82	83	81
Suecia	38	38	35
Suiza	94 ⁴	95 ⁴	92 ⁴
Tayikistán	32	35	21
Ex República Yugoslava de Macedonia	73	73	69
Turquía	10	9	13
Ucrania	84	85	81
Uzbekistán	23	23	25
Viet Nam	89 ⁵	89	

¹ Fecha de informe 2007, pero la recopilación de datos puede variar de 2005 a 2007

² El periodo de recopilación de datos comenzó antes de 2005

³ No se definió el periodo de recopilación de datos

⁴ Metodología no armonizada con las directrices del UNGASS

⁵ Varones únicamente

Indicador 24 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que siguen con el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de haberlo comenzado¹

País (o territorio)	2005					2007				
	Varón	Mujer	Ambos sexos <15	Ambos sexos >15	Total	Varón	Mujer	Ambos sexos <15	Ambos sexos >15	Total
Antigua y Barbuda						53	57			55 ²
Argentina										90
Armenia						80	100		84	84
Azerbaiyán						57	43		86	86 ³
Bahamas						68	71	90	68	70
Barbados	93	94			93	93	96		95	95
Belarús						74	77	97	74	75
Benin										73
Bolivia						97	96	100	97	97
Bosnia y Herzegovina										100 ³
Botswana			92			82	86			85 ⁴
Bulgaria						89	93	33	97	91
Burkina Faso						77	71	77	73	73
Burundi						77	82	77	81	80
Cambodia								94	87	88
Camerún						96	96	97	96	96
Cabo Verde						93	86	100	88	89
República Centroafricana						85	85	89	85	85
Chile										89
China						84	91	96	85	85
Colombia										76
Comoras						40	60	0	100	100 ³
Costa Rica										91
Côte d'Ivoire						86	91	82	90	89
Croacia						100	88	0	97	97
Cuba						96	96	100	96	96
Rep. Democrática del Congo						66	72	62	70	70
Djibouti										82
Dominican Republic								89	90	90
El Salvador										85
Eritrea										93
Etiopía	90	86			89					70
Fiji								100	78	79
Finlandia										90
Gabón						50	62	63	58	58
Gambia										92
Georgia	85	100			88	71	86	75	71	75 ⁵
Alemania						77	80			78
Grecia						95	96	100	95	96
Granada						83	100	100	83	88
Guatemala										91

Indicador 24 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que siguen con el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de haberlo comenzado¹

País (o territorio)	2005					2007				
	Varón	Mujer	Ambos sexos <15	Ambos sexos >15	Total	Varón	Mujer	Ambos sexos <15	Ambos sexos >15	Total
Guinea-Bissau										62
Guyana						70	78	97	73	75
Haití										84
Honduras										91
Hungría						99	98	83	99	99
India										80
Irán, República Islámica del						78	79	75	78	78
Jamaica									88	88
Japón										100
Jordania										98
Kazajstán						72	61	8	73	68
Kenya										87
Kirguistán						70	57	100	66	68
República Democrática Popular Lao						90	90	93	90	90
Líbano										100
Lesotho					82	74	75	79	73	74
Lituania						54	71		58	58
Madagascar					100					94
Malawi					83					69
Malasia										87
Malí						72	72	72	72	72
Islas Marshall							100		100	100 ³
Mauritania										92
Mauricio						84	90		85	85
Moldova						82	93	88	87	87
Mongolia						67			67	67 ³
Montenegro						75	20		60	60 ³
Marruecos										93
Mozambique										97
Namibia					91 ²			82	69	71
Nepal										85
Nueva Zelandia										98
Nicaragua										100
Níger								36	47	47
Nigeria					98 ⁶			92	95	95
Pakistán										87
Palau						100	100		100	100 ³
Panamá										96
Papua Nueva Guinea						67	56	10	67	61
Paraguay						30	14	6	44	49
Perú						85	87	95	85	85

Indicador 24 del UNGASS. Porcentaje de adultos y niños con el VIH que se sabe que siguen con el tratamiento antirretrovírico 12 meses después de haberlo comenzado¹

País (o territorio)	2005					2007				
	Varón	Mujer	Ambos sexos <15	Ambos sexos >15	Total	Varón	Mujer	Ambos sexos <15	Ambos sexos >15	Total
Filipinas						96	96		96	96
Rwanda										91
Saint Kitts y Nevis										100
Santa Lucía					80	100	97	100	98	98
San Vicente y las Granadinas						43	80	50	63	62
Santo Tomé y Príncipe						65	82	100	74	75
Senegal						79	94			89
Seychelles						62	43	100	53	55
Sierra Leona										81
Sudáfrica										53
Sri Lanka										64
Suriname										80
Swazilandia						63	65	65	64	64
Suecia										
Suiza						92	84		89	89
Tayikistán						55	61		57	57
Tailandia						85	85	88	85	85
Ex República Yugoslava de Macedonia						43	50		44	44 ³
Togo						90	90	90	90	90
Túnez						93	90			92
Turquía						26	16	3	24	23
Uganda										88
Ucrania	69	75	70	100	72	73	83	91	76	78
Uruguay										74
Viet Nam								93	81	82
Zambia						87	90	92	88	88
Zimbabwe										93

¹ Los valores de los datos representan una cohorte con una supervivencia mínima de 12 meses, con pacientes perdidos en el seguimiento y muerte incluidos en el denominador, a menos que se indique lo contrario

² Representa supervivencia acumulativa

³ Representa <10 personas vivas y que siguen con ART en los últimos 12 meses

⁴ Refleja la supervivencia en 24 meses (ene 2005 a dic 2006)

⁵ Representa 2006

⁶ Representa supervivencia en 8 meses